





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1593/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1593/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1593/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1593/A

1593 S. 33 (5849)

A

L 2. 10.

L XXIII. Cor

39/Nov-05

7.C. 15679

Rem tuam custodi

*Hic Liber est Christophori
de heris. 1486*

Const. 12.

Dispensatorium,

HOC EST,
PHARMACORVM
conficiendorum
ratio.


VALERIO CORDO
authore.

APPENDIX EX SCRIPTIS
D. Iacobi Syluij, pro instructione
Pharmacopolarum
vtillissima.

*Nunc denuò omnia à quàm plurimis
mendis expurgata.*



Venetijs, in officina Erasmiiana,
apud Vincentium Valgrifium,
M. D. LVI.



TITVLI DI-

spensatorij.

Confectiones Aromaticæ.	4
Confectiones Opiatę.	55
Condita.	123
Conseruæ.	125
Lenitiua & Solutiua.	129
Pilulæ.	164
Sirupi.	195
Rob.	232
Lohoch.	234
Trochisci.	239
Emplastra.	261
Cærota.	274
Vnguenta.	276
Olea.	302
Præparationes quorundam simpli- cium.	333

A 2

TITVLI

TITVLI

Appendicis.

De Collectione, Repositione, & Duratione simplicium.	343
De Adulterationibus simplicium medicamentorum cognoscendis.	350
De simplici aliquo absolute scripto, quid accipiendum.	359
De succedaneis, scilicet, Quid pro Quo.	366
Item, Qualem uirum Pharmacopolam esse conueniat.	375

PRAEFATIO

P R A E F A T I O
Ad lectorem.



V^m Valerius Cordus, Euritii illius celeberrimi Medici filius, studiorum gratia Italiā petiturus, obiter ad urbem nostram Norimbergā peruenisset, atq; cum doctis quibusdam ac bonis uiris, præcipuè Medicis, mutuam notitiam, amicitiam, familiaritatemq; studiosè cōtraheret, inter cætera, quæ de bonis literis, atque re medica, utro citroque inter eos familiariter, ut fieri solet, agitata sunt, mentio incidit Dispensatorii quod ipse ex omni genere bonorum authorum, cum ueterum tum recentium de Pharmacorum omnium, quatenus in usu sunt, conficiendorum ratione collectum, diligenter & emendatissimè conscripserat. Cumque constaret, illud iam antea in aliquot Saxonie urbibus,

A 3 bus,

Præfatio

bus, præcipuis Medicis approban-
tibus, in usum publicum fuisse re-
ceptum, interimque tamen ab eo &
locupletatū, & annotationibus eru-
ditis, magis atque magis illustratū,
rogatus fuit à compluribus, ut illud
ipsum etiam nostris Pharmacopo-
lis impertiret. Cordus autem, etsi
adiuuandum rem medicam iam tū
mirificè esset accensus; pro sua tā-
men modestia, atque prudentia, nō
nihil subuerebatur, priuatam suam
authoritatē ad Pharmacopolas per-
mouendos, ponderis haudquaquā
fatis esse habituram. Itaque librum
suum Senatui potiùs offert, tum de-
mum in usum publicum assumen-
dum, cū esset illius iudicio & au-
thoritate comprobatus. Senatus ue-
rò, pro sua in studiosos omnes pro-
pensione, ac reipublicę omni ex par-
te iuuandę diligentia ac sollicitudi-
ne, officium illud Cordi perquàm
gratum habuit, librumq; collegio
Medicorum, Cordo præsentē, per-
legendum & examinandum tradi-
dit:

Præfatio

dit: vt si quid mutandum, adiiciendumve arbitraturi essent, id authore non modò sciente, verùm etiam cõsentiente fieri posset. Quod cùm sedulò ac magna diligentia factum esset, Senatusque ex Medicorum cẽsura iam intellexisset, nihil hæcenus absolutius, aut emendatius in hoc descriptionum genere typis in uulgatum esse, librum non solum in publicum edendum, verùm etiã Pharmacopolis, vt eum veluti lumen quoddam deinceps sequantur, offerendũ esse decreuit. Cuius quidem editioni, hac quoque de causa studiosiùs inuigilatum est, ut authore interim in Italia, dum ad metam studiorum suorum quàm acerrimè contendit, immatura morte sublato, aliquid tamen illius extaret, quod ingeniũ eius & industriã posteritati testaretur, eumq; ab obliuione vindicaret. Hoc igitur Valerij Cordi, candidissimi & diligentissimi iuuenis monumentum qualecunque, certè non pœnitendum,

A 4 studiose

Præfatio

studioſe lector, obuijs ulnis ample-
ctere : & ſi quid ex eo iuuaberis,
(iuuaberis autem, niſi fallor, quàm
plurimùm) Ampliſſimo Norim-
bergenſi Senatui, cuius liberalitate
tibi communicatur, gratias habe.
Sin autem aliquid in eo diſplicue-
rit, ne authorem mortuum inhu-
maniter calumnijs impete, ſed ab-
ſolutiore opere in publicum eden-
do illum uincere, & nomen eius
obſcurare contende. Et bene uale.

I N D E X

INDEX COMPOSITO- RUM MEDICA- mentorum, secundum ordinem Alpha- beti.

ACACIAE succedanea	341
Adipum præparatio	340
Agaricus Trochiscatus	253
Aloes præparatio	333.& 334
Aromaticum Charyophyllatum	4
Aromaticum Rosatum	5
Aurea Alexandrina	69
BENEDICTA laxatiua	148
CASSIA extracta sine fol. Senæ	131
Cassia extracta cum fol. Sene	ibidem
Cassia extracta pro clysteribus	132
Catharticum imperiale	161
Cerotum infrigidans Galen.	274
Cerotum Sandalinum	ibidem
Cerotum stomachale	275
Confectio liberantis	41
Confectio cordialis	43
Confectio Hamech maior	143
Confectio Hamech minor	144
Condita varia	123
Conseruæ	125
Confectio Anacardina	68
Colocynthis præparatio	336
DIANISV Mesuræ	6
Diambra	7
Diathamaron	8
A s Diacalaminthon	

Index

Diacalaminthon	10
Diacalaminthon Galen.	12
Diacyminu	ibidem
Diacinnamomu	13
Dianthus	14
Diamargariton frigidum	15
Diamargariton calidum	16
Diamarenatum simplex	139
Diamarenatum compositum	149
Diamoschu dulce	16
Diamoschu amarum	18
Diagalanga	19
Diapenidion	20
Diaireos Salomonis	21
Diaireos simplex	ibidem
Diatragacanthu frigidum	ibidem
Diatragacanthu calidum	22
Diahyssopu	23
Diacostu	24
Diarhodon abbatis	25
Dialacca maior	26
Diacurcuma maior	28
Diaprasiu	29
Diatrion Sandalon	33
Diaxylo aloes	34
Diatrion pipercon	35
Diazingiber	36
Diacorum	53
Diaolibanu	55
Diacodion Mesuæ	73
Diacodion Actuarii	74
Diacastoriu	75
Diasatyriu Nicolai	91
Diasatyriu Mesuæ	92
Diacitonium	

Compositorum

Diacitonium simplex	126
Diacitonium compositum	127
Diacitonium è succo Citoniorum	128
Diacalsia cum manna	130
Diaprunum compositum	136
Diaprunum compositum laxatiuum	139
Diacatholicon	140
Diaphœnicon	146
Diaphœnicon in forma solida	ibidem
Diasena	147
Diaturbith cum rhabbaro	153
Diaturbith maius	ibidem
Diaturbith minus	154
Diacarthamu	ibidem
Diamoron	233
Diamoron Valerij Cordi	ibidem
Dosis Sacchari ad conseruas	126
Dosis specierum ad lib. vnam Sacchari in cō sectionibus solidis	4
Dosis specierum ad lib. vnam mellis	67
ELECTVARIVM Ducis	36
Electuarium de gemmis	39
Electuarium Iustinum	40
Electuarium letitiæ Galeni	44
Electuarium latifians Rasis	45
Electuarium plurisarcoticon	47
Electuarium diapronias	51
Electuarium resumptiuum	ibidem
Electuarium de baccis Lauri	90
Electuarium lenitiuum	132
Electuarium lenitiuum de Manna	133
Electuarium de Sebeste	135
Electuarium Indum maius	141
Electuarium Indum minus	142
A 6	Electuarium

Index

Electuarium Eleſcoph	149
Electuarium de Pſyllio	150
Electuarium roſatum Meſuæ	151
Electuarium de ſucco roſarum	152
Emplaſtrum Diachylon ſimplex	261
Emplaſtrum Diachylon compositum	262
Emplaſtrum Diachylon magnum	263
Emplaſtrum Diachylon paruum	264
Emplaſtrum de meliloto	ibidem
Emplaſtrum Triapharmacum	266
Emplaſtrum Oxycroceum	267
Emplaſtrum Apoſtolicon	268
Emplaſtrum Apoſtolicon aliud	269
Emplaſtrum album coctum	271
Emplaſtrum Grifeum	ibidem
Emplaſtrum viride	272
Emplaſtrum baſilicum magnum	ibidem
Emplaſtrum de cruſta panis	273
Emplaſtrum de baccis Lauri	ibidem
Eſdræ Antidotus Aëtij	119
Eſdræ Antidotus Aëtuarij	122
Eſulæ præparatio	338
FLORES Caſſiæ fiſtulæ ſolutiæ	129
GERſAM faciendi modus	338
HEPATIS lupini præparatio	339
Hiera picra ſimplex	155
Hiera picra cum agarico	ibidem
Hiera picra composita	156
Hierologodium	ibidem
Hiera Pachij	159
Hiera picra Raſis ad pilulas cochias	172
INFUSIO Roſarum	205
Infuſio violarum	206
Ioleb roſatum	217
Iuleb	

Compositorum

Iuleb violatum	ibidem
L A C C A B ablutio	334
Lithontribon	48
Lohoch sanum & expertum	234
Lohoch de Pino	235
Lohoch de Papauere	236
Lohoch de Scilla	237
Lohoch de pulmone vulpis	238
Lohoch ad asthma	ibidem
M A N V S Christi perlata	23
Medulla prunorum acetos.	136
Medulla Cerasorum	139
Mel rosatum	228
Mel Anacardinum	231
Mel Emblicorum	ibidem
Mel passularum	ibidem
Medullarum præparatio	340
Mezerei præparatio	337
Michleta	79
Mithridatium Damocratis	111
Mithridatiũ ex Cleopatro & Antipatro	114
Mithridatium Andromachi	117
Miua Cydoniorum simplex	227
Miua Cydoniorum aromatica	228
Musa Enea, siue Egetea vel Zarenea	56
N A S A L I A	163
O E S I P V M faciendi modus	340
Oleum ex ligno Iuniperi	302
Oleum ex Iuniperi baccis	303
Oleum Nardinum simplex	ibidem
Oleum Nardinum compositum	304
Oleum Costinum	ibidem
Oleum de piperibus	305
Oleum Mandragoræ	306. & 307
	Oleum

Index

Oleum Mastichinum	308
Oleum de Euphorbio	ibidem
Oleum Castorei	309
Oleum Scorpionum simplex	310
Oleum Scorpionum compositum	ibidem
Oleum Formicarum	311
Oleum Lumbricorum	ibidem
Oleum vulpinum	ibidem
Oleum de Cappare	312
Oleum de Lateribus	313
Oleum de Terebinthina	ibidem
Oleum Tartari	314
Oleum Cytoniorum	ibidem
Oleum Sampsuchinum	315
Oleum Vitellorum ouorum	316
Oleum Hyperici	317
Oleum Irinum	ibidem. & 318
Oleum Moschelinum	320
Oleum Rutæ	321
Oleum Anethinum	322
Oleum Chamæmelinum	323
Oleum Lilinum	ibidem
Oleum Narcissinum	ibidem
Oleum Ligustrinum	324
Oleum Sambucinum	ibidem
Oleum Iasminum	ibidem
Oleum Cheyrium	325
Oleum Myrtillorum	ibidem
Oleum Myrtinum	326
Oleum Menthæ	ibidem
Oleum absinthii	ibidem
Oleum rosaceum	327
Oleum Violaceum	ibidem
Oleum Nymphæatum album	328
Oleum	

Compositorum

Oleum ex Nymphæa citrina	ibidem
Oleum Populinum	ibidem
Oleum Populinum aliud	ibidem
Oleum Amygdalarum dulcium	329
Oleum Amygdalarum amararum	330
Oleum Balaninum	ibidem
Oleum de Cherua	ibidem
Oleum Papaueris	331
Oleum Hyoscyami	ibidem
Oleum Spicæ	ibidem
Oleum Laurinum	332
Oleum Sesaminum	ibidem
Oxyfacchara simplex	212
Oxyfacchara composita	ibidem
Oxymel simplex	229
Oxymel compositum	ibidem
Oxymel Scilliticum simplex	230
Oxymel Silliticum compositum	ibidem
PETROLEVM flauum	332
Petroleum nigrum	333
Philonium maius, siue Romanum	57
Philonium Mesuæ	58
Philonium ex Gale. & Aegineta	59
Philonium Persicum	ibidem
Pilulæ Alephanginæ	164
Pilulæ Assaieret	166
Pilulæ Arabicæ	167
pilulæ Arthriticæ	ibidem
Pilulæ de Agarico	168
Pilulæ Aureæ	169
Pilulæ Aggregatiuæ	170
Pilulæ Benedictæ	171
Pilulæ Cochæ Rafis	ibidem
Pilulæ Colocynthidæ	172
	Pilulæ

Index

Pilulæ ex Eupatorio	173
Pilulæ de Euphorbio	ibidem
Pilulæ fœtidæ maiores	174
Pilulæ fœtidæ Rasis	175
Pilulæ è fumo terræ	176
Pilulæ de hermodactylis	ibidem
Pilulæ Indæ	177
Pilulæ de Hiera simplici	178
Pilulæ de Hiera composita	ibidem
Pilulæ de Hiera cum Agarico	179
Pilulæ de Lapide Lazuli	ibidem
Pilulæ de lapide Armenio	180
Pilulæ de Mezerco	ibidem
Pilulæ lucis maiores	181
Pilulæ lucis minores	182
Pilulæ Mastichinæ	183
Pilulæ Mastichinæ aliæ	ibidem
Pilulæ de aloe, & mastiche	184
Pilulæ de aloe lota	ibidem
Pilulæ de Rhabarbaro	ibidem
Pilulæ pestilenciales	185
Pilulæ è Sarcocolla	ibidem
Pilulæ sine quibus esse nolo	186
Pilulæ Imperiales	188
Pilulæ de Opopanaco	189
Pilulæ de quinque generibus Myrobalano rum	190
Pilulæ de octo rebus	ibidem
Pilulæ de Serapino	191
Pilulæ de Bdellio	192
Pilulæ de Cynoglossa	ibidem
Pilulæ Bechiæ	193
Pilulæ Alephanginæ Valerii Cordi	ibidem
Pilulæ Stomachicæ Alkindi	187
Pilulæ	

Compositorum

Pilulæ stomachicæ Mesuæ	ibidem
Pinguedinum præparatio	340
Plumbi lauatio	335
Pulmonis vulpini præparatio	332
Pulpa Prunorum	136
Pulpa Cerasorum	139
Pulpa Cassiæ fistulæ solut.	129
Pulpa Tamarindorum	130
Puluis ad Epithema cordis	54
Puluis ad Epithema hepatis	55
Puluis medicaminis Turbith	161
Puluis Senæ præparatæ	162
Puluis aut Tragea laxatiua	ibidem
Puluis sternutatorius	163
Puluis ad glandes vel suppositoria	164
REQUIES Nicolai	60
Rosata nouella	50
Rob de ribes compositum	232
Rob de ribes simplex	ibidem
Rob de berberis compositum	ibidem
Rob de berberis simplex	ibidem
Rob Nucum	233
SANGVINIS hirci præparatio	332
Scoriæ præparatio	335
Scammonæ præparatio	336
Sirupus de duabus radicibus	195
Sirupus de quinque radicibus	ibidem
Sirupus acetosus simplex	196
Sirupus acetosus compositus	ibidem
Sirupus acetositatis Citri	197
Sirupus acetositatis Limonum	ibidem
Sirupus Aranciorum acetosorum	198
Sirupus de agresta	ibidem
Sirupus de Pomis	199
Sirupus	

Index

Sirupus Granatorum dulcium	ibidem
Sirupus Granatorum acetosorum	200
Sirupus de Byzantijs simplex	ibidem
Sirupus de Byzantijs compositus	201
Sirupus de Artemisia	ibidem
Sirupus de Absinthio maior	203
Sirupus infusionis Rosarum	204
Sirupus infusionis Violarum	ibidem
Sirupus de fumaria maior	206
Sirupus de Mentha maior	207
Sirupus de Mentha minor	208
Sirupus de Calamintha	ibidem
Sirupus de succo Endiuie	209
Sirupus de Endiuiā compositus	210
Sirupus de Cichorio cum rhabbarbo	211
Sirupus de Iuiubis	213
Sirupus Violarum compositus	214
Sirupus de Succo Violarum	ibidem
Sirupus de Præsis	215
Sirupus de Glycyrrhiza	216
Sirupus de Hysso	217
Sirupus de Eupatorio	ibidem
Sirupus de Stœchade simplex	219
Sirupus de Stœchade compositus	ibidem
Sirupus de Epithymo	220
Sirupus de Nymphæa	221
Sirupus de Succo acetosæ	222
Sirupus de Papauere simplex	223
Sirupus de Papauere compositus	ibidem
Sirupus de succo Myrtillorum	224
Sirupus Myrtinus compositus	ibidem
Sirupus de succo Borraginis	225
Sirupus de succo Buglossæ	ibidem
Sirupus de Lupulo	226
	Spodii

Compositorum

Spodii præparatio	338
Species ad suppositoria	164
Squyllæ præparatio	337
Suppositoria seu glandes	164
TEREBINTHINAM coquere	341
Theriaca Andromachi	94
Theriaca Andromachi senioris	106
Theriaca Diateslaron	110
Tryphera magna	61
Tryphera minor	62
Tryphera Sarracenica	64
Tryphera Persica	66
Trochisci de Vipera	239
Trochisci Scillitici	ibidem
Trochisci Hedychroi	240. 241. & 242
Trochisci Cyphi	244
Trochisci Ramich	245
Trochisci de Cappare	246
Trochisci de Eupatorio	247
Trochisci Diaion	248
Trochisci Diani	ibidem
Trochisci de Lacca	249
Trochisci Diarhodon	250
Trochisci de Rhabarbaro	ibidem
Trochisci de Berberis	251
Trochisci Galliæ Moschatæ	ibidem
Trochisci aliptæ Moschatæ	252
Trochisci de Agarico	ibidem
Trochisci de Myrrha	254
Trochisci Alkekengi	ibid.
Trochisci de Rosis	255
Trochisci de Camphora	256
Trochisci de Terra sigillata	257
Trochisci de Spodio	258
Trochisci	

Index

Trochisci de Absinthio	259
Trochisci Alhandali	ibidem
Trochisci de Caraba	253
Trochisci Bechii albi	260
Trochisci Bechii nigri.	261
VNGVENTVM Agrippæ regis	276
Vnguentum Apostolicum	277
Vnguentum Arogon	278
Vnguentum Martianum	279
Vnguentum Martianum magnum	284
Vnguentum Martianum paruum	288
Vnguentum album	289
Vnguentum Dialthæa simplex	ibidem
Vnguentum Dialthæa compositum	290
Vnguentum Aegyptiacum	291
Vnguentum aureum	ibidem
Vnguentum citrinum	292
Vnguentum Populeon	293
Vnguentum fuscum	295
Vnguentum Diapompolygos	ibidem
Vnguentum Comitilæ	296
Vnguentum de Artanita maius	297
Vnguentum de Artanita minus	299
Vnguentum potabile	300
Vnguentum rosatum Mesuæ	ibidem
Vnguentum pectorale	301
Vnguentum album caphuratum	ibidem
Vnguentum rubeum caphuratum	ibidem.

*Finis Indicis medicamentorum
compositorum.*

INDEX

INDEX SIMPLICIVM

quæ in hoc libro declarantur.

ABSINTHIVM Ro-	Balanus Myrepfica	330
manum 204	Bedeguar	218
Albathera 255	Borax	293
Acorus. 54. 105. & 117	Bræca Vrsina	78. et 282
Acacia 105. & 113	Bunias	103
Acini 297	Buglossa domestica	151
Adiantum nigrum 133	Buglossa vulgaris	226
Agrestia 198	CARDAMOMVM	6
Alapias 78	Carpobalsamus	9
Alleluia 283	Carpobalsami succeda-	
Amomū 72. 105. et 243	nea	10
Amarena Cerasu 139	Calamintha montana	
Amaracus 287	II. & 209	
Amentum dulce 293	Calamintha campestris	
Amylum 20	II. & 209 (103	
Anthophylli 9	Cassia lignea 7. 32. &	
Anguria 135	Calamus Vnguentarius	
Anchusa 319	245	
Anthera 258	Carduncellus	283
Aristolochia tenuis 105	Camphorata	284
& 110	Cathengit	299
Aristolochia rotūda III	Cardina	218
& 311	Centumneruia	282
Arum 338	Camædrys	38
Arceuthides 245	Chamamelum	263
Artanita 298	Chamæpitys	104
Aspalathus 241	Calcitis	104
Aspalathi loco quid 243	Chalcucecacumēos	270
Afarum 25	Cherua	330
BALSAMITA 31.	Cinnamum	319
& 282	Come	103
Baucia 94	Costus	9. & 25
Bardana 294	Condita varia	123
	Conferus	

Index

Conseruæ	125	GlycyrrhiZa	5
Conseruarum faciendæ-		Gluten alchanach	264
rum ratio	126	Granum Ben	330
ConyZa	279	HALVS, aut halum,	
Crocus Cilicius	103	sive alum	75
Cretamus agrestis	124	Herba paralysis	282
Crispula	283	Herba Crassula ibidem	
Crimon	319	Herba Moschata	283
Cyperus rotundus & lō		Herba S. Maria	281
gus	35. & 245	Herba venti	287
Cyāea glycyrrhiZa	109	Herba Thurca	283
Cyminiū Carmenū	173	Helenium	319
Cymbalaris	294	Hypocisthis	73
DAVCVS Creticus		IARVS	279
32. 105. & 110		Iasmini flos	324
Denarius quid	160	Iris Illyrica	62
Dentalium	293	LACRYMA Terebin-	
Diētānus Creticus	103	thi	109
Diētānus vulgaris	195	Lapis Armenus	148
Diploma, id est, vas du		Leurecla	279
plex	303	Lapathiolum	283
ELATERIVM	175	Lepis ChalKu	270
Endiua vera	209	Lingua auis	65
Enthalium	293	Lingua ceruina	287
Esbrium	287	Libanotidis species	117
Eupatoriū	170. et 218	Ligustrum	324
FILIX	299	Libra medicinalis	4
Folium 5. 119. & 241		Limatura auri	10
Folia Caryophyllo.	148	Luph planum, & Luph	
Flos aris	277	crispum	93
GALANGA ruffa	4	MABATHEMATI-	
Galanga magna	5	cum	78
Galle Cypressi	258	Malabaythrū	104. et 109
Gallion	119	Marum	240
Gerfa serpentaria	293	Marathrum	287
		Mamera	

Simplicium

Mamera	223	Opobalsamum	103
Malum terræ	160	Opobalsami succedane-	
Matris sylua	283	um	ibidem
Maturella	ibidem	Opiū in oleo dissolui non	
Mandragora	294	poteſt	308
Men 71.104. &	109	Origanū Persi. 63.173	
Mel Tabarzet	236	PARIETARIA	132
Menthastrum	254	Pelecinus	117
Mētha Saracenica	283	Petroleum 78. &	333
Mira solis	331	Petroselinū Maced. 11	
Moschiacaryon	321	Pha 71. &	109
Moschus	6	Phyllon	122
Mucharus	205	Pimpinella 285. et 287	
Muzus sapor	207	Pip nigrū 11.102. et 103	
Myrrha Troglodytica		Ponderū dispensatio in	
71. & 103		confectionibus	4
Myrthus	289	Polium motanum	103
NARDVS indica		Polytrichon	283
117. & 119		Pompholygos	295
Nardus Celt. 62. et 113		Prasium viride	270
Napus 71. & 94		Propolis	269
Nasturtium album 173		Prunus syluestris	297
Neremisch	46	Pseudodictānus est fra-	
Nerion	122	xinella	125
Nitrum	293	Pulpa seminis Asparagi	
Nigra spina	109	et Rusci debet accipi,	
Nucleus seminiū quid 15		et nō nuclei offei 149	
Nux Indica musc. 321		Pulicaria	279
Nymphaea	222	Pulegium ceruinū	254
OBOLVS quid 117		RAVED seni	170
Ocimum citratum 17		Rha Ponticum	103
Oesypus 264. & 299		Rhodostagma	248
Olusatrum	38	Rhus 75. &	122
Omphacinū oleum 316		Ricinus	330
Onychis	245	Rubus Ideus	234

SAN-

153

Index

SANDALVM ma-	Spina nigra	109	
choriZe	5	Spargula	282
Sampsuchus	240	Spodium	338
Saliunca	10	Squama eris	269
Saccharu tabarZeth	14	Styrax rubea	78.103.
Saxifragia	31.161.et103	252	
Saphyrus	40	Succus Eupato.	28.170
Sarda gemma	ibidem	Suchaba	218
Sal Hammoniacum	78	Succus Borriginis et Ba-	
Sagapenu	90.2105	glosse	225.226
Satyrion	91	Succus Scilla	263
Sanguisorba	346	Syson	122
Schoenanthu	24.27	TAMARISCVS	63
Scoria ferri	64	Testiculi vulpis	93
Scincus	91	Tetrahit	282
Scordion	102	Thamar quid	9
Scariola	26.33.et222	Thus masculum	56
Scolopendriom	247	Thymiana Hämoma-	
Scatuncellum	294	cum	122
Seselios	11.104	Thlaspi	104
Seseli tenue quid	110	Thereniabin	180
Seta cruda	18	Tribuli aquatici	276
Secacul	54.65	Thymbra	13
Seitaragi Indum	65.175	VAS duplex	303
Sextarius	73.287.319	Venter mergi	122
Semen bulbi	91	Vermicularis	294
Semen rosarum	258	Vipera	102.239
Sinonum	32.72	Viscus quercinus	269
Sicilicus	75	Vlmus	262
Sigillum Lemnium	104	Vmbilici marini	293
Sisymbrium	35.et316	Vua lupina	295
Smaragdus	40	ZVRVMBETH	40
Sorba	297		

FINIS.

FINIS.

Ponderum

Ponderum



PONDERA, quibus hodie Medici utuntur, hæc sunt: libra, uncia, quarta, drachma, scrupulus, siliqua: & hæc quidem à Græcis atq; Romanis mutuarunt. Præter hæc sunt alia, quæ à Barbaris atque Arabibus desumpserunt, qualia sunt: manipulus, pugillus, aureus, kist, kirath, & danic, quorum nominibus Mesuen potissimum uti constat. Libra itaque, quæ & pondo etiam dicitur, in duodecim uncias diuiditur. Errant itaque indocti huius ætatis Pharmacopole, qui libram sedecim unciarum, quæ sanè mercatoria ac negociatoria est, in medicamentis conficiendis accipiunt. Ea autem illos uti libra facile ex quartis colligitur, quibus uncias quatuor assignant, quas si quater sumpseris, sedecim prodibunt uncie. Quartam autem libræ partem Latini quadrantem nominant, sicuti tertiam trientem, sextam sextantem. Quadrās itaque, uel (ut nostri loquuntur) quarta, pondus existit trium unciarum. Triens uerò quatuor, ueluti sextans duarum unciarum.

B Porro

Porro uncia, octo drachmas constituit.
 Drachma scrupulos tres. Scrupulum uero, qui Græcis γρᾶμμα dicitur, quasi primum ponderis elementum, nonnulli Scruptulum etiam nominant, habet uero obolos duos. Obolus pendet siliquas quæ Græcis νεφέτια uocantur, tres. Siliquæ itaque sex grana, scrupulum pendent. Vnum uero siliquæ granum, sex lentis seminibus, pondere respondet: quæ si sexies sumpseris, prodibunt in uniuersum triginta sex, quæ scrupulum constituunt. Sic se habent pondera, quæ Græcorum Medici etiam usurparunt. Nunc ad ea quibus Arabes, & recentiores usi sunt ueniamus, inter quæ primum Manipulus nobis occurrit. Sic autem uocant herbarum fasciculum, qui manu deprehendi, & complecti potest. Pugillo autem perperam pro pondere utuntur recentiores, cum sit diminutiuum potius à pugno, qui compressis sit digitis. Aureus, illis pondus unius drachmæ cum dimidia significat. Denic pondus sex granorum. Kirath uero trium.

NOTAB

NOTAE PONDE³ rum, quæ hodie in vfu sunt.

Grani	} Nota est	gr. Ein gren oder gersten Kornle- inſch vver,
Scrupuli		℥. Ein ſcrupel, ein drutteil eius quintilis.
Drachmæ		ʒ. Ein quintle, oder gulden ſchvver.
Vnciæ		ʒ̄. Ein vntz, iſt Zweyloſ.
Quadrantis		quad. Ein quart vi. loſ.
Libræ Semis		lib. Ein pfund. s. Halb.

CONFECTIONES AROMATICAE.

Aromaticum Charyophyllatum, secundum descriptionem Mesuæ.

R. Charyophyllorum 3 vii.
 Macis
 Zedoariæ
 Galangæ
 Sandali Machoziri
 Trochiscorum diarhodon
 Cinnamomi
 Ligni aloës
 Spicæ Indicæ
 Piperis longi
 Cardamomi maioris ana 3 i.
 Rosarum 3 iiii.
 Glycyrrhizæ rasæ
 Gallæ moschatæ veræ ana 3 ii.
 Folii. (sumatur eius loco cassia lignea vera,
 aut duplex pondus Cinnamomi)
 Cubebarum ana 3 ii. gr. v.
 Ambra 3 i.
 Moschi 3 s.
 Sacchari optimi.

IN confectiōibus aromaticis ad lib. vnam pendentem 3 xij. accipiat 3 i. specierum.

MYROPOLAE accipiant in confectiōibus libram continentem 3 xij. & secundum hanc diuidantur 3. & 3 i. pendent xx. grana electa.

GALANGAE, id est, minoris Galangæ et ruffæ, saporis aromatici. Nam affertur hodie noua quedam

Aromaticæ

5

quedam Galanga magna, crassa, foris subruffa in-
tus Zingiberis palliditate & filis, gustu acerrima
sine aromatica aliqua gratia, hæc in nullas confe-
ctiones iniicienda est. Quod semel dixisse satis sit.

SANDALVM Machoziri, est species citrini
sandali, odoratissima, & valde aromatica, tam
gustu quàm odore, & affertur ad nos cum sanda-
lo albo, & citrino vulgari.

GLYCYRRHIZA est dulcis radix, quam ho-
die corrupto nomine Liquiritiam appellant.

FOLIVM nondum allatum est ad nos in Ger-
maniam, quare cum eo carcamus, necesse est eius lo-
co aliquod succedaneum accipere. Est autem eius
succedaneum ut Galenus nobis reliquit, Spica In-
dica, aut Cassia lignea vera. Cum autem hæc con-
fectio alioquin capiat Spicam Indicam, Folij vice,
cassiam ligneam veram accipiendam esse censeo.

MOSCHI scribendum est, nam Musci appella-
tione, arborum villosa canicies dicitur.

¶ Ventriculum & Cor confortat, Nau-
seam & vomitum sedat, & valet contra pu-
trefactionem in partibus ventriculi. Mem-
bra verò nutritionis calefacit, ventositatem
dissoluit & carminat.

Aromaticum Rosatum descriptione Ga- brielis.

R. Rosarum rubearum 3 xv.

Glycyrrhizæ rasæ 3 vii.

Ligni aloës

Sandali Machoziri ana 3 iii.

Cinnamomi electi 3 v.

B 3 Macis

Macis
 Charyophyllorum ana 3 ii. s.
 Gummi Arabici
 Tragacanthæ ana 3 ii. Θ . ii.
 Nucis Muschatae
 Cardamomi minoris
 Galangæ ana 3 i.
 Spicæ Indicæ
 Ambrae griseæ ana Θ ii.
 Moschi Θ i.
 Sacchari.

CARDAMOMI, videlicet minoris. Nam cum simpliciter Cardamomum scribunt, authores minus Cardamomum, id est, usuale intelligunt.

MOSCHI, hoc est, ut vulgò dicitur, corrupto vocabulo, Musci, prout illud aromaticum,

¶ Ventriculo imbecillo aliisq; nutritioni deseruientibus instrumentis succurrit. Ventriculi humiditatem, omnemq; in eo putredinem emendat, concoctionem iuuat, & ex morbo conualescentibus auxiliatur.

Dianisu, secundum descriptionem Mesuæ.

R. Anisi electi 3 xx.
 Glycyrrhizæ rasæ
 Mastiches ana 3 i.
 Carui
 Macis
 Galangæ
 Fœniculi
 Zingiberis. (idem est quod zinziber)
 Cinnamomi ana 3 v.

Macro-

Macropiperis
 Melanopiperis
 Leucopiperis
 Calaminthæ
 Pyrethri
 Cassiæ lignæ veræ ana 3 ii.
 Cardamomi maioris
 Charyophyllorum
 Cubebæ
 Spicæ Indiæ
 Croci ana 3 i. s.
 Sacchari.

MASTICHES, hoc est, ut vulgò dicitur, Masticeis.

CASSIA lignea vera debet accipi, quæ nuper cepit afferri: figura Cinnamomi, gustu aliquantulum lubrica, & Cinnamomi æmula: at non ille parvus cortex saporis insipidi ac stiptici, ut hætenus factum est.

¶ Crassis flatibus in ventriculo natis, eiusdemq; perfrictioni succurrit. Item pituitâ in eo crudâ absorbet, tussiq; diuturnæ prodest.

Diambra, secundû descriptionē Mesuæ.

R. Cinnamomi
 Doronici
 Charyophyllorum
 Macis
 Nucis Muscatæ
 Foli. (aut succedanei eius)
 Galangæ ana 3 iii.
 Spicæ Indiæ

B 4 Car-

Cardamomi maioris
 Cardamomi minoris ana 3 i.
 Zingiberis 3 i. s.
 Sandali citrini
 Ligni aloës
 Piperis longi ana 3 ii.
 Ambræ 3 i.
 Moschi 3 s.
 Sacchari albiſſimi.

¶ Cōtra omnem corporis imbecillitatem
 efficax est, omnemq; corporis perfrictionē
 discutit, natuum suscitāt calorem, & redi-
 uium recreat, refarcitq; eos, qui frigido tor-
 quentur humore, iuuat articulos, & mem-
 bris omnibus magnificē subuenit, ventricu-
 lum fastidientem, quiq; cibum cōtinere non
 potest, roborat, & inappetentiam cibi sum-
 mē corrigit. Cor ipsum roborat.

*Diathamaron, secundum descriptio-
 nem Nicolai.*

R. Anthophyllorum
 Zingiberis ana 3 v. 3 i. gr. xvi.
 Cinnamomi
 Carnium dactylorum
 Charyophyll. ana 3 iiii. 3 i. gr. xvi.
 Galangæ
 Spice Indicæ
 Zedoariæ
 Costi
 Pyrethri
 Corallii albi

Corallii

Aromaticæ

9

Corallii rubei
 Rheupontici . (accipiatur rhabbarum sic
 vocatum)
 Saliuncæ
 Tragacanthæ
 Anacardii
 Ossium dactylorum
 Carpobalsami
 Anisi
 Baccarum Iuniperi
 Leucopiperis
 Macropiperis ana 3 i. ☉ ii. gr. viii.
 Limaturæ auri puri
 Limaturæ argenti meri
 Ossium de corde cerui ana ☉ ii. s.
 Rasuræ Eboris
 Moschi ana ☉ i. gr. vii.
 Ambræ ☉ i.
 Sacchari .

*THAMAR Arabibus dactylum , palmæ arbo-
 ris fructum significat, unde confectiōni nomen Dia-
 thamaron.*

*ANTHOPHYLLI sunt grandes charyophylli,
 qui ad maturitatem peruenerunt , nucleo intus du-
 ro bifidoq; , sapore non tam acres vt charyophylli ,
 præterquam in superficie .*

*COSTI videlicet albi , feruidum & aromati-
 cum saporem habentis . Non vulgaris illius gran-
 dis , qui teterrimum & rancidum saporem habet,
 & adulterinus est , atque ex Heluetiorum alpibus
 & Italia ad nos affertur .*

*CARPOBALSAMI . Non habentur Opobal-
 samum, Carpobalsamum & Xylobalsamum secun-
 dum eorum veram descriptionem : verum cum ex-*

B s perientia

perientia didicerimus, quòd olea Cinnamomi & Charyophyllorum secundum nostram artem destillandi, veteribus ignota, parata, in probis Balsami veri, & virtutibus similia esse. Quare etiam pro opobalsamo, oleum charyophyllorum in theriacam nostram accepimus. Non inconsultum esset, si quis pro Carpobalsamo acciperet Cubebas, aut Charyophylla, siue etiam Cardamomum, aut aliud semine, quod haberet mordacitatem in gustu cum quadam redolentia, secundum Carpobalsami descriptionem, si horum nullum antea esset in descriptione.

SALIUNCA Germanicum est vocabulum, quo significatur Spica Celica vera, quam in Pharmacopolijs Spicam Romanam appellant. Sed in Nicolao Alexandrino Græco, inuenitur loto Saliuncæ Elchysphacum, id est Saluia, præsertim in Aurea Alexandrina.

LIMATVRAE auri & argenti. Cum aurum sic metallicum & valde ponderosum corpus, limatura eius vel scobis, semper fundum petit, nec equaliter confectionibus commiscetur, quare & hic, & reliquis omnibus locis, sumantur folia auri.

¶ Efficaciter prodest difficulter spirantibus, arteriacis, tussientibus, tabidis & omni thoracis & stomachi offensione, aquæ subtercutem suffire, renum doloribus voluptatem parit, corporaque saginat.

Diacalaminthion, secundum descriptionem Mesue.

R. Calaminthæ montanæ
Calaminthæ campestris

Seselios

Seselios

Petroselini Macedonici ana 3 vj.

Zingiberis 3 iii.

Apii, id est feminis Apii

Comarum Thymi ana 3 ii.

Ligustici 3 vi.

Piperis, id est piperis nigri 3 xii.

Sacchari albiſſimi.

CALAMINTHA montana nascitur capiosissime in montibus circa Confluentiam urbem ad Rhenum & Mosellæ confluentes.

CALAMINTHA campestris, hoc est vsualis Calamintha, quæ in aruis nascitur, hæc efficacior est quàm in humidis locis nata, Germanice, Kornmyntz vocatur.

SESELIOS, id est Siselios, quod etiam Siler montanum vocatur.

COMARVM Thymi, id est, summitatum, foliorum & florum Thymi

PETROSELINVM Macedonicum non est Olusatrum, vel ut corruptè pronuntiant Olixatrum aut Alexandrum, semine longo, magno, nigro, amaro ac myrrham emulante sapore. Sed quia iam vero macedonico Petroselino caremus, licet nobis eius loco Olusatrum semen accipere, quod vulgò in Pharmacopolijs Petroselinum Macedonicum, falso tamen, appellatur, donec aliquando verum nobis contingat.

PIPERIS, id est piperis nigri, nam cum piper simpliciter pronuntiamus, semper nigrum intelligimus.

¶ Auxiliatur ijs quos cibi fastidium vrget,
appetentiam reuocans, agrè quoque spiran-
tibus, ventriculo refrigerationem sentien-
ti, & flatibus distento confert.

Diacalaminthon Galeni.

R. Calaminthæ
Pulegii
Petroselini
Seseleos ana ʒ j.
Apii
Cacuminum, Thymi ana ʒ ii.
Libystici feminis ʒ viii.
Piperis ʒ xxiii.
Sacchari.

*Diacyminu, secundum descriptionem
Nicolai.*

R. Cymini pridie præparati, id est, aceto
infusi, & iterum exiccati ʒ viii. ʒ i.
Cinnamomi
Charyophyllorum ana ʒ ii. s.
Melanopiperis
Zingiberis ana ʒ ii. gr. v.
Galangæ
Thymbrae (eius loco sume satureiam.)
Calaminthæ ana ʒ i. ʒ ii.
Ammios
Ligustici ana ʒ i. gr. xviii.
Macropiperis ʒ i.
Spicæ Indicæ

Car-

Cardamomi

Nucis Muscatæ ana ʒ ii. s.

Sacchari.

TYMBRA est propriè *Satureia sylvestris*, circa quam nascitur *Cuscuta Epithymo* similis, quæ *Epithybrum* appellatur. Affertur iam ad nos ex orientalibus partibus, verum rarò, ideoq; in defectu eius satiuam *Tymbra*, hoc est, *Satureiam* accipere nobis licet.

¶ Arteriæ, difficultati spirandi, tussiculosis, inflationibus efficaci est adiumento, noxam ventriculi corrigit, concoctionem adfert, adstrictionum vitia sanat.

Diacinnamomu, secundum descriptionem *Mesue*.

R. Cinnamomi subtilis ʒ xv.

Cinnamomi crassi

Cymini

Enulæ ana ʒ iii.

Galangæ ʒ vii.

Charyophyllorum

Piperis longi

Cardamomi maioris

Cardamomi minoris

Zingiberis

Macis

Nucis Muscatæ

Ligni aloës ana ʒ iii.

Croci ʒ i.

Sacchari taberzeth ʒ v.

Sacchari

Sacchari albilissimi.

SACCHARI *tabarzelh*, id est, purissimi atque optimi Sacchari, cuius 3.℥. miscentur speciebus. idq; idē loco accipitur, ut species eo melius conseruentur ad vsum. Vltimum Saccharum additur cum vis rotulas facere ex speciebus.

¶ Est medicina salubris ad humoresitatem ventriculi & putrefactionem in eo, phlegma digerit, & digestionem adiuuat.

Dianthus, secundum descriptionem Nicolai.

R. Florum Rosmarini ʒ j.
 Violarum
 Rosarum
 Glycyrrhizæ ana 3 ℥.
 Caryophyllorum
 Spicæ Indicæ
 Nucis muscatæ
 Galangæ
 Cinnamomi
 Zingiberis
 Zedoariæ
 Macis
 Ligni aloes
 Cardamomi
 Anisi
 Anethi (videlicet seminis) ana ʒ iiij.
 Sacchari.

¶ Prodest præter rationem tribulatis, cardiacis, animi lætitiā auget. Eos roborat, qui

Aromaticæ

15

qui à longo morbo debiles adhuc sese recol-
ligunt, ventriculum perpulchi è emendat.

*Diamargariton frigidum, secundum de-
scriptionem Nicolai.*

R. Nucleorum seminum Citrulli.

Cucurbitæ

Melonum

Cucumerum

Seminis portulacæ

Papaveris albi

Sandali albi

Sandali Moschatellini. i. Citrini boni odo-
ris

Ligni aloes

Zingiberis

Rolarum rubearum

Florum Nymphææ albæ. i. Nenupharis

Florum Borraginis

Myrtillorum verorum ana 3 i.

Corallii albi

Corallii rubei ana 3 s.

Margaritarum 3 iii.

Sacchari.

*NUCLEVS seminum, est ipsa in medio semi-
num medulla. Sunt autem exigenti horum semi-
num nuclei, cum iam preparanda est confectio hac,
aut alia quæ durare debent, nam diu antè exempti
rancidi fiunt.*

¶ Omnem virium imbecillitatem firmat
iis, quos animus deficit, siue à corde, siue à
stomacho

Stomacho deliquium originem ducat, omnem noxæ causam vitalium partium discutit: insuper asthmaticis, tussientibus, tabidis auxiliatur: longo morbo deiectos, & imbecillitate languentes recreat, & ad pristinum robur conducit.

Diamargariton calidum, secundum descriptionem Auicennæ.

R. Margaritarum non perforatarum
 Pyrethri ana 3 i.
 Zingiberis
 Mastiches ana 3 iiii.
 Zedoariæ
 Doronici
 Seminis apii
 Radicis Thapsiæ
 Cardamomi
 Nucis Muscatæ
 Macis ana 3 ii.
 Been rubei
 Piperis
 Macropiperis ana 3 iii.
 Cinnamomi 3 v.
 Sacchari.

¶ Valet mulieribus, rectificat enim dispositionem matricis, & ventriculorum earum.

Diamoschu dulce, secundum descriptionem Mesuæ.

R. Croci
 Doronici

Zedoariæ

Zedoaria
Ligni aloës
Macis ana 3 ii.
Margaritarum albarum
Setæ crudæ tostæ
Carabæ
Coralii rubei
Galliæ Moschatæ veræ
Ocimi citrati ana 3 ii. s.
Been albi
Been rubei
Folii (aut succedanei eius)
Spicæ Indicæ
Charyophyllorum ana 3 i.
Zingiberis
Cubebæ
Piperis longi ana 3 i. s.
Moschi 3 ii.
Sacchari albi.

OCIMUM citratum non est Melissa, sed species quedam Ocimi siue Basilici, odore Melissæ aut citrei mali, cuius defectu Charyophyllatum Ocimum sumi potest.

¶ Prodest contra cordis palpitationem: ei quoque cui tumultuosa insomnia obuersantur, item his qui incertis tumoribus corripiuntur. Malis cerebri frigidis, vertigini, comitialibus, & difficiliter spirantibus succurrit.

Dia-

Diamoschu amarum, secundum descriptionem Mesue.

R. Croci
 Doronici
 Zedoarie
 Ligni aloes
 Macis ana 3 ii.
 Margaritarum albarum
 Setæ crudæ tostæ
 Carabæ
 Corallii rubei
 Gallie Moschatae veræ
 Ocimi citrati
 Been albi
 Been rubei
 Polii, aut succedanei eius
 Spicæ Indicæ
 Charyophyllorum ana 3 i.
 Zingiberis
 Cubebarum
 Piperis longi ana 3 i. s.
 Moschi 3 ii.
 Absinthii
 Rosarum ana 3 iii.
 Aloes lotæ 3 iii.
 Castorei
 Ligustici ana 3 i.
 Cinnamomi 3 ii. s.
 Sacchari.

SETA cruda tosta significat Serica bombycis
 vellus, nullo colore tinctum, nulloq; humori aut suc-

co

co qui tingendo sit incoctum. Sed tale quale natura
est, siciliq; inditum ac donec conteri possit totum,
aut assatum, vulgo dicitur sericum vsum, quam-
vis comburi non debeat, sed torreretur aut assari tan-
tum.

¶ Hæc confectio valentior est ad ea, quæ
suprà dicta sunt. Et propriè ad exiccandum
humiditates ventriculi, & putrefactiones
eius.

*Diagalanga, secundum descriptionem
Mesue.*

R. Galangæ
Ligni aloes ana 3 vii.
Charyophyllorum
Macis
Ligustici ana 3 ii.
Zingiberis
Macropiperis
Leucopiperis
Calami aromatici
Cinnamomi ana 3 i. s.
Calaminthæ siccæ
Menthæ siccæ
Cardamomi maioris
Spicæ Indicæ
Seminis Apii
Seminis Fœniculi
Seminis Anisi
Seminis Carui ana 3 i.
Sacchari albissimi.

¶ Vale

¶ Valet aduersus crafsiores flatus, acidos
ructus prauamque concoctionem, item a-
ctiones ventriculi & iecoris à frigiditate im-
peditas robustiores reddit, easdemq; emen-
dat.

*Diapenidium, secundum descriptionem
Nicolai.*

R. Penidiarium ʒ ii. 3 .
Pinearum
Amygdalorum dulcium
Amygdalorum amarorum
Papaueris albi ana ʒ iii. ʒ i.
Cinnamomi
Charyophyllorum
Zingiberis
Succi glycyrrhizæ
Tragacanthæ
Gummi Arabici
Amyli candidissimi
Seminis enucleati Cucurbitæ
Citrulli
Cucumeris
Melonis ana ʒ i. s.
Camphoræ gr. vii.
Sacchari albissimi.

AMYLVM hodie corrupto vocabulo dicitur
Amydum.

¶ Valet aduersus omnem thoracis noxā,
tussim à frigore cōtractam, vocis iacturam:
tabidis denique & purulenta excreantibus,
succurit.

Diaireos

in paucis ac tenuis est origo potrenti
hemiēs ac p̄cipuū est. ⁊ eorū mediū obli
et colo. et quo obseruātia reuerētian
iter aliud exēplū. **Q**uanq̄ mibi sunt
de lre tue tñ iucundissime fuere. **S**z
m. ut quāuis mibi añhac car⁹ eras. s.
rissim⁹. **A**d hoc illa duo orationē puer
inimicē respōdentia. quorū alter⁹ est nō
seu nō tantum. alterum est sz etiam
loco etiam posita quoqz. ⁊ aliquibus
exempla subnectam. **H**ec mibi res nō
sed etiam iucunda. **M.** Antonius nō
nis inimicus verumetiam hostis patri
tam ingenio valebat. sed virtute quo
mum. **A**lexander nō solum reliquū or
etiam ⁊ ipsum quoqz romanū imperi
ringere. **E**t tam ⁊ quam quoqz sibi re
cara mibi patria est qm tibi iucunda
hec intelliges. **P**ro eo autem quod ce
suerūt pro nominib⁹ addentes vel
cas adiectiones. **C**icero potius idem
ne ipse ipsa ipsum. ⁊ illorum verē adie
tinet ut ego ipse magis q̄z egomet. tui
vos ipsi illi ipsi ut nunq̄ secus dicendi
Tu mibi familiaris es. ego te fami
mibi amic⁹ es. ego te amico vtor. **T**u
ego te magistro vtor. **E**go tecum frec
quēs mibi tecum est cōsuetudo q̄ sepe
iuricat. **H**abeo tecū magnā amicitia. n

Gummi Arabici \bar{z} i. 3 ii.
 Amyli \bar{z} s.
 Glycyrrhizæ
 Nucleorum seminum Cucurbitæ
 Cucumeris
 Citrulli
 Melonis ana 3 ii.
 Camphoræ \ominus s.
 Penidiarum \bar{z} iii.
 Sacchari albissimi.

¶ Medetur omnibus pulmonum & thora-
 cis vitis aridis, maximè tabidis, macie conse-
 ctis: inflammatione lateris laborantibus, om-
 nibusq; tussibus calidis & siccis, exaspera-
 tioni linguæ & faucium, deuoratum tandiu
 ægrotans in ore contineat, quoad liquefa-
 ctum perfectè exugatur.

*Diatrágacanthu calidum, secundum de-
 scriptionem Nicolai.*

R. Gummi Tragacanthæ
 Hyssopi ana \bar{z} iiii.
 Pineorum nucleorum
 Amygdalorum amborum purgatorum
 Seminis lini ana 3 vi.
 Seminis fœnogræci
 Cinnamomi ana \bar{z} s.
 Glycyrrhizæ rasæ
 Succiglycyrrhizæ
 Zingiberis ana 3 ii.
 Sacchari albi.

¶ Valet

¶ Valet tussientibus ex frigido phlegmate. & non valentibus elicere, althmaticis, empycis, anhelosis, suspiriosis, peripneumoniacis, phthificis, & ad omnem coarctationem pectoris: stomachum confortat, digestionem procurat.

Manus Christi perlata.

R. Sacchari claresacti lib. i.
Aque rosarum lib. s.

CONCOQUANTVR dum aqua Rosacea igni evanescat, & Saccharum iustam crassitiem consequatur, in fine Margaritarum minutissimè triturum ʒ. s. addatur, atque super marmor aqua rosacea inspersum infundatur, & fiant rotulæ.

¶ Medetur deiectis viribus, ardentibus febribus, & imaginationes fallas abolet.

Diahyssopus, secundum descriptionem Nicolai.

R. Hyssopi
Ireos
Thymi
Melanopiperis ana ʒ xxx.
Pulegii
Thymbræ (eius loco sume Satureiam)
Rutæ
Cymini ana ʒ xx.
Carnium dictylorum
Tragacanthæ

Gly-

Glycyrrhizæ

Caricarum pinguium

Passularum enucleatarum

Fœniculi ana 3 x.

Zingiberis

Anisi

Carui

Seminis ligustici ana 3 v.

Sacchari

¶ Hoc accommodatum est ad capitis querelam ex frigido: vnam exiccat, arterias purgat, tussim compescit, omnes frigiditates pectoris & stomachi emendat, digestionem procurat, pleureticis & empycis mirabiliter opitulatur.

*Diacostu, secundum descriptionem Me-
sæ.*

R. Costi candidi aromatici amari

Cassia lignæ veræ

Cinnamomi ana 3 v.

Seminis Apii

Seminis Anisi

Schœnanthi

Rheubarbari ana 3 iii.

Azari 3 iiii.

Croc

Aristolochiæ

Myrrhæ ana 3 ii.

Sacchari.

SCHOENANTHI, hoc e corrupto nomine,
dicunt squinanthum.

COSTI

COSTI AMARI, cępit hęc annis afferi, loco veri Costi adulterinus quidam, qui nequaquam accipiendus est, vt supra dictum est, sed candidus amarus & aromaticus.

AZARI, id est, radicum eius, solę enim radices ad Medicinam accipi debent.

¶ Valet ad dolorem viscerum & oppilationem in eis, & ad principium hydropilis.

Diarhodon Abbatis ex Nicolao.

R. Sandali albi

Sandali rubei ana 3 ii. s.

Tragacanthę

Gummi Arabici

Spodii ana 3 ii.

Azari

Mastiches

Spicę Indicę

Cardamomi

Succi glycyrrhizę

Croci

Xyloaloęs, id est, ligni aloęs

Charyophyllorum

Gallię Molchataę Mesuę

Anisi

Fęniculi

Cinnamomi

Rheubarbari

Seminis ocimi

Berberis, id est, acinorum eius

Seminis scariolę

Seminis portulacę

C

Nu-

Nucleorum seminis Cucurbitæ

Citrulli

Cucumeris

Melonis

Seminis papaveris albi ana \mathfrak{z} i.

Margaritarum

Ossium de corde cerui ana \mathfrak{z} s.Sacchari candi (vt eò melius species conser-
uentur)Rosarum ana \mathfrak{z} i. \mathfrak{z} iii.

Camphoræ gr. vii.

Moschi \mathfrak{z} iii. s.

Sacchari albissimi.

SCARIOLA propriè est Endivia illa vulgaris
quæ in dorso foliorum est spinosa, qui d'autem vera
sit Endivia, ubi locus postulauerit, dicemus.

¶ Valet aduersus ventriculi calorem, ieci-
noris, lienis pulmonumq; contra viscerum
dolores, & omnem totius corporis noxam
à calore proficiscentem.

Dialacca maior, secundum descriptio-
nem Mesuæ.

R. Lacce præparatæ (eius præparatio in fi-
ne habebitur)

Rheubarbari ana \mathfrak{z} iii.

Spicæ Indicæ

Mastiches

Apii

Coliculorum Schœnanthi

Absinthii

Succi

Succi Eupatorii Mesuæ

Ammios

Sabinæ

Amygdalorum amarorum

Costi

Myrrhæ

Rubæ tinctorum

Fœniculi

Anisi

Asiri

Aristolochiæ longæ

Aristolochiæ rotundæ veræ

Gentianæ

Crocī

Cinnamomi

Hyssopti

Cassia lignæ veræ

Summitatum Schœnanthi

Bdellij ana 3 i. s.

Piperis

Zingiberis ana 3 i.

Sacchari albissimi.

COLICVLORVM Schœnanthi, herba hæc aromatica à Grecis dicitur *σχοεινός*, id est, Schœnus, & significat iuncum aromaticum, qui hætenus improprie dictus est squinanthum. Nam Schœnanthum siue *σχοεινός* & *σχοεινός* significat iunci huius aromatici florem, qui non affertur ad nos. In hac autem compositionem ingreditur bis Schœnāthum, hoc quidem loco coliculi aut stipites eius, inferius vero summitates eiusdem.

SVMMITATVM Schœnanthi, id est, florum eius, nam flores in summitate huius herbe constitu-

C 2 ti

ti sunt, & propriè Schœnanthum appellantur: sed quia flores non ad nos feruntur, cogimur tenerri-
mas eius partes in cacumine decerptas eorum vice
medicamentis miscere.

SVCCI Eupatorij, hic succus non debet fieri
ex vulgari Eupatorio, neque ex Eupatorio Græco-
rum, id est, Agrimonia falso hodie vocata, sed ex
Eupatorio quod Mesue describit. Est autem Eupa-
torij Mesue ea herba, quæ ab Italis dicitur Gratia
Dei sue Gratiola, cuius magnus est prouetus Vuit-
temberge in pratis ad Albim fluvium sitis.

¶ Valet aduersus frigus ventriculi, ob-
structiones, inflationes, iecinoris & renum
duritias sanat, aquæ inter cutem causas om-
nes discutit, menses ciet, flatuosos spiritus
ab alto corporis abigit.

Diacurcuma, id est, διακρυκκου maior, secundum descriptionem Mesue.

R. Tragacanthæ 3 i.
Croc
Azari
Petroselini Macedonici
Dauci
Anisi
Apij ana 3 iiij.
Rheubarbari
Meu
Spicæ Indicæ ana 3 vi.
Costi
Myrrhæ
Cassie lignæ veræ

Schœnanthi

Schoenanthi

Carpobalsami (aut aliquod succedaneum vt
superius significatum est)

Rubeæ tinctorum

Succi Absinthij

Succi Eupatorii Mesuæ, id est, Gratiolæ

Opobalsami (aut aliquod succedaneum siue
oleum Caryophyllorum aut aliud cras-
sum odoriferum oleum) ana 3 ii.

Calami aromatici

Cinnamomi ana 3 i. s.

Scordij (videlicet veri)

Scolopendriæ

Succi glycyrrhizæ ana 3 ii. s.

Sacchari albissimi.

¶ Confert ad ægritudines antiquas, &
cachexiam, & hydropisim iuuamentum ma-
nifestum & eradicat ægritudines hepatis &
lienis chronicas, quæ iam induratz sunt, &
confert ad corruptionem stomachi, & hu-
miditatem frigidam, & ventositates grossas
in eis, & ad dolorem renum & vesicæ, & vri-
nam prouocat.

*Diaprasiiu, secundum descriptionem
Nicolai.*

R. Praslij 3 v. s.

Tragacanthæ

Pinearum mundatarum

Amygdalorum dulcium

Pistaciorum

Carnium dactylorum

Caricarum pinguium

C 3 Passularum

Passularum enucleatarum ana 3 iij. s.

Cinnamomi

Charyophyllorum

Nucis Muscate

Macis

Ligni aloes

Galangæ

Spicæ Indicæ

Zingiberis

Zedoariæ

Glycyrrhizæ

Rheupontici

Anacardij

Storacis calamitæ

Galbani

Terebinthinæ

Mastiches

Myrrhæ

Ireos

Aristolochiæ rotundæ

Corticum radicum Capparis

Gentianæ

Melanopiperis

Anisi

Fœuiculi

Anethi

Apij

Petroselini Macedonici

Saxifragiæ ana 3 ii.

Hermodactylorum

Origani

Peucedani

Schœnanthi

Cardamomi

Leucopiperis

Leucopiperis
 Carui
 Ligustici
 Vincetoxici ana 3 i. s. gr. ii. s.
 Balsamitæ
 Pulegii
 Dictamni Cretici
 Costi
 Pyrethri
 Thymbræ
 Basiliconis
 Peoniæ (videlicet radicis eius, aut semi-
 nis)
 Macropiperis
 Amomi
 Sinoni
 Orobi veri ana 3 i. gr. ij. s.
 Xylobalsami (aut succedaneum aliquod si-
 mile descriptioni xylobalsami)
 Cassiæ fistulæ
 Coralli rubei
 Rasuræ Eboris
 Carpobalsami (aut aliquod succedaneum ,
 vt suprâ)
 Dauci Cretici ana 3 s.
 Moschi
 Ambre
 Ossis de corde cerui ana gr. xiiii.
 Sacchari albißimi .

SAXIFRAGIA in Italia dicitur ea herba, quæ
 in Germania Pimpinellam vocamus . Itali habent
 diuersam Pimpinellam .

BALSAMITÆ, Nicolaus Alexandrinus La-

C 4 tñe

tinè impressus non Balsamitam habet, sed Balsamum: significat tamen Balsami vox nonnunquam etiam Mentam, cuius species est Balsamita, hoc loco recipienda. Nam si Balsami liquorem intellexisset Nicolaus, non simpliciter Balsamum, sed opobalsamum posuisset.

SINONYM secundum Matthæum Syluaticum, est Petroselinum agreste. Sed de eo infra in annotationibus Aureæ Alexandrinæ.

CASSIAE fistula nomine hoc loco nequaquam debet intelligi Cassia fistula, cuius nigra medulla bilem per aluum purgat, sed Cassia lignea aromatica, quæ Cinnamomo similis est. Nam hæc etiam apud probatos veteres authores Cassia fistula vocatur.

DAUCVS Creticus hodie ignotus est, ideò possumus eius loco Sefeli Creticum accipere, id est, Beruvuri, aromaticam herbam folijs sæniculi, sed multò minoribus.

¶ Sanat capitis vertigines, oculorum caligines abstergit, palatum & arterias purgat, destillationem vuæ adstringit, dentium dolorem mitigat, asthmaticis & suspiriosis peculiariter opitulatur, pectoris & pulmonis causas faciliè amputat, stomachi & hepatis dolorem & debilitates sedat, spleniticorum & pleureticorum angustias paragorizat, omnium interaneorum vitiis prodest, inflationes & torsiones ab eis aufert. Nephreticos, Calculosos, Stranguriosos & Cholericos purgat, & dolorem releuat: sæpius autem sumptum, colorem pallidum emendat, menses deducit, & in ordinem debitum redigit.

Typo

Typos quotidianarios & quartanarios re-
primit. Qui autem hoc electuario vsus fue-
rit, à multis conseruabitur morbis.

*Diatrion Sandalon, secundum descri-
ptionem Nicolai.*

R. Sandali albi
Sandali rubei
Sandali Citrini
Rosarum
Sacchari ana 3 iii.
Rheubarbari
Spodii
Succi Glycyrrhizæ
Seminis portulacæ ana 3 ii. ☉ s. gr. v.
Amyli
Gummi Arabici
Tragacanthæ
Nucleorum seminis Melonum
Cucumeris
Cucurbitæ
Citrulli
Seminis scariolæ ana 3 i. s.
Camphoræ ☉ i.
Sacchari albissimi.

*SCARIOLA est Endiuia vulgaris, cuius folia
in dorso habent spinulas, vt dictum est supra in
Diarhodon Abbatis.*

¶ Pollet aduersus iecinoris & ventriculi
calorem mirum in modum: tabidis, & regio
morbo correptis itidem prodest.

C s Diaxylo

Diaxylo Aloes, secundum descriptionem Mesuæ.

R. Ligni aloes crudi.
 Rosarum ana ʒ i.
 Charyophyllorum
 Spicæ Indicæ
 Macis
 Nucis Muscatæ
 Galliæ Moschatæ Mesuæ
 Cubebæ
 Cardamomi maioris
 Cardamomi minoris
 Mastiches
 Cinnamomi
 Cyperi
 Schœnanthi
 Zedoariæ
 Been albi
 Been rubei
 Folij, aut Macerum siue spicæ nardi
 Setæ crudæ
 Margaritarum
 Coralli rubei
 Carabæ
 Foliorum citri
 Corticum citrei mali
 Ocimi Charyophyllati
 Silymbrij
 Mentæ siccæ
 Sampsuchi, id est, Maioranæ
 Piperis longi
 Zingiberis ana ʒ iiij.
 Moschi boni ʒ i.

Ambræ

Ambra 3 i. s.

Sacchari albissimi.

CYPERI, videlicet Cyperi rotundi. Nam rotundæ radices Cyperi propriè & simpliciter ab authoribus Cyperus vocantur. Longis verò radicibus Cyperus vocatur ab eisdem Cyperis. quoniam verò non semper rotundum habere licet, neceſſè est in penuria eius, longo uti.

SISYMBRIUM est menta aquatica, nigricantibus et purpureis caulibus.

¶ Prodest malis ventriculi cordis & iecioris frigidis, animæ defectioni, concoctionique. Oris fœtorem abigit, lætitiámque parit.

Diatrion Pipercon Mesuæ.

R. Macropiperis

Melanopiperis

Leucopiperis ana 3 v.

Zingiberis

Thymi

Anisi ana 3 ii.

Spicæ Indicæ

Ammios

Amomi (quod non habetur, & loco eius capiatur carpesium siue cubeba, aut calamus aromaticus, qui pro vero acoro habetur)

Cinnamomi ana 3 i.

Cassia lignæ

Seminis Api

C 6

Seselios

Seselios

Asari

Enule sicce ana 3 s.

Sacchari albissimi.

¶ Refrigerato ventriculo, & acido ructui, quartanis, exolutis, iecinorosis, & inflationibus auxiliatur. Item tussientibus.

Diazingiber, secundum descriptionem Nicolai.

R. Zingiberis

Galangæ

Charyophyllorum

Cinnamomi

Nucis Muscatæ

Granorum paradisi

Piperis longi

Macis

Cardamomi

Spicæ Indicæ

Rheubarbari

Rosarum rubearum ana gr. xv.

Pinearum mundatarum 3 s.

Phisticorum, id est, pistaciorum 3 ii.

Anisi

Fœniculi

Glycyrrhizæ rasæ

Croci ana 3 s.

Sacchari albissimi.

Electuarium Ducis, secundum descriptionem Nicolai.

R. Anisi

Aromaticæ

37

R. Anisi 3 ii. gr. xv.
 Glycyrrhizæ
 Mastiches ana ꝑ ij. gr. v.
 Chamædryos
 Cinnamomi
 Zingiberis
 Galangæ
 Fœniculi
 Carui ana ꝑ i. gr. xv.
 Xylocassia
 Calaminthæ
 Dauci
 Pyrethri
 Piperis albi
 Piperis longi
 Cyperi, idest, rotundi
 Schœnanthi
 Ireos
 Amomi (aut succedaneum eius)
 Folij (aut succedaneum eius)
 Asari ana ꝑ i.
 Spicæ Indicæ
 Croci
 Gummi Arabici
 Tragacanthæ
 Seminis Anethi
 Calami aromatici
 Cubebarum
 Charyophyllorum
 Carpobalsami
 Cardamomi
 Ligustici
 Seminis olusatrici
 Baccarum Iuniperi

Seseli

Sefelios
 Pentaphylli, videlicet radicum eius
 Seminis Asparagi
 Seminis Citri
 Acori aut loco eius Galangæ
 Ammios
 Rheubarbari
 Nucis Myristicæ, id est nucis Muscatæ
 Ligni aloës
 Basilici Charyophyllati
 Milij Solis
 Seminis Saxifragiæ
 Nucleorum seminis Citrulli
 Cucumeris
 Melonis
 Cucurbitæ
 Seminis Scariolæ
 Petroselini Macedonici
 Been albi
 Been rubei
 Storacis calamitæ ana \mathfrak{z} s. gr. 7.
 Penidiorum 3 iiii. \mathfrak{z} ii. s.
 Sacchari albissimi.

*CHAMAEDRYOS videlicet vere, quæ folia
 habet similia quercus, nascitur in montibus Ienæ,
 & inter Herspruck atque Ambergam.*

*OLVSATRI semen, est magnum semen quod
 in omnibus pharmacopolijs dicitur Macedonicum,
 siue Petroselinum Macedonicum.*

¶ Valet ad indigestionem & ventositatem
 stomachi & intestinorum, & ilei dolorem
 & lapidis.

Electuarium

Electuarium de Gemmis, secundum descriptionem Mesuæ.

R. Margaritarum albarum 3 iij.

Saphyri

Hyacinthi

Sardæ

Granatorum

Smaragdi ana 3 i. s.

Zedoariæ

Doronici

Corticum citrei mali

Macis

Seminis ocimi charyophyllati ana 3 ij.

Corallij rubei

Carabæ

Rasuræ Eboris ana 3 i. 3 ij.

Been albi

Been rubei

Charyophyllorum

Zingiberis

Piperis longi

Spicæ Indicæ

Folij (aut succedanei eius)

Croci

Cardamomi maioris ana 3 i.

Trochiscorum diarhodon

Ligni aloes ana 3 v.

Cinnamomi

Galangæ

Zurumbeth ana 3 i. s.

Foliorum auri

Foliorum argenti ana 3 ij.

Ambra 3 ij.

Molchi

Moschi 3 s.
Sacchari albissimi.

SAPHYRVS & Smaragdus, qui passim in Myropolys habentur, nihil valent cum flammam edant in igne, & ex argentifodinis colligantur, quare omittendi sunt, aut loco eorum de Hyacintho & Granato maius pondus sumatur.

SARDA est gemma, quæ Neotericis Carneola vocatur, quod diligenter est notandum. Hætenus enim qualis esset gemma Sarda, ignorauimus omnes.

ZVRVMBETH est species Zedoaria, quæ radicem habet rotundam & globosam, & affertur cum Zedoaria longa.

¶ Malis cordis, ventriculi, cerebri, iecoris, & vteri frigidis auxiliatur. Item palpitationi cordis, defectioni animæ, ac concoctioni, tristitiam denique citra causam, ortam amouet.

Electuarium Iustinum, secundum descriptionem Nicolai.

R. Cinnamomi
Folii (aut succedanei eius)
Costi
Nardi, id est, Spicæ, Indicæ
Cassia lignæ
Aristolochiæ longæ
Aristolochiæ rotundæ
Enulæ Campanæ
Hyssopti

Pulegii

Pulegii
Artemisiæ
Pentaphylli (videlicet radicis eius)
Leucopiperis
Orobi veri
Petrosellini
Leuistici
Olusatris, idest, Petrosellini Macedonici vo-
cati
Seminis vrticæ
Mili Solis
Saxifragiæ seminis (sumatur eius loco semē
pimpinellæ nostræ)
Baccarum Iuniperi
Seminis Asparagi
Sileris montani
Seminis Apii
Seminis Anethi
Seminis rutæ
Seminis Citrei mali
Seminis Fœniculi
Seminis Anisi
Baccarum Lauri ana ʒ i. s.
Sacchari albiſſimi.

¶ Valet ad dolorem renum, calculos fran-
git, & arenam expellit, ac stranguriam dis-
solvit.

Confectio liberantis.

R. Radicum tormentillæ
Seminis acetosæ
Endiuicæ

Coriandri

Coriandri præparati
 Citrei mali ana 3 i. s.
 Sandalorum omnium
 Dictamni albi ana 3 i.
 Boli armeni præparati
 Terræ sigillatæ (loco eius bolus leuanticus,
 id est, orientalis fumatur) ana 3 iiii.
 Margaritarum
 Corallii albi
 Corallii rubei
 Carabæ
 Rasuræ Eboris
 Spodii, id est, Eboris vsti, de quo in fine
 Ossium de corde cerui
 Been albi
 Been rubei
 Doronici
 Cardamomi
 Cinnamomi
 Macis
 Ligni aloës
 Cassiæ lignæ aut succedaneum eius
 Croci
 Zedoariæ ana 3. s.
 Smaragdi (loco eius hyacinthi aut granati)
 Hyacinthi
 Granati
 Serici crudi torrefacti, & incisi ana 3 i.
 Penidii
 Sacchari candi ana 3 ii.
 Florum Nenupharis, id est, Nymphææ
 Buglossæ
 Rosarum ana 3 i.
 Camphoræ gr. vii. Moschi

Moschi

Ambræ ana gr. iii.

Sacchari albissimi.

¶ Contra pestem plurimum valet, tutatur corpus ne lædatur à pestifero aere, & præseruat humores à corruptione.

Confectio cordialis.

R. Margaritarum

Spodij (id est, Eboris vsti)

Granatorum verorum

Cinnamomi

Tomentillæ

Boli armeni ana 3 iii.

Sandalorum omnium

Rasuræ Eboris

Vnicornu ana 3 ij.

Hyacinthorum

Saphyri (loco eius maius pondus Hyacinthi)

Coralli albi

Coralli rubei

Charabæ albi

Valerianæ veræ

Distamni

Zedoariæ

Ligni aloes ana 3 i.

Terræ sigillatæ (aut boli leuanticæ, hoc est, orientalis) 3 i. ʒ ii.

Serici crudi, modicum torrefacti ʒ ii.

Ossium de corde cerui ʒ i. s.

Been albi

Been

Been rubei ana ℥ ii.
 Foliorum auri fini numero v.
 Moschi
 Ambre ana gr. x.
 Sacchari albissimi.

¶ Præseruat cor in peste.

*Electuarium letitiæ Galeni ex Nicomæ
 lao.*

R. Florum ocimi Charyophyllati
 Croci
 Zedoariæ
 Xylobalsami, pro quo lignum aloes, quum
 in ista descriptione non habeatur
 Charyophyllorum
 Corticum citrei mali
 Galangæ
 Macis
 Nucis Muscatæ
 Storacis Calamitæ ana 3 ij. s.
 Anisi
 Rasuræ Eboris
 Thymi
 Epithymi ana 3 i.
 Camphoræ
 Moschi
 Ambre
 Margaritarum perforatarum
 Ossium de corde cerui ana 3 s.
 Auri foliati meri, id est, purissimis seingolo
 Argenti foliati meri ana ℥ i.
 Sacchari albissimi.

Fiat

Fiat confectio solida.

Si verò volueris facere in forma liquida siue
opiatæ, tunc adde

Succi Cydoniorum

Pomorum odoratorum dulcium

Borraginis

Vini veteris optimi, ana partes æquales
in tanta mensura, quanta despumando & de-
coquendo saccharo satisfuerit. Nulla enim
aqua saccharum dissolui aut decoqui ad spissitudinem debet in hac confectioe.

¶ Lætitiâ colorisq̃ue bonitatem efficit,
concoctionem iuuat, & caniciem arcet.

Electuarium latificans Rasis.

R. Seminis Mellissę

Corticum citrei mali

Caryophyllorum

Gallæ moschatæ Mesuæ

Mastiches

Croci

Cinnamomi

Nucis Muschatæ

Cardamomi maioris

Neremilch, pro quo potest semen pæoniæ
accipi

Been albi

Been rubei

Zedoariæ

Doronici

Seminis ocimi

Seminis ocimi Caryophyllati ana ʒ s.
℥ i.

☉ i. gr. iiij.
Sacchari albiſſimi.

Fiat conſectio in tabulis.

Si verò volueris facere in liquid a forma,
vt decet, tunc prædictas ſpecies ſequenti Sy-
rupo miſce, & fac in modum opiatæ.

R. Myrobalanorum Chebulornm, nume-
ro XL.

Emblicorum, numero LX.

Aquæ lib. vi. aut quantum ſufficit. Co-
quantur trita Myrobalani in prædicta aqua
donec remaneat tertia pars, deinde cola. Co-
laturę adde mellis deſpumati lib. ij. loco præ-
dicti Sacchari, bulliat poſtea, vſque ad iuſta
ſpiſitudinem, & inſperge ſpecies prædictas,
poſtquàm feruor Syrupi remiſſior factus
fuerit.

NEREMISCH, apud Raſim eſt Roſa aſinina.
Auerrois autẽ interpres dicit, Pæoniam eſſe roſam
aſinorum, ergo ſecundum hunc Neremiſch, idem
eſſet quod Pæonia: niſi Raſis de vtraque, id eſt, de
Neremiſch, & de Pæonia, duo propria faceret ca-
pitula, tanquam de rebus diuerſis. Certò igitur ſta-
tuere non poſſumus, quid ſit Neremiſch.

☉ Confortat omnia membra principalia,
ex quibus virtutes manant naturales & ani-
males, iuuat calorem naturalem & ſpiritum
viuificat, compescit malas cogitationes, &
bonos mores, lætitiã & gaudium gignit.

Electuarium

Electuarium Plirisarcoticum (ᾠληρη-
σαρκωτικὸν) *secundum descriptionem*
Nicolai.

R. Cinnamomi
Charyophyllorum
Ligni aloes
Galangæ
Spicæ Indicæ
Nucis muscatæ
Zingiberis
Spodii
Schœnanthi
Cyperii
Rosarum
Violarum ana 3 i. gr. xv.
Folii, loco ipsius Macis sumatur.
Glycyrrhizæ
Mastiches
Styracis calamitæ
Sampsuchi, id est, Maioranæ
Balsamitæ
Ocimi
Cardamomi
Macropiperis
Leucopiperis
Myrtillorum
Cortices Citrei mali ana 3 ii. gr. xv.
Margaritarum splendorum
Been albi
Been rubei
Corallii rubei
Serici tosti ana 3 i. gr. ii. s.
Moschi

Mofchi gr. vii. s.
 Camphoræ gr. v.
 Sacchari albiffimi.

¶ Triftibus, melancholicis, imbecillo ven-
 triculo, deliquio animi à corde proficifcen-
 ti fuccurrit. Memoriam amiffam recupe-
 rat, fensus acuit, comitialibus, & affhma-
 ticus prodeft, omnemque cerebri debilita-
 tem aufert.

Lithontribon, fecundum descriptionem Nicolai.

R. Spicæ Indicæ
 Zingiberis
 Xylobalfami (aut ligni aloës vt fupra)
 Acori (fiue calami aromatici)
 Cinnamomi
 Peucedani (videlicet radicis eius)
 Meu (loco eius accipe fefeli cretici radicem,
 id eft, *Bervvurtz*)
 Melanopiperis
 Macropiperis
 Leucopiperis
 Saxifragiæ ana 3 ii. s.
 Opobalfami (loco eius fumatur oleum Iu-
 niperi ex granis)
 Charyophyllorum
 Cofti
 Rheupontici
 Glycyrrhizæ
 Cyperi
 Tragacanthæ

Seminis

Aromaticæ

49

Seminis olusatrici, id est, semen quod Macedonicum vocant

Chamædryos

Seminis Apii

Amnios

Seminis Asparagi

Ocimi

Vrticæ

Citrei mali ana 3 i. gr. xv.

Folii (aut succedanei eius)

Croci

Schœnanthi

Lignæ Cassiæ (aut succedanei eius)

Bdellii

Mastiches

Ireos

Amomi

Ligustici

Mithi folis

Petroselinæ Macedonici

Seseli

Sinoni (de quo suprâ)

Cardamomi

Anethi

Euphorbii

Lapidis Lyncis

Olei Nardini

Olei Moschellini ana 3 i.

Sacchari albisimi.

Si volueris facere in forma Opiatæ, tunc speciebus adde triplum mellis despumati, loco sacchari: diutius enim durant species mel le exceptæ quàm saccharo, potest tamen vtroque modo fieri.

D Olei

OLEI Moschellini preparatio infra habebitur.

¶ Præclarum ad indigestionem stomachi ex frigidityte: iliorum lumborumque dolo- rem compescit: lapides in renibus & vesica potenter confringit, & inde mirabiliter expellit. Stranguriam & dysuriam e vestigio soluit.

Rosata nouella, secundum descriptionem Nicolai.

R. Rosarum
Sacchari
Glycyrrhizæ ana ʒ i. ʒ i. ʒ ii s.
Cinnamomi ʒ ii. ʒ ii. gr. ii.
Charyophyllorum
Nardi, id est, Spicæ Indicæ
Zingiberis
Galangæ
Nucis Muscatæ
Zedoariæ
Storacis calamitæ
Cardamomi
Seminis Apij ana ʒ i. gr. viii.
Sacchari albissimi.

¶ Confert apprimè calori & siccitati stomachi, cordis, hepatis & pulmonis: sitim compescit & vomitum, abscindit debilitatē stomachi, astringit laxa. Cardiacis subuenit, sudorem diaphoreticum reprimat, ex chronica infirmitate debiles recreat.

Electuarium

Electuarium Diapæonias.

R. Radicum pæoniæ ʒ i.
 Macis
 Spicæ Indicæ
 Croci
 Corallorum rubeorum
 Margaritarum non perforatarum
 Mastiches ana 3 s.
 Myrtillorum verorum 3 i. s.
 Cinnamomi
 Nucis Muscatæ
 Caryophyllorum
 Folij, loco eius Cassiæ lignæ veræ
 Zingiberis
 Piperis longi
 Cardamomi
 Granorum paradisi ana 3 ii.
 Glycyrrhizæ 3 v.
 Anacardij 3 i. s.
 Moschi
 Ambræ ana gr. vi.
 Sacchari albissimi.

Fiat confectio in tabulis in æstate.

In hyeme verò adde speciebus triplum mel-
lis despumati, & conficiatur electuarium.

¶ Confet epilepsiæ.

*Electuarium resumptiuum, secundum
descriptionem Nicolai.*

R. Rosarum

D 2 Gly-

Glycyrrhizæ
 Sacchari ana 3 ii. gr. v.
 Gummi Arabici
 Tragacanthæ ana 3 ii. Θ ii.
 Sandali albi
 Sandali rubei ana 3 i. Θ i.
 Papaueris albi
 Succiglycyrrhizæ
 Amyli
 Seminis portulacæ
 Lactucæ
 Scariolæ ana 3 iii.
 Charyophyllorum
 Spodii, pro eo Eboris vsti
 Cinnamomi ana 3 i.
 Zedoariæ
 Zingiberis
 Styrcis calamitæ ana 3 ii
 Croci gr. xv.
 Penidorum \bar{s} s.
 Nucleorum seminis Cucurbitæ
 Citrulli
 Cucumeris
 Melonis ana 3 ii.
 Seminis Cydoniorum Θ ii.
 Amygdalorum dulcium
 Pineorum nucleorum
 Berberis
 Seminis Maluæ
 Seminis Cori siue Bombacis
 Seminis violarum
 Sebesten ana 3 ii.
 Cum Syrupi violati quâtitate sufficienti fiat
 Electuarium

¶ Restaurat

¶ Restaurat humiditatem radicalem, lenit, humectat, nutrit, & confortat, aperit poros, obstitit cholerae, sedat febrem, tussim, & sitim: restituit integras vires, & pristinam sanitatem extenuatis, consumptis & hecticis.

Diacorum, secundum descriptionem Mesue

R. Radicum Secacul

Acori

Pinearum ana. lib. j. s.

Radices Secacul mūdātæ & incisæ coquantur in aqua clara, donec aqua consumatur, postea optimè pistentur, & in minutissimas partes conterantur donec pulti similes fiant. Deinde affunde eis Mellis odorati & optimè despumati lib. x. coquantur lento igne, donec tota aqua, quam radices Secacul imbibebunt, in vaporem resoluta sit, diligenter agitando, ne ad vasis fundum aduratur radices. Cum autem iustæ spissitudinis cōsistentiam acquisuerit, ab igne deponito, & adde radices Acori tenuissimè tritas, & pineas minutissimè incisas.

Cum subsequenti puluere optimè mistas.

R. Piperis ʒ i.

Piperis longi

Caryophyllorum

Zingiberis

Rosarum

Macis ana ʒ iiii.

Nucis Muscatæ

D ʒ Galangæ

Galangæ

Cardamomi ana 3 iii.

Omnia ista simul cum melle & radicibus
Secacul misceto & vnito, diligenter agitan-
do ne grumi aliqui relinquantur.

SECACVL verum est Sifer, quod Germani vo-
cant Gritzelmoren, & Klingelmoren, Galli Es-
cheruis & Seruiles, Bauari Nudle, Sueni Geyrle.

ACORVS, id est, vulgò vocatus Calamus aro-
maticus. Mesue iubet etiam Acori radices elixari.
Sed quia nos recentes & virides non habemus, ut
ej qui in calidis regionibus habitant, ideò melius est
eas tritas melli admiscere.

¶ Cōfert mirum in modū ægreditudinibus
neruorum, acuit omnes sensus & ingenium,
sedat dolores capitis, est peculiare remediū
frigidarum ægreditudinum, senum, & maxi-
mè catarrhi.

Puluis ad epithema Cordis.

R. Sandali rubei 3 i

Corticum citrei mali

Sandali albi

Rosarum

Corallii albi

Corallii rubei

Carabæ

Spodii (accipe Eboris vsti) ana 3 s.

Osis cordis Ceruini

Croci ana 3 i.

Specierum lætitæ Galeni.

Specierum

Aromaticæ

58

Specierum Electuarij de gemmis

Specierum Diamargariton ana \ominus iiii.

Camphoræ \ominus j.

In puluerem redactæ species commisceantur.

Puluis ad Epithema hepatis.

R. Rosarum

Sandali albi

Sandali rubei

Absinthij

Schœnanthi

Spodij, pro eo Eboris vsti

Spicæ Indicæ ana $\bar{3}$ s.

Contrita in puluerem misce & repone.

CONFECTIONES OPIATÆ.

Diaolibanu, secundam descriptionem Nicolai.

R. Castorei

Opij

Hyoscyami albi ana 3 iiii.

Cassia lignæ 3 ij. \ominus ij.

Folij, aut succedanea eorum

Croci

Thuris masculi ana 3 ij.

Rheupontici

Amomi, pro quo carpesiū ana 3 j. \ominus ii.

D 4

Myrrhæ

Myrrhæ 3 i. s.
 Spicæ Indicæ
 Pyrethri
 Euphorbii
 Leucopiperis ana 3 ii. s.
 Præoniæ
 Styracis calamitæ
 Macropiperis ana 3 i.
 Mellis despumati triplex pondus.

EST verò observandum in omnibus opiatīs, ut singulis vniq; specierum misceantur tres uncie mellis despumati. Si minus fuerit, exiccatur confectio facile. Si verò plus addatur, vires eius disperguntur.

THVS Masculum, est Thus album aut flavum purissimum in globulos rotundos singulos, aut testiculorum figura geminos concretum, ideoq; Masculi cognomen accepit.

¶ Vtile est ad diuersas passiones capitis, he micranicum dolorem placat & supercili lacrymas potenter stringit, fauces rheumatizatas & arterias lenit, hæmoptoicis & tussientibus medetur, vomitum compescit, dolorem stomachi & nausæa aufert. Peripneumoniacis, pleureticis, empycis sine dubio subuenit. Gonorrhœam, & satyriasmem emendat, & menstrualem sanguinem sistit.

Musa Enea siue Zarenea, uel Egetea, secundum descriptionem Mesuæ.

R. Castorei

Myrrhæ

Myrrhæ

Opii

Melanopiperis

Macropiperis

Galbani

Coffi

Cinnamomi

Phu

Meu (aut loco eius Sefeli Creticum, id est,
Βερνυρι?)

Dauci

Asari

Croci

ana 3 iiii.

Mellis despumati optimi triplex pondus.

¶ Valet ad omnes passiones frigidas & ventositates crassas, & dolorem dentium & corrosionem eorum, & ad frigus stomachi, & tarditatem digestionis, & colicam, & difficultatem urinæ, & ad frigus & phlegma, & ad mucositatem urinæ.

Philonium Maius siue Romanum, secundum descriptionem Nicolai.

R. Leucopiperis

Hyoscyami albi, id est, seminis eius ana
3 iiii.

Opii 3 ii. s.

Cassie lignæ, aut saccidanei eius 3 i. s.

Seminis Apii 3 i.

Petroselini Macedonici

Foeniculi

Dauci Cretici

ana 3 i. gr. v.

D s Croci

Croci 3 s.
 Spicæ Indicæ
 Pyrethri
 Zedoariæ ana 3 s. gr. v.
 Cinnamomi 3 i. s.
 Euphorbii
 Costi ana 3 i.

Mellis despumati optimi triplex pondus.

Pro Dauco Cretico, accipere, licet Sese-
 li Creticum, id est, *Beryvuri* ζ.

¶ Emendat tussim cum vino mulso obla-
 tum, peripneumoniam cum hydromelite;
 sanguinis sputum cum polygoniæ succo;
 Indigestionem stomachi & vomitum cum
 posca, dolorem hepatis cum œnomelite cu-
 rat. spleneticis & auriginosis cum oxymeli-
 te subuenit. Cœliacis cum apozemate pega-
 ni, pleureticis, iliosis, nephreticis, & ves-
 icæ symptomatis cholericis medetur.

*Philonium, secundum descriptionem
 Mesuæ.*

R. Piperis albi
 Seminis hyoscyami albi ana 3 xx.
 Opii 3 x.
 Croci 3 v.
 Spicæ nardi Indicæ
 Pyrethri
 Castorei ana 3 i.

Mellis despumati optimi triplum pondus

¶ Mirum in modum mitigat dolores,
 præcipuè stomachi, matricis, laterum, to-
 tius ventris, & colicam cum decoctione
 cha-

55

Philonium ex Galeno & Aegineta.

Philonium Persicum, secundum descri-
ptionem Mesue.

D 6 prà)

prà) ana 3 x.
 Lapidis hæmatitis
 Croci ana 3 v.
 Castorei
 Spicæ Indicæ
 Fuphorbii
 Pyrethri
 Margaritarum
 Carabæ
 Zedoariæ
 Doronici
 Trochiscorum Ramich ana 3 i. de qui-
 bus infra

Camphoræ ☉ i.
 Mellis rosati optimi triplum.
 ¶ Inuentum est ad retinendum sanguinem
 menstruorum, hæmorrhoidarum, fluxum
 ventris, vomitum, & sputum sanguineum,
 præsertim si cum succo plantaginis dissolu-
 tum bibatur, & ad fluxum menstruorū mit-
 tatur in vuluam, & ad fluxum sanguinis ex-
 coriatium clysterizetur. Consolidat fer-
 mē vlcera & venas, & nihil est quod magis
 & tutius præseruet ab abortu prægnantem
 grauidam.

Requies Nicolai.

R. Rosarum
 Violarum ana 3 iii.
 Opii
 Hyoscyami
 Papaueris (videlicet albi).
 Mandragoræ (videlicet corticū radicis eius)
 Scariolæ

Scariolæ, videlicet seminis

Lactuæ, videlicet seminis

Seminis portulacæ.

Pŷylli

Nucis Muscatæ

Cinnamomi

Sacchari ana 3 i. s.

Sandali albi

Sandali Citrini

Sandali rubei

Podii

Tragacanthæ ana 3 ii. gr. v.

Mellis despumati optimi triplum.

¶ Requies dicitur, quia requiem accipien-
tibus præstat. Maximè typica febricitanti-
bus quotidianariis, tertianariis, quartana-
riis, acutis & peracutis.

*Tryphera magna, secundum descri-
ptionem Nicolai.*

R. Opii 3 ii.

Cinnamomi

Charyophyllorum

Galangæ

Spicæ Indiæ.

Zedoariæ

Zingiberis

Costi

Storacis calamitæ

Calami aromatici

Cyperi

Iridis Illyricæ

Peucedani

Peucedani
 Acori aut calami aromatici
 Mandragoræ
 Nardi Celticæ
 Rosarum
 Piperis
 Anisi
 Apij
 Petrosellini Macedonici
 Fœniculi
 Dauci
 Hyoscyami
 Cymini
 Ocimi ana 3 j.
 Mellis despumati optimi triplum.

IRIS ILLYRICA, est eadem quæ in Pharmacopolys dicitur Ireos.

NARDVS Celtica siue Spica Celtica & Salunca est eadem herba, quæ in Pharmacopolys dicitur Spica Romana.

¶ Auxiliatur dolori stomachi ex frigidityte, & cùm accepta fuerit, statim patientem ad sudorem prouocat, phreneticis & mulieribus quæ ex melancholia de matrice insomnes sunt, rheumaticis, peripneumonicis, & qui excernunt excrementa cum sanguine, utilissima est.

Tryphera minor Fœnonis.

R. Myrobalanorum Chebulorum]
 Bellericorum

Indorum

Indorum.

Embllicorum

Nucis muscatae ana 3

Nallurtii

Asari

Origani Persici

Piperis

Olibani

Ammios

Zingiberis

Fructus Tamarisci satiuæ

Nardi Indicæ

Schœnanthi

Cyperi ana 3 iiii.

Scoriæ ferri, quinque diebus in aceto mace-
ratae, & deinde tostæ 3 xx.Myrobalani cum butyro recenti non salito
assentur modicū, reliqua oleo amygdali-
no dulci inuoluantur, deinde addantur

Moschi 3 i.

Mellis dispumati triplex pondus.

Oportet autem diligenter attendere, ne My-
robalani cōburiātur cū in butyro assantur

ORIGANVM Persicum idem est quod origa-
num orientale: nascitur etiam in Greta insula, &
Græcia: habet autem surculos, capitula, folia, &
ramulos maiorane similia, saporem vero inter sa-
tureiam & dictamnnum Creticum medium, estq;
valde odoratum & aromaticum. affertur ex orien-
te in Italiam: loco autem eius accipere licet Dicta-
mnnum Creticum verum.

TAMARISCVS sativa arbor est procera. Sed
ea nos caremus, ideoq; cogimur loco eius nostratis
Tamarisci

Tamarisci folijs uti.

SCORIA ferri propriè significat ferri recre-
mentum, id est, *eysen chlacken*. Sed hoc non debet
hoc loco accipi, sed Squama aut Batitura ferri opti-
mi aut chalybis, quam Græci Stomoma appellant.

¶ Valet ad corruptionem & exuberan-
tiam menstruorum, & hæmorrhoidarum,
& ad corruptionem formæ, & debilitatem
stomachi, & destruit humorem crudum, &
clarificat colorem, & confortat vesicam, &
abscindit fluxum ventris.

*Tryphera Sarracenica, secundum de-
scriptionem Mesue.*

R. Myrobalanorum Chebulorum
Indorum

Bellericorum

Emblicorum

Citrinorum

ana ʒ. i.

Cinnamomi

Leucopiperis

Macropiperis

Melanopiperis

Secacul, id est, Siferis ut supra

Foli (aut succedanei)

Spicæ

Cardamomi maioris

Cardamomi minoris

Cassie lignæ (aut succedanum eius)

Seitaragi Indi

Cyper

Api

Lingæ

Linguae auis
 Charyophyllorum
 Been albi
 Been rubei
 Zingiberis ana 3 ii.
 Spicæ
 Nucis maseata
 Macis
 Sefami excorticati ana 3 iii.
 Amygdalorum dulcium
 Amygdalorum amarorum ana 3 v.
 Ligni aloës
 Rhabarbari
 Rutæ
 Seminis Fœniculi
 Mastiches ana 3 ii.
 Ocimi Charyophyllati
 Menthæ siccæ
 Origani Persici (eius loco dictamnium Cre-
 ticum accipe) ana 3 i. s.
 Fricetur Myrobalani tritæ cum butyro vac-
 cino recenti & non salito, aliæ verò species
 cum oleo Amygdalino dulci & cōfice cum
 mellis despumati optimi triplo.

SECCACVL non est Iringus, neque Iringus qui
 habet folia Cretani marini, neque sigillum Salo-
 monis. Sed verum Secacul est veterum Sisar, hoc
 est, radix illa quæ Germanice dicitur Klingelmorn,
 Grinzelmorn, Nudlen, & Geyrlen, Gallice Es-
 cherus & Seruilles.

LINGVA auis est semen fraxini.

SEITARAGI Indum, est herba Nasturtii odo-
 re & sapore, folijs longis, radice similis eius her-
 bæ,

*ba, quam Merretich vocant, Germanicè dicitur
Pfeffervurtz.*

¶ Concoctionem ventriculi & hepatis suo
calore iuuat, ob id flatus dissipat, humores
in ventriculo & alijs visceribus putres absu-
mit: oris & corporis odorem & colorem
commendat, lassitudinem tollit, sanitatem
præsentem tuetur, & morborum genera-
tionem prohibet, venerem auget, hæmor-
rhoides sanat. datur 3 i. ad 3 iii.

*Tryphera Persica, secundum descri-
ptionem Mesuæ.*

R. Succorum Solatri aut Solani
Endiuæ veræ & fatiæ
Apii
Lupulorum depuratorum ana lib. i.
Proijciantur desuper
Violarum siccarum aut viridium 3 iii.
Folliculorum Senæ 3 ii.
Agarici 3 i.
Prunorum Damascenorum pinguium nu-
mero xv.
Cuscutæ 3 s.
Myrobalanorum Citrinorum
Chebulorum
Indorum fricatorum in oleo violarum
aut amygdalorum dulcium ana 3 ii.
Spice Indicæ 3 iii.
Bulliant molliusculo igne donec supersint
lib. ij. Et iniiciantur
Epithymi 3 xl.

Bulliant

Bulliant leuiter, deinde ab igne deponantur
& percolentur, atque dissoluantur in vna
parte istius percolati

Thamarindorum recentium $\bar{3}$ iii.

Mannæ electæ $\bar{3}$ i. s.

Pulpæ Cassiæ $\bar{3}$ iii.

Sacchari violati lib. i.

Percolentur & mundetur à granis & for-
dibus, atque in aliam aquæ partem proii-
ciantur.

Sacchari albissimi lib. iii.

Aceti vini lib. i.

Coquatur leuiusculo igne, deinde proii-
ciantur super illud quod dissolutum est in
succis, & aggregentur simul in vnum, atque
coquantur donec mellis crassitiem obtineant
postremò in puluerem redactę sequentes spe-
cies inspergantur.

Rhabarbari optimi $\bar{3}$ ii.

Myrobalanorum Citrinorum $\bar{3}$ i. s.

Myrobalanorum Chebulorum

Indorum ana $\bar{3}$ i.

Myrobalanorum Bellericorum

Emblicorum ana 3 iii.

Seminis fumi terræ

Trochiscorum diarhodon

Macis

Mastiches

Cubebæ

Spodii (loco eius Eboris vsti)

Sandali Citrini ana $\bar{3}$ ii. s.

Nucleorum seminis Cucurbitæ

Citrulli

Cucumeris

Cucumeris

Melonis ana 3 i. s.

Spicæ Indicæ 3 ii.

Anisi 3 iii.

Inuoluantur in oleo violato, & reponantur in vase vitreo.

¶ Confert febribus acutis & inflammationi stomachi & hepatis, ictericis calidis, de opilatione incolumitatem acquirit, visum à fumis cholericis deperditum reparat. Stitum mitigat, morbos adustionis fieri prohibet.

Confectio Anacardina, secundum descriptionem Mesuæ.

R. Piperis nigri

Piperis longi

Myrobalanorum Chebulorum

Emblicorum

Belliricorum

Indorum

Castorei ana 3 ii.

Costi

Anacardii

Sacchari Taberzeth

Seminis Eruce

Baccarum lauri ana 3 vi.

Cyperii 3 iii.

Anacardi per se terantur, & alis tritis admisceantur, deinde omnia conficiantur cum Butyri recentis non saliti.

Mellis despumati ana 5 v. s.

¶ Est

¶ Est confectio sapientum, & eorum qui desiderant scire, acuit enim intellectum, subtilizat sensum, memoriam recuperat, & confert dolori stomachi & ventris à frigiditate factæ, & clarificat sanguinem, colorem bonum facit.

Aurea Alexandrina, secundum descriptionem Nicolai.

R. Asari

Carpobalsami (aut aliquod succedaneum ut supra)

Sem. Hyoscyami albi ana 3 ii. s.

Charyophyllorum

Opii Thebaici

Myrrhæ

Cyperi rotundi ana 3 ii.

Opobalsami (loco eius oleum Charyophyllorum)

Cinnamomi

Euphorbii

Foli (aut succedanei eius)

Zedoariæ

Zingiberis

Colli veri

Coralli

Cassia lignæ veræ

Tragacanthæ

Thuris masculi

Meu

Storacis calamitæ

Saliuncæ, id est, Spicæ Celticæ, quæ nunc

Romana dicitur. Sed in Græco Alexandrina

drino habetur elelisphecon, id est, Salvia.

Cardamomi minoris

Seselios

Seminis Napi

Seminis Saxifragiæ

Anethi

Anisi ana 3 i.

Ligni aloes

Rheubarbari

Aliptæ Moschatæ

Castorei

Spicæ nardi Indicæ

Galangæ

Opopanacis

Anacardii

Mastiches

Sulphuris viui

Radiciæ Pæoniæ

Eringii (videlicet radiciæ eius)

Rosarum

Thymi

Acori veri (sive Calami aromatici)

Pulegii

Aristolochiæ longæ

Gentianæ

Corticum radicum Mandragoræ

Chamædryos

Phu

Baccarum lauri

Ammii, id est, ammeos

Dauci Cretici, eius loco licet accipere Sese-

li Creticum, id est, Βερνυριζ.

Macropperis

Leucopiperis

Xylobalsami,

Xylobalsami, aut aliquod succedan eum

Carui

Amomi

Petrofelini

Seminis Ligustici

Rutæ

Sinoni ana 3 s.

Auri cocti, id est, omnino igne depurati & synceri

Argenti meri

Ambarum Margaritarum

Blaccæ Bizantiæ

Ossium de corde cerui ana 3 i. gr. xiii.

Limaturæ Eboris

Calami aromatici

Pyrethri ana gr. viii.

Mellis despumati triplum.

IN Græco Alexandrino Nicolao & alia quædam pretiosa habentur in fine, ni fallor, sicut videbitur, si in lucem venerit.

MYRRHAB. Actuarius author, quem Ruelius interpretatus est, pro Myrrha habet Myrti baccarum, id est, Myrtillorum, facili ex altera in alterutram vocem lapsu: nam Myrta in plurali numero Græcis sunt fructus Myrti, quæ vox magnam habet similitudinem cum Myrrha.

MEV verò nos caremus, eius loco accipere licet Sisonis semen, quod iam dicitur amomum. aut Sefeli Creticum, hoc est, Beervvurtz, sed hoc inferius est accipiendum pro Dauco Cretico.

NAPVS est parua, densa, ac solida rapa, quam appellamus Germanice Merseburgisch, Borfeldisch & Bairischrublein.

PHV verum, quod ad medicinã requirunt authores,

thores, non est Valeriana vulgaris, sed alia herba que Germanicè dicitur Gartenseliunk, Teriacskrant & spicwrtzel. Caulem & flores habet Valeriane, radicem maiorem & odoratiorem, folia longa & mollia, colitur à nobis in hortis.

AMOMVM verum, est Rosa Hierichuntis odorata, sed eo pharmacopola hactenus caruerit, eius succedaneum est verus acorus, aut carpesium.

SINONYM siue Sison, siue Sinus, siue Sison, est semen nigrum aromaticum, quod hodie amomum in pharmacopols vocitatur falso.

AMBARVM Margaritarum, hoc est perforatarum & non perforatarum, alij legunt albarum Margaritarum, Acluarus habet simpliciter Margaritarum, non male ergo quis aget, si tam perforatarum quam non perforatarum, ana \mathfrak{z} .ss. gr. vi. & s. acceperit. ita ex utrisque unum fiet pondus, videlicet ut Nicolam habet \mathfrak{z} i. gr. xiii.

¶ Contra defluxiones capitis frigore conceptas efficax est, oculorum lacrymas exicat, dentium dolores lenit, aduersus capitis cruciatum summopere prodest, illitum fronti, comitiales, insanos, vertiginosos, & in vniuersum omnem capitis noxam mulcet: tabidis, tussiculosis, humorè à thorace reiicientibus, cardiacis, sanguinem excreantibus præfenti est auxilio, ischiaticis, coli & renum cruciatibus. Aduersus illorum noxam, difficultatem urinae, & eiusdem stillidium valet, calculos cõminuit, omni ventris malo liberat, quotidianis & tertianis febribus circa accessionis initium, suffertuefacto stœchadis infculo medetur.

Diacodion,

*Diacodion , secundum descriptionem
Mesuæ .*

℞. Caputum Papaueris flaccidorum nume-
ro x .

Aquæ cœlestis sextarium i .

Coquantur ad tertias , id est , tandiu vsque
quò tertia pars aquæ super sit .

Colaturæ expressæ adde

Sapæ optimæ ad tertias coctæ ℥ iii .

Mellis optimi ℥ i .

Coquantur ad perfectionem , deinde ad-
dantur .

Acaciæ non ita aridæ sed liquidæ

Hypocisthidis

Croci

Myrrhæ

Balaustiorum , hoc est , florum ana 3 i .

Ramich ℥ iiij .

FLACCIDORVM , id est , non omnino recen-
tium neque aridorum , sed medio habitu , qualia
sunt pridè decerpta .

SEXTARIVS mensuræ genus est , quod si mel
le repleatur , pendet ℥ xxx . si oleo , pendet ℥ xviii .
si verò aqua repleatur , pendet aqua ℥ xx . hoc au-
tem loco accipiendus est sextarius aquæ cœlestis . er-
go aquæ oportet esse uncias viginti ponderales . Va-
riant tamen authores in sextarii definitione , ut in-
ferius in vnguentis dicitur .

HYPOCISTHIS , id est , ut hodie corrupto no-
mine vocant , Hypequistidos .

RAMICH , compositio est peculiaris quæ poni-
tur in Trochiscis .

B

MELLIS

MELLIS *quantitas admodum parua videtur esse in hac confectione. Actuarius aliud habet Diacodion, quod huic subijciemus statim.*

¶ Confert eis quibus ex capite ad pectus & ad pulmonem subtiles catarrhi defluunt, & sunt causa tussis.

Diacodion, secundum descriptionem Actuarij.

R. Capita papaueris, neque perquam viridia, neque etiam ariditate exusta, numero xiii.

Rosarum ʒ i. ʒ i. s.

Croci; Acaciæ

Dulcis radice, id est Glycyrrhizæ ana ʒ i.

Armenæ glebæ, id est, boli Armeni ʒ s.

Cinnamomi

Hali

Hypocisthidis

Florum sylvestris Punicæ, id est, balaustriarum ana ʒ i.

Myrti

Dauci ana ʒ i.

Corallii candidi, id est, albi

Corallii rutili, id est, rubei

Rhus culinarii

Sanguinis Draconis

Florum Althææ ana ʒ i.

Seminis portulacæ ʒ i. s.

Capita Papaueris in cœlesti imbre sufficienti duos dies macerato, postridie ad tertias

tias coquito, & decoctum expressum ad iustam consistentiam coquito cum Mellis optimi lib. ii. Postremò deposito ab igne vase, species subtilissimè tritas adiecito, & bene vnito.

☉. hoc signum significat pondus, quod dicitur Sicilicus, pendet autem tantum, quantum 3 ij. ☿ est quarta pars vncie vnius.

HALVS aut Halum siue Alum, est Consolida saxatilis, id est, Symphytum Petraum, quod hodie nō habent Pharmacopola, ideoq; necesse est Symphyti, siue Consolida maioris radices accipere, nam Galenus dicit, vtile esse magnū Symphytum, id est, Consolidam ad omnia, quæ ad Petraum. i. Alum.

RHVS Culinarj, id est, vt nunc vocant Arabico nomine Sumach, oportet autem enucleatum, ☿ pulpm̄ eius accipere.

☿ Auxilio est cœliacis, dysentericis, lenitati intestinorum, alui profluuiο cū aqua cœlesti, in qua spodium inferbuerit, aut succinum torrefactum, vel cum stillatio rosarum liquore.

Diacastoriū, secundum descriptionem Nicolai.

R. Castorii

Myrobalanorum Citrinorum ana 3 ii.

Aloes 3 i. s.

Folii (aut succedanei eius)

Antimonii

Pyrethri

Glycyrrhizæ

Tragacanthæ

E 2 Calami

Calami aromatici
Nitri
Galbani
Spicæ Nardi Indicæ
Schœnanthi
Opopanacis
Cassie lignæ
Leucopiperis
Macropiperis
Melanopiperis
Xylobalsami
Carpobalsami
Colocynthis
Sagapeni
Rheupontici
Storacis calamitæ
Zingiberis
Cinnamomi ana 3 j. gr. ii.
Astræ scetidæ
Myrrhæ
Euphorbii ana 3 i. gr. xvii.
Staphisagriæ
Dauci
Fœniculi
Petroselini
Apii
Sileris montani
Baccarum Lauri
Petrolei
Seminis Sinoni
Storacis calamitæ rubæ
Sanguinis draconis
Cardamomi
Thuris

(pro quibus Caryophyllorum)

Agarici

Agarici
Mastiches
Salis Hammoniæ
Zedoariæ
Anisi ana Θ i. gr. ii.
Thymbræ
Hysopi
Pulegi
Chamædryos
Origani
Balsamitæ
Ocimi
Radici Branchæ vrsinæ
Distamni, videlicet Cretensis
Seminis Rutæ
Aristolochiæ longæ
Aristolochiæ rotundæ
Mabathematicon
Asari
Saluiæ videlicet minoris
Rosarum
Bdellii ana gr. xvi
Epithymi
Polypodii quercini
Opobalsami (loco eius oleum Charyophyl
lorum) ana gr. xiii.
Alypiados
Capparis, id est, radici eius ana gr. xi.
Peucedani
Absinthii ana gr. vii.
Anacardii
Sabinæ
Gentianæ
Corticū radicū Mandragoræ ana gr. xi.
E 3 Ireos

Ireos

gr. iii.

Mellis despumati triplum.

PETROLEVM hoc loco accipiendum est clarum flavum, atque liquidissima tenuitatis: & non nigrum & crassum.

STORACIS rubea, id est, Calamita rubea hoc enim loco non est accipiendus cortex ille fuscus & aridus, quem vocant Thymiana, atque malè Storacem rubeam. Sed Storacis Calamita purissima gutta quibus rufus est color.

SALIS Hammoniæ, hodie dicunt Armoniaci, est autè hic duplex. Facilitius quo vtuntur Chymisti, aurifabri & erarij. Atque nativus, qui ad medicinam recipitur. Cum autem careamus nativo, necesse est eius loco salem gemmeum accipere. Nam hoc loco non requiritur sal hammoniacus facilitius, ut puto, potest tamen tantilla eius portio tuto misceri tam numerosis simplicibus huius compositionis.

BRANCA vrsina, hoc loco non significat eam herbam quam Germani BernKlavr vocant, folijs asperis, umbella & semine anethi, odore & sapore cimicum, radice acris & feruida, Sed eam Brancam quæ in Italia vrsina vocatur, radicibus longis, tragacantha modo mucosis.

MABATHEMATICVM aiunt esse cauliculi sylvestris succum, est autem cauliculus seu caulis agrestis, id olus, quod Cato & alij rei rusticæ scriptores apud Latinos Brassicam sylvestrem vocant, cuius multe sunt species.

ALYPIAS siue alypum quid sit, nondum constat: quidam interpretantur Mezereon, id est, Chamelæam, sed falsò, utrunque enim seorsum peculiari capite ab authoribus depingitur, vires ha-

bet

bet acres & atram bilem per aluum purgandi, pos-
sumus autem eius loco accipere Epythymbrū, Thym-
bram, aut Thymum.

¶ Confert cephalalgicis, epilepticis, ver-
tiginosis, hemicranicis, paralyfi omnium
membrorum, & omnibus frigidis ægritu-
dinibus, tempore frigido nocentibus con-
fert.

*Michleta, secundum descriptionem Ni-
colai.*

R. Myrobalanorum Citrinorum

Chebulorum

Indorum oīum tostorū ana 3 ii. s.

Bellericorum

Emblicorum tostorum ana 3 ii.

Nasturtii, id est, seminis eius 3 ii. s.

Cymini

Anisi

Fœniculi

Ammios

Carui ana 3 i. s.

Omnia cruda terantur & macerentur in ace-
to vini modico xxiiii. horis, exiccentur cū
insperfo aceto, postea torreantur supra pru-
nas. tostis addantur subsequencia,

Spodii. id est, Eboris vsti.

Balaustiorum

Pulpæ Sumachii

Maltiches

Gummi Arabici ana 3 i. gr. xv.

Omnia cum oleo rosato fricentur, & com-
misceantur cum Syrupi myrtini triplo.

E 4

¶ Propriè

¶ Propriè valet ad hæmorrhoides, & ad
ventris torsionem & rugitum lienterix, &
dysenterix, & optima est omni solutioni
ventris.

Electuarium de Baccis Lauri, secundum descriptionem Rasis.

R. Rutæ 3 x.

Ammios

Cymini

Nigellæ

Ligustici, id est, seminis eius

Origani

Carui

Amygdalorum amarorum

Piperis nigri

Piperis longi

Menthastri

Dauci

Acori

Baccarum Lauri

Castoreii ana 3 ii.

Sagapeni 3 s.

Opopanax 3 iii.

Mellis depumati triplum, id est, lib. i. 3
iii. 3 vii.

SAGAPENVUM corrupto nomine vocatur Se
rapinum in Pharmacopoliis.

¶ Valet ad colicam & iliacam passionem,
& doloribus intestinorum ex causa frigida
vel ventosa confert.

Diafatyriu,

Diasatyriu, secundum descriptionem Nicolai.

R. Testiculorum Satyrii recentium densorum
 Radicum Pastinacæ sativæ recentium
 Radicum Secacul, id est, Gruzelmoren
 Nucis Indicæ
 Pinearum
 Pistaciorum ana 3 xii.
 Charyophyllorum
 Zingiberis
 Anisi
 Eruce seminis
 Linguae avis, id est, semen fraxini ana 3 v.
 Cinnamomi
 Caudarum scincorum
 Seminis bulbi ana 3 ii. s.
 Moschi gr. vii.
 Mellis despumati optimi lib. iii.

SATYRION habet duas radices, unam solidam, alteram flaccidam, ex his tantum sumendæ sunt densæ & solide.

SEMINIS Bulbi. Bulbus vulgò non est cognitus quare eius loco vrticæ semen accipere licet.

SCINCORVM notandum est in primis non esse accipiendam reptilia illa quadrupedia ex fossis, que nos vocamus vvaßermolchen siue vvaßer Ey dexten, ut hætenus factitatum est. veri autem scinci iam denuo in copia afferuntur ex Alexandria Aegypti, quos à Materialistis expetant Pharmacopœtæ in posterum.

E 5 ¶ Pollet

¶ Pollet contra vesicæ & renum imbecillitatem; is etiam auxilio est, qui urinam redere nequeunt: venerem stimulat, eamque certa de causa cessantem, haud segniter restituit.

Diasatyriū aliud, secundum descriptionem Mesuæ.

R. Secacul albi & mundi & elixati in decocto Cicerum, quorum prima aqua, in qua decoquebantur, sit effusa lib. i.

Testiculorum vulpis ℥ viii.

Radicis Raphani ℥ iii.

Radicis Laph plani ℥ ii.

Terantur hæ tres radices posteriores, & infundatur super eas lactis bubuli aut ouili tantum, vt lac duos digitos emineat, adiaciendo.

Olei sesamini

Butyri recentis non saliti ana ℥ iiii.

Coquantur cum facilitate vsque ad consumptionem lactis, & donec omnino remolliatæ sint radices, & habeant iustam spissitudinem instar pultis crassioris, nam si aqueum quod in lacte & radicibus est non consumatur, situm contrahit hoc medicamentum.

Postea adfunde omnibus hisce prædictis radicibus,

Mellis despumati optimi lib. vi.

Succi Caparum recentium lib. i. s.

Coque omnia simul ad perfectam decoctionem, deinde ab igne depone, & insperge subsequentiū specierum minutissimū puluerē.

Caudarum

Opiatæ

93

Caudarum Scinci cū renibus & sumine 3 i.

Seminis Erucae

Zingiberis

Been albi

Been rubei

Linguae auis, id est, semen fraxini arboris

Seminis nasturtii

Cinnamomi

Piperis longi

Seminis Bauciae

Seminis napi

Pulpae seminis Asparagi maximè recentis
ana 3 iiii.

Confice cum eis: vltimò verò adliciantur
subsequentia,

Pinearum mundatarum lib. i. s.

Fisticorum, id est, Pistaci orum mundato-
rum 3 x.

Confice & misce omnia optimè, & aroma-
tiza cum

Moschi boni 3 i.

RADICIS Raphani videlicet satini, quam
vocamus Rettich.

LUPH planum. Duplex est Luph (id est Ser-
pentaria) crispum scilicet & planum. Crispum
folia habet diuisa, & crassa. Planum verò lata
& plana veluti aron, unde vtrique nomen inditū
est. Vulgò autem apud nos caremus Luph, id est,
vera Serpentaria, ideo eius loco accipiendæ sunt ra-
dices herbae, quam aron vocant.

TESTICULI vulpis, hoc loco non sunt acci-
piendi testes animalis, dicti vulpes. Sed radices Sa-
tyry sine Orchios, quæ habent similitudinem testi-
culorum

E 6

culorum vulpium. Vnde etiam nomen herba accepit, qua in re quosdam turpiter errasse scio.

NAPVS est paruum oblongum densumq; rapum, cuius sunt species plures, Bayerischerublein, Steckerublein, Merseburgisch et Bonifedscherublein.

BAVCA est pasinaca sativa siue Caryota, Gelhenmores Germani vocant.

FISTICVM siue Phislicum, idem est quod Pistachium siue Pistacium.

¶ Valet ad erectionem virgæ, multiplicat sperma, & desiderium coeundi.

Theriaca, secundum descriptionem Andromachi.

R. Trochiscorum scilliticorum 3 xlviij.

Trochiscorum de vipera

Trochiscorum Hedychroi

Piperis nigri

Opii Thebaici ana 3 xxviij.

Rosarum

Scordii Cretici

Seminis Buniadis agrestis

Iridis Illyricæ

Agarici albi pontici, id est, in Ponto nati

Cinnamomi

Succi Glycyrrhizæ

Opobalsami, loco eius olei Charyophyllo

rum ana 3 xii.

Myrrhæ Troglodyticæ

Croci Cilicii

Zingiberis

Rheupontici, id est, Rhabarbari

Radicum

Radicum Quinquefolii
Calaminthæ montanæ
Marrubii comarum
Stœchadis comarum
Costi recentis, videlicet veri, non adulte-
rini
Piperis albi
Piperis longi
Dictamni Cretici
Thuris masculi
Petroselini Macedonici
Schœnanthi
Terebinthinæ Chiæ, id est, in Chio insula
natæ
Cassie fistulæ, videlicet Cassiæ lignæ veræ
Spice Nardi Indicę ana 3 vi.
Gentianæ
Polii minoris comarum
Styracis optimæ
Seseliος Mafsiliensis
Abrotoni
Seminis Thlaspiος
Ammii
Chamædryos comarum
Chamæpityos comarum
Hypocisthidis
Malabathri
Nardi Celticæ, id est, Spice Romanæ
Anisi Helladici, id est, cognomen Anisi à
regione, vbi optimum est.
Meu Athamantici
Fœniculi
Sigilli Lemnii aut Boli Armeni
Chalcitidis semiasiatæ

Amomi

Amomi racemi
Acori
Cardamomi
Phu pontici (accipe verum, quod in hortis
colitur)
Corpobalsami
Hyperici comarum
Acaciæ liquidioris
Gummi vermiculati
Dauci Cretici
Galbani puri
Opopanacis
Sagapeni Persici
Bituminis Iudaici, id est, Asphalti
Centaurii minoris comarum
Castorii

Aristolochiæ tenuis ana 3 ii.
Vini veteris odorati, quantum liquoribus
& gummis dissoluendis satisfecerit. Mellis
despumati optimi triplum. Hoc est lib. xiiii.
3 vi. vt sequetur paulò pòst.

Confice sic. Cinnamomum, crocumq;
(vt Aëtius vult) vnumquodque per se teri-
to, & si voles etiam Rhabarbarum & Hedy-
chroos trochiscos, misce deinde inuicem
optimè, postea reliquas herbas ac radices
& omnia arida similiter tundito, semper si-
milis cum suis similibus, aromata per se, ac
reliqua etiam per se seorsum. Postea (si Aë-
tium imitari est animus) Crocum, Cassiam,
Cinnamomum & Lemniam terram in pila
cum vino optimo tere atque vnito, ac reli-
qua omnia secundum artem addito, & mel-
le despumato vniuersa excipito.

Ego

Ego verò ita preparare consuevi simili
rè ratione.

R. Piper nigrum

Piper album

Piper longum

Iridem Illyricam

Zingiber

Costum

Amomum (aut eius succedaneum)

Acorum

Cardamomum

Carpobalsamum

Incidenda minutim concidito, & in minu-
tissimum puluerem conterito, & per angu-
stissimum cribrum excernito, postea in sca-
tula diligenter, ne expiret extracta reponi-
to, donec reliquis admisceas.

Posthac

R. Radices Quinquefolii

Gentianam

Meon (aut eius succedaneum)

Phu

Dauci Cretici radicem (aut eius succeda-
neum)

Aristolochiæ tenuis radicem

Rosas

Trochiscos scilliticos

Scordium

Trochiscos de vipera

Calaminthen montanam

Marrubii comas

Stæchadis comas

Dictamnus Creticam

Schœnanthum

Polii

Polii montani minoris comas

Abrotonum

Chamadryos comas

Chamæpityos comas

Nardum Celticam

Hyperici comas

Centaurii minoris comas, atque

Castorium, & semina omnia

Concidito omnia minutim, teritoque in tenuissimum puluerem, & per angustissimū cribrum excutito. Excusum puluerē prædicto quem reposuisti adicito, diuque donec perfectè commissi sint in mortario terito, adhibita diligenti cura, ne quid inter tūdendum excernendumque pereat, aut temere ponderi decedat, mox ē mortariō exemptum puluerem iterum ne expiret reponito, usquequò omnia conficiantur. Interea

R. Agarici optimi albissimi, atque in longa rectaque capillamenta fissilis, frustra electa, ab his scobina deradito ʒ ii. sed quia non facilè per se tunditur, neque etiam cum aliis, propterea quòd in puluerem volatilem resolutus euanescit, ita ut multum ponderi eius decedat, ideò ad scobem Agarici prædictam infunde optimum vinum, & fac Trochiscos minutos in tepida vmbra exiccādos, exiccatos minutissimè cōtundito atque per cribrum excernito angustissimum, excreti deinde Agarici cape pondus, quod requirit compositio, videlicet ʒ xii. & prædicto pulueri summa diligentia commisceto, quo facto

R. Opium

Succum

Succum Glycyrrhizæ

Myrrham

Acaciam

Gummi

Hypocisthida.

Cōcidito omnia in minutas partes & mis superinfundito vini optimi quātum dissoluendis atque eliquandis succis satis fore coniecero, exprimito, postea per rarum colum liquefactam & modicè calefactam particulam colato, ita ut nihil præter sordes in colo remaneat. Quod si succi & liquores isti sordidi & surculis foliisque pleni fuerint, ponderi eorum aliquid addendum esse facile estimare quis potest, quod in sequentibus densatis liquoribus etiam obseruandum est.

R. Galbanum.

Opopanax & Sagapenum. hæc affuso optimo vino modeste supra prunas dissoluantur, & per rarum linteum fortiter exprimantur. His dissolutis,

R. Thus masculum

Bitumen Iudaicum. Terantur quàm minutissime poterint, addendo Terebinthinā, & syncerissimam aut ex scobe ac sordibus expressam Styracem, dissoluatur lento admodum igne cum mellis despumati sufficienti copia, & ita calidam polticulam postea cum reliquis calentibus misceto, & diligenter agitato ne rursus in grumos concrecant thus & bitumen, ubi refrixerint: quapropter aliquid de contusorum puluere est admiscendum. Quod si hoc modo dissoluere & miscere distidas, bitumen & thus vnā cum reliquis

liquis aridis tundito, & tantum styracem atque terebinthinam dissoluito, atq; melli despumato calenti admisceto. His factis,

R. Cinnamomum

Malabathrum (aut eius succedaneum)

Cassiam fistulam veram

Trochiscos Hedychroi

Spicam Nardi Indicam. Et simul tundito in tenuissimum puluerem. Postea

R. Crocum

Rheon siue Rhaponticum, id est, quod hodie Rhabarbarum vocatur, & vnūquodque seorsim tundito. Deinde misceto.

Trochiscorum Hedychroi

Cinnamomi

Cassiae

Spicae Nardi

Croci & Rheipontici, pulueres diligentissimè. Postea

R. Mellis optimi & aromatici, quale è Lithuania Dantiscum affertur, despumetur sedulò, despumati postremò mellis sume lib. xiiii. 3 vi. ex eo modicum infunde in amplum ahenum ex aurochalco factum, & insperge paulatim commistos paulò ante Trochiscorum & Hedychroi, Cinnamomi, Cassiae, Spicae, Croci & Rheipontici pulueres, alternis vicibus, mel despumatum tepidum, atque pulueres iniiciendo, quæ diligentissimè interim pistillo ligneo agitanda sunt. cū hæc optimè fuerint cōmixta & floridum puniceumque colorem contraxerint, injcito Lemniam terram antea subtilissimè per se, deinde cum vino tritam, & vnà etiam Chal

citida

itida affatam, quam hoc modo affabis: Accipe purissimæ Chalcitidis circiter ʒ iii. eā in fictile non ita profundum iniectam, supra fornacem ponito, donec liquefiat & bulliat: deinde ab igne auferto, & abiicito id quod in superficie durum est atque rufescit, & ex medio eius sume ʒ iii. & cum vino tritam atque dissolutam medicamento admisce. Postea paulatim etiam infundito tepefactos liquores & succos, quos antea in vino dissoluisti, alternis vicibus, succos, mel & reliquos pulveres quos primò contriuxisti iniiciens, simul etiam admisce Styracem Terebinthinamque & Opobalsamum, ita ut omnia exactissimè admisceantur, atque sigillatim mel & pulveres commisce, donec uniuersa vnita & in vnā substantiam redacta sint, assiduè agitando, ne grumi aliqui relinquantur, aut nodi. Postquam verò optimè totam confectionem miscueris, indito in vas ex densa materia factum, videlicet ex plumbo albo, quod hodie stannum appellant: oportet verò ut tertia aut quarta pars vasis relinquatur vacua, ut effervescentes medicamentum attollere se queat, nec effluat. Reponendum autem est hoc medicamentum donec seruescat in tepido & sicco loco, postquam verò subsederit, in frigido & sicco loco conseruandum erit. Porro ego hac ratione præparavi Theriacen, alij verò paulò aliter conficiunt. Sed omnium pessimè faciunt, qui succos & liquores & reliqua omnia simul tundunt, & postea tusum puluerem impuro melli incoquunt. Animaduertendum etiam

etiam est, ne vini plus quàm opus sit liquo-
ribus & succis dissoluendis adfundatur : nā
si vltra modum vinum succis addatur, situm
contrahet Theriaca. Propterea etiam non
consueui Cassiam & Crocum & Cinnamo-
mum vino permiscere, sed mel : nam aquo-
sius est vinum nostrate. Quod intelligentes
quidam ex recentioribus, qui de composi-
tis medicamentis scripserunt, iubent pro vi-
no accipere coctum mustum, hoc est sapam,
passum aut defrutum, quibus tamen non as-
sentior. Nam hæc vina sunt spissiora quàm
vt in eis concreti atque densati succi, & li-
quores dissolui queant. Nam eius tan-
tùm rei gratia vinum Antidoto huic permi-
scere soliti sunt veteres, & nos imitabimur.

*Hæc descriptio est sumpta ex Actio, paulò post
ponetur ea quam trāsuli ex Græco carmine Andro-
machi senioris.*

VIPERAE serpentes sunt in Italia, inde etiam
facti ex eis Trochisci petendi sunt.

TROCHISCI Hedichroi inferiùs in Trochi-
scis describentur.

PIPERIS nigri. Andromachus senior qui in-
uentor est huius compositionis, hoc loco habet, Piper
longum, in carmina Elegiaco Græco.

SCORDII Cretici, optimum scordium nasci-
tur in Creta insula, nos interim nostrate vtamur
satis effrati. Porrò verum Scordium herba est Cha-
medry similis, odore aliquo ally, & nullo modo
Allium syluestre, vt hætenus magno errore credi-
derunt. Naschitur in Saxonia, quemadmodum &
circa Nurembergam.

BYNIAS,

BNIAS, id est *Napus*: quid verò sit *Napus* actum est in *Diasatyrio Mesuæ*, & antea etiam.

MYRRHAE *Troglodytica*. *Troglodyta* populi sunt Arabibus vicini, apud quos optima nascitur *Myrrha*.

OPOBALSAMO vero caremus, ideoq; eius loco accipiendum est succedaneum aliquod, veluti *Stoleum Caryophyllorum*.

CROCI *Cilicij*, id est, in *Cilicia Asia* regione nati, & idem est quod *Crocus orientalis*.

RHAPONTICVM hoc loco significat *Rhabarbarum*, nam magna illa radix quam hodie *Rhaponticum* vocant, falsò hoc nomen habet.

COMAE sunt folia & flores plantarum.

PIPERIS *longi*. *Andromachus senior*, hoc loco habet, *Piper nigrum*. *Iunior* verò *Andromachus*, id est, *Senioris* filius ordinem *nigri* & *longi* *piperis* inuertit, què in hac compositione sequimur, paulò post etiam *Senioris Theriacen* adscripturi.

DICTAMNVS *Creticus* folia habet alba, laugine obducta, gustu acris, ut *Thymus*. Afferitur rursum ex *Creta insula* ad nos.

CASSIA *fistula* hoc loco significat *Cassiam ligneam veram*, quæ iam iterum offertur, estq; *Cinnamonomo* similis.

POLIVM *montanum* duplex est, vnum pluribus surculis fruticosum ac humi sparsum, alterum candidius & rectius se attollens. Maius nascitur apud nos, minus offertur ex monte *Pessulano*, & hæ sunt veri *Poly species*, & totam hyemem viuent, ut *Lauandula* aut *Thymus*. Vulgò non habuerunt verum *polium* *Pharmacopole* usque ad hoc tempus.

STYRAX, id est, *Storax calamita*, accipienda

da autem est hoc loco purissima eius resina, in miccas concreta.

SESELI, id est, Sileris montani, dicitur autem Massiliense, à provincia Massiliensi, in qua provenit optimum.

THLASPI, est species agrestis nasturtij, quæ passim nascitur secus vias, semine rufo, sapore acri & glutinoso, quod ut habeant, diligenter curent Pharmacopole, vocatur Germanicè vvege-Kressen.

CHAMAEPITYS, vera est Iua. herba est tenuibus folijs, floribus parvis, & luteis: nascitur copiosè ad Rhenum in Franconia in vineis & agris quiescentibus, præsertim Spiræ Vuormaciæ et Vuirtzburgi & alijs locis.

MALABATHRUM est folium Indum, cuius succedaneum est Spica tam Indica quàm Celtica.

MEV non habemus, loco eius sumimus Sesele Creticum, id est, Bervvurtz, aut potius Sison, hoc loco: inferius enim sequetur Daucus Creticus.

SIGILLUM Lenaium, id est, terra sigillata, quæ signatur in Lemno insula, in qua effoditur hæc terra, in cuius defectu sumatur bolus Armenus leuanticus.

CHALCITIS hodie non à quouis cognoscitur est autem vitrioli nativi species: hæc qui carent, accipere possunt vitriolum viride optimum, quale est Goslarianum in Saxonia. Porro Andromachum mihi videtur Chalcitida Theriacæ miscuisse, nigri coloris gratia, qui color ab omnibus in Theriacâ requiritur sine aliqua ratione. Mihi itaque videtur non necesse eam addi: nam horribili & æruginoso sapore totam compositionem inficit. At cum ego aliquando in Theriacæ compositione non adiecissẽm Chalcitida

Chalcitida, saporem gratiorem acquisiuit hoc melicamentum. Consulantur igitur hac de re Doctores Medici.

AMOMO vero caremus, eius loco accipimus Carpesium, aut Acorum verum, id est, nostrum Calamum aromaticum.

ACORVS verus, est illa radix, quam hodie falsò vocant calamum aromaticum.

ACACIA succus est fructus ex arbore, è qua distillat gummi Arabicum, loco eius accipimus syluestrium Prunellorum succum inspissatum.

GUMMI vermiculati, id est, Arabici gummi, quod concretum est in grumos vermium figura.

DAVCI CRETICI vice accipere licet Selseli Creticum, id est, Bervvurtz, videlicet radicem eius.

SAGAPENVUM hodie vocant Serapinū, quod in Perside optimum provenit. Senior Andromachus Sagapeui habet 3 iij.

Iunior vero tantum 3 ij.

ARISTOLOCHIA tenuis, id est, Aristolochia nostra longa vulgaris.

¶ Theriaca in omnibus antidotis od multiplicem vsum potiores partes obtinet. Est enim famosa & salubris contra genera ægri tudinum plurima, valet enim ad grauissimas passiones totius corporis humani. Epilepti cis, catalepti cis, apoplecti cis, cephalalgicis, stomachicis, hemicranicis prodest. Ad raucedinem vocis & constrictionē pectoris optima est. Arteriacis, asthmaticis, hæmoptoi cis, ictericis, hydropicis, peripneumonicis, iliois, & vulnera in intestinis habentibus,

bus, nephreticis, calculosis subuenit: men-
struaeducit, & foetum mortuum expellit:
lepras, & variolas, & frigus, & cæteras pas-
siones inueteratas emendat. Præcipue con-
tra omnia venena & serpentium morsus &
reptilium valet. Sed diuersa est eius dosis pro
quantitate & qualitate vniuscuiusque pas-
sionis. Omnem defectionem sensuum rele-
uat. Cor, cerebrum, hepar, stomachum con-
fortat, totum corpus incorruptum ducit &
custodit.

*Theriaca Andromachi Senioris, è car-
mine eiusdem Elegiaco translata.*

R. Trochiscorum Scilliticorum 3. xlvij.
Trochiscorum Theriacorum

Piperis longi

Liquoris papauerini, id est, opii

Magmatis Hedychroi ana 3. xxiii.

Foliorum rosarum siccarum

Iridis Illyricæ, id est, ireos

Cyanæ glycyrrhizæ

Seminis Buniadis, id est, napi, vulgo *Bey-
rische rublein.*

Scordii

Liquoris Balsami, loco cuius oleum Cha-
ryophyllorum

Cinnamomi

Agarici ana 3. xii.

Myrrhæ

Cosli

Croci Corycii

Cassia. i. calsię lignę verę, aut succedanei ei⁹

Nardi.

Jardi Indicæ

unci Arabici, id est, schœnanthi

Thuris, videlicet masculi & electi

Piperis candidi

Piperis nigri

Comarum Distamni, id est, foliorum & flo-
rum distamni Cretici veri

Marrubii

Rhei, id est, quod hodie vocatur Rhabar-
barum

Stœchadis

Petroselinii, id est, seminis eius

Calaminthæ, id est, Calaminthi montani te-
nuifolii

Lacrymæ Terebinthi Libyftiadis

Zingiberis

Quinquefolii. i. radicem eius ana 3 vi.

Polii, videlicet montani & albi, quod è
Lugduno affertur.

Chamæpityos

Styracis, id est, storacis calamitæ synceræ
& electæ

Mei

Amomi racemosi, aut succedanei eius vt su-
prà

Nardi Galaticæ, id est, Celticæ

Rubricæ Lemniæ, id est, terræ sigillatæ ve-
ræ, aut boli Armeni, vt suprà

Phu Pontici

Chamædryadis Certicæ, id est, Chamæ-
dryos veræ

Foliorum Malabathri, eius loco ponatur

Macis

Chalcitidis tostæ

F Radicis

Radicis Gentiadis, id est, Gentianæ

Anisi

Succi Hypocisthidis

Fructus Balsami, id est, carpobalsami, pro
quo etiam succedaneum sumatur, sicut
suprà facta est mentio

Gummi splendori

Seminis fœniculi

Cardamomi Indici, id est, minoris

Seselios tenuis

Lacrymæ nigræ spinæ

Thlaspios

Hyperici

Ammios

Sagapeni ana 3 iiii.

Castorei

Aristolochiæ tenuis

Seminis Dauci

Bituminis

Liquoris panacis, id est, opopanax

Centaurii, videlicet minoris

Chalbanidis pinguis, id est, Galbani recen-
tis & puri ana 3 ii.

Confice cum vino & melle. Hactenus An-
dromachus.

Vini autem tantum accipias, quantum li-
quoribus & succis dissoluendis satis fore con-
ieceris, ut proximè dictum est. Mellis verò
optimi accipe lib. xiiii. ʒ iii. ita detrahis
Mellis ʒ iij. de priori Theriaca, quia huic
desunt abrotoni & acori ana 3 iiii.

Confice autem & hanc Theriacam ut pro-
ximam.

TROCHISCI

TROCHISCI Theriadi, sunt Trochisci de vi-
ra siue de Thiro, vt hodie vocant.

MAGNA hedychroum, id est, Trochisci hedy-
chroi, quos Auicenna vocat Alindaracaron, quo-
rum compositionē in tractatu de Trochiscis inquire.

CYANEAE, id est, cœruleæ vel nigræ Glycyrr-
hizæ, seu vt hodie vocant Liquiritiæ, quæ nigrum
colorem habet. Intelligit autem Andromachus suc-
cum Glycyrrhizæ.

CROCVS Corycius, id est, in Coryco Ciliciæ
monte nati, hoc est Croci Orientalis.

LACRYMÆ Terebinthi Libiadi, id est,
resina Terebinthinae Libyæ, in Libya Aphricæ re-
gione nata. eius loco nos accipere possumus laricis
resinam, quæ ubique in Germania Terebinthina im-
proprie vocatur.

MEI loco, quo caremus, possumus accipere Se-
li Creticum, id est, Berrvurtz, aut semen nigrum
et odoratum, quod hodie vocant improprie Amio-
num, veteres autem Sison.

PHV Ponticum, non est Valeriana vulgaris,
sed ea herba, quæ in Hesiâ vocatur Theriackskraut,
vel Gartenfeliumk.

MALABATHRVM non habemus: eius loco
accipe Spicæ Romanæ radículas, vel Spicæ Roma-
næ et Maris ana partes æquales, vt Arabes præci-
piunt: vel Cassiam ligneam veram.

RADICIS Gentiadis, id est, Gentiane à Gen-
tio Illyrici rege sic appellata, qui eam primum in-
uenisse creditur.

GUMMI Splendidi, id est, mundi, synceri et
translucidi, videlicet Gummi Arabici cognominati.

NIGRA vel cœrulea spina, est arbor, quæ a-
liis dicitur spina Aegyptia, ex qua manat gummi

F 2 Arabicum.

Arabicum. Per lacrymam verò eius Andromachus intelligit succum eius, qui Acacia vocatur, & fit ex fructu siliquaceo huius spinæ. eius loco accipimus succum prunellorum agrestium.

SESELI tenue, est Seseli Creticum, quod ex omnibus speciebus Seselios minimum & tenuissimum est, Germanicè vocatur Berrvurtz, potest tamen etiam vulgare intelligi.

DAUCVS, id est, daucus Creticus, hoc loco eius vice, accipe semen Pimpinella nostratis, aut radices Seselios Cretici, nihil enim refert, quòd bis accipiat in hanc compositionem. est autem Seseli Creticum quod Germanice vocatur Berrvurtz.

ARISTOLOCHIA tenuis, est illa quæ apud nos nascitur, longa cognomento, cuius radices gracilitate sua & longitudine imitantur sarmenta vitium.

¶ Andromachus Neronis medicus, primum condidit medicamentum hoc, eiq; declarationem, heroicis carminibus descriptam, nuncupavit. Sed Galenus mutata forma, compositionem reddidit meliorem.

Theriaca Diatessaron, secundum descriptionem Mesuæ.

R. Gentianæ
Baccarum lauri
Myrrhæ
Aristolochiæ rotunde ana $\bar{3}$ ij.
Mellis despumati optimi lib. ii. id est, $\bar{3}$ xxiii.

DIATESSARON,

Opiatæ

111

DIATESSARON, hoc est ex quatuor simpli-
bus composita.

ARISTOLOCHIA rotunda non est illa radix
tam nos Holvvurt vocamus, sed alia multò ma-
ior & tuberosa, intus solida, colore buxi flauo, o-
dore & sapore similis Aristolochiæ longæ nostrati,
affertur ex Italia & Heluetia.

¶ Teriaca antidotus Diatessaron ad af-
fectus frigidos, tum cerebri, vt epilepsiam,
paralytim, spasimum Cynicum: tum ventri-
culi, vt inflationem, & ab ea dolorem, tar-
dam coctionem: tum denique hepatis, vt
hydropem, cachexiam, obstructionē. Pre-
tereà morsus scorpionis, & potioni veneni
confert.

*Mithridatium ex Democratis Græco
carmine in Latinam linguam translatum.*

R. Myrrhæ Arabicæ Troglodytis

Croci

Agarici

Zingiberis

Cinnamomi

Spicæ Nardi

Thuris videlicet electi

Thlaspios

ana 3 x.

Seselios

Opobalsami (aut oleum Charyophyllorū)

Schoeni, id est, Squinanthi vt hodie vocant

Stœchadis

Costi (videlicet veri & aromatici)

Chalbanæ

F 3

Terebinthinæ

Terebinthinæ
 Piperis longi
 Castorei Pontici
 Succı Hypocisthidis
 Styracis bonæ
 Opopanacis
 Folii Malabathri recentis (aut succedanei
 eius) ana 3 viii.
 Cassiæ nigræ (lignæ aut succedanei eius)
 Polii
 Piperis albi
 Scordii
 Seminis dauci Cretici
 Fructus balsami (aut succedanei eius)
 Cypheos
 Bdellii ana 3 vii.
 Nardi Celticæ purgatæ
 Gummi
 Petroselinı, id est, seminis eius
 Opii papaueracei
 Cardamomi
 Seminis Fœniculi
 Gentianæ
 Foliorum Rosarum
 Dictamni Cretici ana 3 v. boni
 ponderis
 Anisi
 Arii
 Acori (siue calami aromatici)
 Phu
 Sagapeni ana 3 iii.
 Mei Athamantici
 Acaciæ
 Ventris Scinci videlicet veri

Fructus

uctus Hyperici. i. summitatum eius ana

3 ii. s.

ini quantum sufficit.

Mellis mensuram conuenientem.

VINI quantum sufficit, id est, quantum satis
et succis et liquoribus dissoluendis.

MELLIS mensuram conuenientem, in Græco
ῥόμμητον quod idem significat, sit autem mellis
ptimi odorati et despumati lib. ix 3 viii. 3 ii.
CYPRHI sunt trochisci qui ad odorem suffiun-
tur, eius compositio habetur in tractatu de Tro-
chiscis.

NARDVS Celtica est Spica Romana. Purga-
re, id est, a paleis, terra et sordibus mundare.
Radices eius tantum debent accipi.

ARII, in Græco est Ἀρίη. i. Ariu, quod nomen
apud nullum aliam auctorem in Mithridatio scri-
ptum inuenitur. Intelligit autem Democritus per
Arion siue Arum, Aron, id est Arum, quantum
ergo ratiocinari possum: nam Aron egregiam facit
contra venenata medicinam.

ACACIA veraciter accipere, accipe ergo loco eius
Succum prunellorum syluestrium, diligenter spissa-
tum, aut alium quendam, quem Doctores substi-
tuent, Nos inferius ponemus Acaciam succedaneam.

¶ Mithridaticum proximum est, in quali-
tate, & virtute Theriacæ, & parum differe-
runt: nisi forte quod theriaca est parum cali-
dior & potentior contra venena serpen-
tum. Curat omnes passionis capitis viro-
rum vel mulierum, si fuerint ex frigidityte:
& maximè melancholicis, & timidis, epile-

F 4 pticis

pticis & hemicranicis confert: & dolorem supercilii patientibus & lacrymantibus oculis, & ad omnia capitis vitia vel aurium subuenit: dentium doloribus & palato, & omnibus vitiis oris & maxillarum medetur, si super locum dolentem ponatur, & iterum ad modum Emplastrum ponatur in temporibus, unde fit discussio. Squinantiam soluit. Apoplecticis, tussientibus asthmaticis, hæmoptoicis peripneumonicis, & omnibus doloribus qui intra corpus humanum fiunt, succurrit. Iliacis, dysentericis, & lientericis confert, si detur cum decoctione balaustræ. Extensionem humerorum, tetanos siue spasmos patientes, & paralyticos sine mora sanat. diaphragmati & hypochondriis subuenit, renibus & vesicæ opitulatur. Calculos frangit, menstrua prouocat, omniaque vitia matricis excludit, schirosum patientibus, & podagricis singulis præsidio est. Præcipuè datur contra venena omnia: venenosos morsus, siue rabidi canis, seu cuiuscunque reptilis, impositum siue bibitum, cum magna admiratione emendat: quotidianariis & quartanariis etiam ante horam accessionis cum vino tepido datum mirificè prodest.

Mithridatium aliud, ut ex Cleopatro & Antipatro, Galenus & Aetius exscripserunt.

R. Myrrhæ 3 vii. s. ʒ iii. Nardi

Opiatæ

115

Nardi tantundem

Croci 3 vii. s iii.

Opii 3 iiii. s ii. s

Styracis 3 v.

Cinnamomi 3 vii. s iii.

Castorei 3 vi. s i.

Polii 3 vi. s iii.

Scordii 3 vii. s iii.

Zingiberis tantundem

Costi 3 vi. s iii.

Piperis albi 3 v. s ii.

Piperis longi 3 vi. s iii.

Seselios 3 v.

Abrotoni tantundem

Petroselini, videlicet seminis 3 iiii.

Seminis Dauci 3 vi. s iii.

Calsie 3 v. s iii.

Thuris 3 vi. s ii.

Succi Hypocisthidis 3 vi. s i. s.

Nardi Celticæ 3 iiii.

Seminis Fœniculi 3 iiii.

Nardi Indicæ 3 iiii.

Acori (aut calami aromatici)

Phu Pontici

Sagapeni

Fructus balsami aut succedanei eius

Hyperici

Illyridis, id est, Ireos ana 3 ii.

Rubricæ Lemniæ (loco eius Bolus leuan-

ticus) 3 vi.

Lumborum Scinci, videlicet veri

Cypheos ana tantundem, id est, 3 vi.

Acaciæ

Gummi

F s Cardamomi

Cardamomi
 Pelecini ana 3 ii.
 Thlaspeos 3 vi. ~ iii.
 Gentianæ 3 iii.
 Anisi 3 iii.
 Rosarum siccarum 3 iii.
 Mei Athamantici tantundem
 Schoeni, id est, Squinanthi 3 vi. ~ iii.
 Opopanacis 3 vi.
 Galbani 3 vi. ~ iii.
 Opobalsami tantundem (cuius loco ut su-
 præ oleum Charyophyllorum)
 Aristolochiæ, videlicet, rotundæ veræ 3 i.
 Hyssopi 3 iii.
 Marrubii 3 i.
 Chamæpityos 3 iii.
 Libanotidis 3 v.
 Terebinthinæ 3 vi. ~ iii.
 Mellis Attici quod sufficit.
 Vinum ne addas. Hactenus Cleophrantus et
 Antipater.

Mellis autem despumati optimi & odo-
 rati sume ad totam confectionem lb. vii.
 3 vi. 3 vi. vinum ne addatur, præce-
 pit, Cleophrantus: idè in aceto sunt dissol-
 uendi liquores concreti, ut Sagapenum, O-
 popanax, & Galbanum. confice secundum
 artem.

MELLIS Attici nobis copia non fit, ideoq; a-
 liud, quod optimum fuerit recipiendum erit.

Compositio hæc est valde mendosa in ponderibus
 apud Aetium, apud Galenum vero est emendatior.
 Rursum simplicium numero aliqua desunt apud Ga-
 lenum,

um, quæ ex Aetio confectio huic restitui. Aetius hunc authorem vocat Cleopatrum, Galenus vero Cleopantum.

∞. hic Character significat obolum, est autem oboli pondus \varnothing s. scrupuli videlicet dimidium, aque vi. oboli faciunt $\frac{5}{3}$ i.

NARDVS Indica hoc loco non significat Spicam nardi Indicam, sed Malabashrum, id est, folium Indum, quod nardi est species & in India gignitur. Aetius propterea hoc loco pro Nardo Indica habet Phyllon, id est, folium Indum, cuius loco acceperunt Cassiam ligneam veram, quæ Cinnamomo est similis, aut Macis & radicem Spicæ Romanæ ana 3. ij.

ACORI, id est, radicis, quæ nunc improprie vocatur Calamus aromaticus.

PELECINI, id est, seminis eius. in eius penuria accipe semen Nigellæ agrestis & cornutæ: est autem omnino similis veræ Nigellæ, nascitur in agris.

LIBANOTIS hic non significat Rosmarinum sed Angelicam sylvestrem minorem. Nam plures sunt Libanotidis species, semen autem eius accipi debet, quod Cactrys vocatur.

Mithridatium secundum descriptionem Andromachi.

R. Glycyrrhizæ 3 vii. s. ∞ iii.

Opii 3 iii. ∞ ii.

Castorei 3 vi.

Polii 3 v. ∞ ii.

Costi 3 v. ∞ ii.

Nardi Spicæ 3 vi. ∞ ii.

F 6

Cassia,

Cassia, videlicet veræ	3 v. ∞ ii.
Thuris	3 vi.
Seselios	3 v. ∞ ii.
Succi Hypocisthidis	3 vi.
Acori, id est, calami aromatici	3 ii.
Scordii, videlicet veri	3 vi. ∞ ii.
Folii, loco eius sumatur Macis	3 iii.
Gallii	3 v. ∞ iii.
Cypheos	3 vi ∞ ii.
Myrrhæ	3 vi.
Croci	3 vii. ∞ ii.
Cinnamomi	3 vii. ∞ ii.
Styracis, videlicet optimæ	3 vi. ∞ ii.
Zingiberis	3 vii. ∞ ii.
Phu Pontici	3 ii.
Petroselini, videlicet seminis	3 iii. ∞ iii.
Nardi Celticæ	3 iii.
Seminis Fœniculi	3 iii.
Seminis Dauci	3 vi. ∞ iii.
Nardi Indicæ	3 iii.
Hyperici	3 ii.
Acaciæ	3 ii.
Gentianæ	3 iii.
Anisi	3 iii.
Thlaspios	3 vi. ∞ . iii.
Mei Athamantici	3 iii.
Rosarum siccarum	3 iii.
Gummi, videlicet Arabici	3 ii.
Cardamomi	3 iii.
Schoeni, id est, squinanthi	3 vi. ∞ . ii.
Opopanacis	3 vi. ∞ . ii.
Opobalsami siue olei Charyophyllorum	3 vi. ∞ iii.
Galbani	3 vii.

Scinci,

Opiatæ

119

Scinci, videlicet veri 3 v. ii. s. ii.
Terebinthinæ 3 vi. s. ii.
Vini Chii quod sufficit.
Mellis Artici cocti quod sufficit, hoc est,
lib. vi. 3 iii. 3 ii.

FOLIUM duas res significat, folium nardi
videlicet, aut Malabathrum, quod hinc recipien-
dum est.

GALLION herba est multis minimisq; flori-
bus, luteis & odoratis: est autem species Aspergu-
la, Germanicè vocatur Ranritzen.

NARDVS Indica hoc loco non significat Ma-
labathrum, id est, folium, sed radicem Indicæ nar-
di, nam nardi partes tres olim in vsu fuerunt, vi-
delicet radix, folium & spica, antea vero præce-
pit in hanc compositionem sumendam esse spicam
nardi, & folium, id est Malabathrum, ideo neces-
sario hoc loco per Indicam nardum intelligit radi-
cem Indici nardi.

Esdræ antidotus ex Actio.

R. Amomi 3 xii.
Florum Iunci odorati, id est, florum
Squinanthi, eorum loco sume summitates
Squinanthi 3 ix.
Pyrethri 3 vi.
Croci 3 xxxvi.
Cinnamomi 3 vi.
Myrrhæ Troglodyticæ 3 xii.
Styracis calamitæ 3 xviii.
Petroselini 3 iii.
Seminis Dauci 3 iii.
Tragacanthæ

Tragacanthæ	⊖ vi.
Succi Hypocisthidis	⊖ ix.
Iridis Illyricæ, idest, Ireos	
Abrotoni ana	⊖ xv.
Seminis fœniculi	⊖ vi.
Bdellij	⊖ ix.
Thuris	3 j.
Sulphuris viui	⊖ vj.
Seminis Hyoscyami albi	⊖ xxvij.
Cassia lignea aut succedanei eius	⊖ ix.
Seminis papaueris	⊖ xxx.
Spica Nardi	⊖ xij.
Seminis Rutæ	⊖ iij.
Seminis Ocimi	⊖ iij.
Rhois culinarij	⊖ lv.
Seminis anethi	⊖ vj.
Asari, idest, radicum eius	3 j.
Seminis Cardamomi	⊖ vj.
Opi	⊖ xxvij.
Euphorbii	⊖ vi.
Piperis nigri	⊖ xxx.
Rosarum siccarum	⊖ ix.
Phylli	⊖ xii.
Opobalsami siue olei Charyophyllorum	
	⊖ xxiiii.
Ventris mergi	⊖ vi.
Lacæ	⊖ xii.
Lycii Indici	⊖ xii.
Charyophylli	⊖ xii.
Stercoris reperti in aluo mergi	⊖ vi.
Florum Nerij	⊖ iiii. s.
Rheipontici, idest, Rhabarbari	⊖ xii.
Mei Athamantici	⊖ vi.
Terræ Cimolæ	⊖ xii.

Succi

Succi Artemisæ	⊖ xx.
Foliorum seridis, id est, Cichorææ	⊖ ix.
Opicæ Celticæ	⊖ xii.
Castorei	⊖ iii.
Costi	⊖ xii.
Gentianæ	⊖ xii.
Confectiones Hedychroi	⊖ ix.
Anisi	⊖ vi.
Sisonis	⊖ xviii.
Thymiamatis Hammoniæ	⊖ xii.
Foliorum Citrei	⊖ xii.

Vini veteris odorati quantū satis fuerit succis & liquoribus resoluendis. Mellis despumati optimi, ut Aëtius scribit interprete Cornario, lib. v. aut. vi. Sed nos singulis specierum vnciis ternas vncias mellis adiciemus: itaque sume mellis despumati odorati quā optimi lib. vi. ꝑ vii. 3 ii. s.

Arida omnium minutissimè contundito. Opium verò & myrrham, hypocistidem, bdellium, lycium, hammoniacum in uino dissoluito. Tragacanthā deinde seorsim per se affuso vino dissoluito. Deinde omnia simul misceto, addendo etiam despumatam Artemisæ succū. In vniuersum hanc confectionem eodem modo conficis, quo Theriacam, & eodem modo dimittēda est vt effervescat, non omnino repleto vase.

NICOLAUS Alexandrinus duas habet Esstræ compositiones, alteram Magæ, alteram vero Hispaniensis cognomento. Sed quia confusa & indigestæ tantum sunt moles, & numerosis, & nulla harmonia coeantibus simplicibus constant, id. o volumus eas adscribere, his duabus eius receptis paulò exactius

exactius compositis contenti.

RHOIS culinaryj, id est, Sumach videlicet pul-
pa eius sine offeīs seminibus.

PHYLLI, id est, folij, cuius loco pone Spicæ Ro-
manæ, Macis ana ℥ vi.

PRO TERRA Cimolia accipe Bolum præpa-
ratum verum.

SYSON, id est semen illud nigrum, quod apio
simile est, & vocatur improprie Amomi semen.

THIMIAMA Hammoniacum, id est, Gum-
mi Hammoniacum, quod vocant ammoniacum.

VENTRIS Mergi, id est, Stomachi avis Mer-
gi, Germanice vocatur ein Taucher.

NERION, id est, arbor Oleander, pro cuius
floribus acciperadices Vincetoxici. Legitur etiam
in Actio rosarum Rhododaphnis: sed idem est quod
flos Neryj, ideo alterum tantum eorum posuimus.

¶ Mirificè cōtra lethalia venena prodest
aliosque vsus multos habet, quos apud Ae-
tium libro 13. cap. 101. Paulum libro 7. cap.
11. Actuar. in lib. de composit. medicam. re-
peries.

Esdræ antidotus ex Actuario.

R. Mameræ	℥ i.
Amomi, eius loco sume nostrum calamum aromaticum	℥ ii.
Iunci odorati, id est, Squinanthi	℥ s.
Pyrethri	℥ viii.
Croci	℥ i.
Myrrhæ	℥ iii.
Styracis	℥ s. ℥ ii.
	Petroselinij

Opiatæ

123

etrofelini Θ iiii.
 Tragacanthæ \bar{z} i.
 ucci Hypocisthidis 3 iiii.
 reos \bar{z} s. Θ ii.
 eminis sceniculi \bar{z} i.
 folii, aut succedani eius \bar{z} iii.
 Radices Pontices, id est, Rhabarbari
 Rosarum siccarum
 Glycyrrhizæ
 Florum syluestris Punicæ
 Cinnamomi ana \bar{z} iii.
 Nardi Celticæ 3 i.
 Mellis despumati lib. vi. \bar{z} ix. 3 vii.

Myrrham & hypocisthidem in vino dissolue modico, tragacantham verò per se etià dissolue, & confice secundum artem. Actuarius ponit absurdum conficiendi modum, quem non sequimur.

¶ *Mamera loco, sume Doronicum Romanum. Florum syluestris Punicæ, id est, florum Balau-
 stiorum.*

CONDITA.

Caro Citri
 Cortices Citri.
 Flores Citri.
 Arantia Integra.
 Cortices Arantiorum.
 Flores Arantiorum.
 Limones. *Limones conditi frequenter pro Che-
 bulis*

*bulis conditis venduntur. Sed facile deprehenditur
dolus. nam Chebuli vnum tantum magnum & li-
gnosum habet nucleum, Limones vero multa semi-
na, &c.*

Chebuli Myrobalani.

Bellirici Myrobalani.

Emblici Myrobalani.

Citrini Myrobalani.

Indi Myrobalani.

*Omaes quinque Myrobalanorum species iam af-
feruntur ex India condite.*

Nuces Muscatæ. integræ ut ex India afferuntur.

Iuglandes.

Citonia.

Mespila.

Pyra moschatella.

Cerasa.

Pruna sylvestria.

Chryophylli.

Piper in racemis ut ex India affertur.

Calamus aromaticus, id est, verus Acorus.

Galanga.

Zingiber.

Enula Campana.

Secacul, id est, Sifer, Germanicè GritZelmoren,

Clingelmoren.

Eringium.

Pimpinella nostra.

Crethami agrestis radix.

CERTAMVS agrestis herba est Eringij pro-
pmodum folius; Germanicè vocatur Sichelmoren
& SichelKraut: nascitur in agris pinguibus.

Omnia diligenter saccharo clarificato condian

CONSERVAE

CONSERVAE.

Anthos. id est, flos Rosmarini.
 Borraginis.
 Buglossæ.
 Cichorææ.
 Fumiterre.
 Lauendulæ.
 Maioranæ.
 Melissæ.
 Menthæ.
 Nenupharis.
 Primulæ veris. *Primula veris, idem est quod
herba paralytis.*
 Rosarum.
 Pæoniæ.
 Violarum.
 Cardi benedicti.
 Liliorum Conuallium.
 Florum Tilix.
 Euphrasiæ.
 Sambuci.
 Hyssopi.
 Acetose.
 Betonicæ.
 Scabiosæ.
 Saluæ.

Flores minutissimè incidantur, & singulis libris
 florum adduntur Sacchari albißimi libræ duæ, vi-
 delicet qui humidi mucilaginosi fuerint, vt Borra-
 ginis, Buglossæ & c. Siccioribus verò, quales sunt
 Anthos, Lauendulæ, Maioranæ, Melissæ, Saluæ,
 Mentha,

Menthe, & similibus, addantur Sacchari albissimi librae duæ & semis.

Diacitonium simplex.

R. Carnium Citoniorum vapore aquæ dulcis coctorum, & ad spissitudinem coctorum.

Sacchari albissimi despumati, & ad spissitudinem iustam cocti ana lib. viii.

Coquantur ad solidam consistentiam, & extendatur in tabulam seruens massa, refrigerata in partes incidatur. Quidam octo libris carniū Citoniorum, addunt sex libras Sacchari clarificati.

Poteris etiam ita facere.

R. Citoniorum excorticatorum & ab interioribus mundatorum lib. viii. Sacchari clarificati lib. iiii. Coque deinde Citonia super vaporem aquæ dulcis: deinde vnâ cum Saccharo ad iustam spissitudinem coque.

¶ Peculiare remedium est fluxus, vel vomitus, quoniam sipticat & corroborat mēbra collapsa, debilia, confortat stomachum, virtutem retentiuam & digestiuam: & summo opere excitat gustum. Sed ad fluxum datur ante cibum, & ad vomitum compescendum post cibum.

Diacitonium

*Diacitonium compositum, descriptio-
re Nicolai.*

R. Carnium Citoniorum comminutarum
& coctura inspissatarum lib. iii.

Coquantur simul ad iustam consistētiam &
postquā ab igne deposueris, antequā re-
frigerentur, insperge subsequentes species
in tenuissimum puluerem contritas.

Cinnamomi ʒ i. s.

Zingiberis ʒ i.

Piperis

Galangæ ana ʒ s.

Charyophyllorum

Nucis Muscatæ ana ʒ iii.

Spicæ nardi

Ligni aloes

Macis

Cardamomi ana ʒ ii.

Zedoariæ ʒ i.

Extēdatur tota massa in tabula marmorea prius
rosacea aqua iniuncta in qua aliquid Moschi disso-
lutum fuerit.

Et quando ut alium soluat conficere volueris,
antequam in tabula marmorea extendatur in vnā
quāque lib. adde Scammoneæ ʒ s. quæ bene tri-
ta subigatur composito.

MEL habet Nicolaus, ego potius consulerem ut
Saccharum loco Mellis adderetur.

Quedam exemplaria habent Mellis lib. iij.
Sed Nicolai exemplar quod ad meas manus perue-
nit,

108 Confectiones

nit, habet lib. iiij. Nam neceſſè eſt etiam, vt
ſpecies ſuum conſervatiuum habeant.

¶ Hoc eſt calidius & melius ad ea quę di-
ximus, reſoluit ventofitates, remouet ſcœ-
torem corporis, reſtituit priſtinum colorẽ,
& magis reſtaurat.

Diacitonium eſt ſucco Citoniorum.

R. Succı Citoniorum deſpumati lib. xii.
Mellis optimi deſpumati
Sacchari albıſſ. clarificati ana lib. ii.
Coquantur ſimul ad iuſtam ſpiſſitudinem,
deinde ab igne remotis & adhuc tepenti-
bus inſperge ſubſequentium ſpecierum
pulueres minutıſſimè tritos, & per cri-
brum excuſſos.

R. Cinnamomi
Nucis Muſcatae ana ꝑ̄ iii.
Charyophyllorum
Zingiberis
Galangae ana ꝑ̄ ii.
Radicularum nardi Celticae
Piperis nigri
Ligni aloës
Macis
Zedoariae
Cubebarum
Cardamomi ana ꝑ̄ i.
Conſice ſecundum artem.

LENITIVA

LENITIVA ET SOLUTIVA.

Flores Cassiæ fistulæ solutiæ.

R. Cannas seu siliquas Cassiæ ponderosas, & quæ non resonant concussæ, aperi eas & contentam in eis pulpam seu medullam cum laminis & seminibus suis diligenter eua-
cua exempta proiice super inuersum & angustum cribrum, setis equinis contextum. Cribrum deinde pone supra bullientis vaporis, & auerso cochlearis conuex-
dullam cassiæ hinc & inde ducito, ut
cribrum paulatim excernatur, & si quic-
tum est, aut penetrauerit, confestim
de auferto, ne plus quam necesse est
pore imbibat, idq; tandiu facito, donec quā-
tum voles collegeris. Porro cum necessitas
requirit, semper recentes exprime cassiæ flo-
res, repositæ enim acescunt.

Siquis Cassiæ flores siue pulpam magis
solutiuam reddere volet, in bullientem a-
quam proiciat solia Persici aut flores Per-
sici, & Prunellorum syluestrium, aut om-
nia hæc simul: horum enim vapor & destil-
lata aqua soluit aluum.

¶ Mundificat sanguinem, & compescit
omnem acuitatem, & sedat sitim & pro-
riè cum succo Endiuæ, aut Traxaconis. in
quibus aduenerit depuratio secundum

te. .

tem. Et ipsa quidem mūdificat stomachum,
& educit choleram & phlegma, & operatur
illud sine nocumento & excessu, caret enim
mordicatione. Et ipsa quidem lenit pectus
& guttur, & resoluit apostemata acuta in
eis. Et confert calefactioni renum sumpta
cum diureticis & infusione Glycyrrhizæ,
& prohibet generationem lapidis in eis, &
confert febribus calidis.

Diacassia cum Manna.

R. Prunorum Damascenorum ℥ ii.
Florum violarum M i. s.
Aquæ fontanæ ℥ xviii.
Bulliant secundum artem vsque ad medieta-
tis consumptionem, cola, & in colatu-
ra dissolue
Pulpæ Cassiæ ℥ vi.
Pulpæ Tamarindorum ℥ i.
Mannæ optimæ Calabrinæ ℥ ii.
Syrupi violarum ℥ iiii.
Sacchari candi
Sacchari Penidii ana ℥ i.
Sacchari Violati ℥ iiii.
Confice secundum artem.

*Pulpa Tamarindorum fit vt pulpa Cassiæ, si-
ue flores Cassiæ.*

¶ Est pro delicatis, qui habent stipticum
ventrem: non enim est ingrati saporis, nec
molesta, sed salubris: lenit viscera, subdu-
cit aluum, purgat choleram, & mitigat fe-
bres.

Cassia

Cassia extracta sine folijs Senæ.

℞. Prunorum numero xii.
 Violarum M i.
 Hordei mundi
 Anisi
 Polypodii
 Seminis Cartami ana 3 v.
 Capillorum Veneris
 Thymi
 Epithymi ana M s.
 Passularum 3 s.
 Fœniculi feminis 3 ii.
 Seminis Portulacæ
 Seminis Maluæ ana 3 iii.
 Glycyrrhizæ 3 iii.
 Fiat horum decoctio in sufficienti quantitate aquæ, colentur, in colatura dissolue
 Pulpæ Cassiæ lib. ii.
 Pulpæ Tamarindorum 3 i.
 Cinnamomi 3 iii.
 Sacchari optimi lib. i.
 Coquantur ad perfectionem secundum artē.

Cassia extracta cum folijs Senæ.

℞. Confectionis Cassiæ extractæ sine folijs
 Senæ lib. ii.
 Pulueris foliorum Senæ 3 ii.
 Misce secundum artem.

¶ Facile soluit, lenit asperitatem intestinorum, remouet stipticitatem, & ventris

G onus

onus subducit, & morbis choleris & melancholicis auxilia præbet.

Cassia extracta pro clysteribus.

R. Violarum, idest, florum violarum

Maluæ

Mercurialis

Betæ

Parietariæ ana M i.

Fiat horum decoctio in sufficienti aqua, cuius beneficio Cassia extrahatur, & cannæ eius interius lauentur. Deinde

R. Pulpæ Cassiæ cum hac decoctione extractæ & ad spissitudinem coctæ lib. i.

Sacchari lib. i. s.

Coque ad perfectionem secundum artem.

Quidam addunt Diagridium siue Scammoneam. Sed hoc nemo faciat insciis doctoribus Medicis.

PARIETARIAE, videlicet veræ, quæ circa macerias & muros nascitur, sub stillicidijs tectorum, & non sylvestris illius herbæ luteis floribus, quæ dicitur Germanicè Tag vnd nacht.

¶ Est lenitiua ventris & lenis, & est medicina pro delicatis, carens acuitate & mordicatione, & omni excessu lædente.

Electuarium Lenituum.

R. Passularum enucleatarum

℥ ii.

Adianti

Adianti nigri
 Violarum
 Hordei mundi ana M i.
 Iuiubarum
 Sebesten ana numero xx.
 Glycyrrhizę
 Prunorum enucleatorum
 Tamarindorum ana 3 vi.
 Sene
 Polypodii ana 5 ii.
 Mercurialis M i. s.
 Decoquantur secundum artem in sufficien-
 ti aqua, cola, & in colatura dissolue
 Pulpę Cassię
 Pulpę Tamarindorum
 Pulpę prunorum
 Sacchari optimi
 Sacchari violati ana 5 vi.
 Pulueris Senę 5 iii. 3 iii. s.
 Confice secundum artem.

ADIANTVM: nigrum, id est, capillus Vene-
 ris verus, qui à Lugduno affertur.

¶ Vfus eius est in febribus humoralibus
 & pleuresi, lenit enim & mollit intestina, &
 delet eorum stipticitatem, facilè soluit sine
 molestia & læsione choleram phlegmaticam
 & melancholicam.

Electuarium lenitiuum de Manna Ni-
 colai Alexandrini.

R. Capillorum Veneris

G 2 Scolo

Scolopendriæ, vel loco eius Ceterach sic
vocata

Hepaticæ, hoc est Lichenis ana 3 iii.

Seminis Cucurbitæ

Seminis Citrulli

Seminis Melonis

Seminis Cucumeris

Violarum ana 3 i.

Prunorum Damascenorum numero xx.

Coquantur in aqua ad dimidias, deinde per
colentur cum expressione, in colato dis-
soluatur

Mannæ optimæ puræ

Conseruæ violarum

Pulpæ Cassiæ recens extractæ ana 3 i.

Sacchari albissimi lib. iiii.

Concoquantur ad mellis consistentiam, po-
stremò species sequentes iniiciantur.

Nucleorum Seminis Melonis

Seminis Cucumeris

Seminis Cucurbitæ

Seminis Citrulli

Florum violarum

Florum Nenupharis

Seminis Lactuæ

Seminis Scariolæ

Seminis portulacæ

Rhabarbari electi

Foliorum Senæ ana 3 i.

His accuratè subactis conficiatur electua-
rium.

¶ Vtile est ad purgandum sanguinem, ad
cholera reprimendam & melancholiam:
valet

valet etiam ad hepar calefactum, & corpus
uniuersum perpurgat.

Electuarium de Sebeste, D. Bartholo-
mæi Montagnanæ.

R. Sebesten sine nucleis.

Prunorum siccorum enucleatorum

Tamarindorum ana $\bar{3}$ v.

Aquæ violarum lib. i.

Aquæ Ireos

Aquæ Anguriæ ana $\bar{3}$ vi.

Succi Mercurialis depurati $\bar{3}$ iiii.

Penidiorum $\bar{3}$ viii.

Diapruni simplicis lib. i. s.

Nucleorum seminis Cucurbitæ

Cucumeris

Melonis

Citrulli ana $\bar{3}$ ii.

Diagridii 3 iii.

Caro siue pulpa Sebesten, Prunorum, &
Tamarindorum minutissimè teratur & cum
aquis extrahatur. Semina verò minutissimè
incidantur, & reliquis misceantur, & fiat se-
cundum artem Electuarium.

ANGVRIA est Melon magnus, viridis, alio
nomine vocatur Abateca siue Batega, & Melon In-
dus. Quidam per aquam Anguriæ intelligunt suc-
cum eius, & non malè, nam hic magis aluum lenit.

¶ Confet febribus cholericis interpol-
latis, & continuis puris, & sedat acuitatem
febrium, sitim & vigilias, & etiam amaritu-

G 3 dinem

dinem remouendo, & educit materias acutas à viis vrinalibus, & vesica.

Medulla siue pulpa Prunorum.

R. Prunorum magnorum acetosorum & vinosorum quantitatem, quam volueris, & exemptis nucleis in fictili vitreato magno coquito, deinde per cribrum setaceum exprimito, expressam pulpam iterum lento igne ad perfectam & iustam spissitudinē coquito, & sine Saccharo reponito.

Medulla prunorum vinosorum, calorem & sitim in febribus mitigat, & melius est vt conseruetur sine saccharo, Cerasorum modo inspissata.

Porrò si medullam prunorum laxatiuam requiris, ex dulcibus prunis aut prunis Hùgaricis magnis exiccatis conficito.

¶ Calorem & sitim in febribus mitigat.

Diaprunum compositum non laxatiuum, D. Nicolai.

R. Prunorum Damascenorum electorum numero centum.

Coquantur in modica aqua donec emolliantur, excola, deinde decoctum eorum priuatim reponens, ipsa verò pruna super inuersum & vasi impositum cribrum ponantur, & manibus hinc & indè ducantur, & præmantur, donec omnis eorum pulpa penetrauerit, & cutis cum nucleis tantum remaneant. Collectam deinde pulpam, & excola -

olatum eorum decoctum, in quo bulliuerit
iolarum $\bar{3}$ s. lento igne ad spissitudinem
coquito. Melius esset si prunorū pulpa per
ē inspissaretur, & si cum decocto prunorum
& iolarum pulpa Tamarindorum extrahe
retur. Deinde cum inspissaueris,

R. Pulpæ inspissatæ lib. i.

Sacchari clarificati lib. ii.

Pulpæ Tamarindorum

Pulpæ Cassiæ ana $\bar{3}$ i.

Agita omnia simul supra ignem, deinde
insperge subsequens specierum pul
uerem.

R. Sandali albi

Sandali rubei

Spodii

Rheubarbari

Cinnamomi ana 3 iii.

Rosarum

Violarum

Seminis portulacæ

Seminis Scariolæ

Seminis Berberis

Succi Glycyrrhizæ

Tragacanthæ ana 3 ii.

Seminis Cucurbitæ

Seminis Cucumeris

Seminis Citrulli

Seminis Melonis ana 3 i.

Confice secundum artem.

Dicitur etiam hæc confectio Diadamasce
nem, à prunis Damascenis, quæ capit.

Quidam ponunt prunorum non nume
rocentum, sed lib. i. sed malè, nam ex

G 4 Nicola o

Nicolao Alexandrino omnes alij hanc compositionem desumpserunt.

Quædam exemplaria non habent Cinnamoum. Sed Nicolaus Alexandrinus id ipsum ponit, & nisi ingrederetur Cinnamomi pondus, confectio hæc esset manca: nam Nicolaus Alexandrinus scribit totam confectiorem habere lib. iiii. & s. & sic est. Impressi tamen codices mendosi sunt, habent enim lib. ii. & s. Ita pro cifra 3. posuerunt 2. facili errore, non tamen condonando.

NICOLAUS Alexandrinus non ponit semen Cucumeris, nam si posuisset, dixisset confectiorem habere lib. iij. & s. & 3 i. Itaque 3 i. seminis Cucumeris adiecta est à posterioribus, nihil tamen refert, cum potius conducatur.

PER semina Cucurbitæ, Cucumeris, &c. debet intelligi exempta eorum medulla, & hoc semper intelligendum, est cum pulueres horum seminum ingrediuntur in confectiões quasunque.

¶ Datur acutas & peracutas patientibus, & maximè causoni & synocho in principio in augmento & statu ægritudinis. Et sine Diagridio potest exhiberi in omni hora diei: cum Diagridio verò, in aurora matutinali, & cum cautela, quoniam est solutiuum forte.

Diaprunum

*Diaprunum compositum, laxatiuum,
descriptione Nicolai.*

R. Diapruni non Laxatiui adhuc recentis
& calidi lib. iiii.

Scammonæ præparatæ ʒ ii.

Misce & reponere.

Medulla siue pulpa Cerasorum.

R. Cerasorum acetosorum quantum volue-
ris, coque per se sine humore aliquo, & per
cribrum setaceum manibus exprime, & ad
spissitudinem iustam coque, ac sine Saccha-
ro reponere, ut medullam prunorum. Pote-
rit qui volet etiam cum saccharo conficere.

Diamarenatum simplex.

R. Amarena Cerasa quantum libuerit, & cū
modico uino coque, coctas per cribrum ma-
nibus exprime, expressam deinde pulpā ad
spissitudinem coque, & deinde

R. Inspissatæ pulpæ lib. xii.

Sacchari clarificati & inspissati lib. viii.

Confice secundum artem.

AMARENAE sunt magna Cerasa gustu vi-
nosa, quæ Germanicè vocantur Amarellen, am-
merlinge, & amelber.

G s Diamar-

Diamarenatum compositum.

R. Diamarenati simplicis iam confecti, &
adhuc calidi lib. iiii.

Cui insperge, sequentes species in minutissi-
mum puluerem tritas.

R. Cinnamomi

Nucis Muscatæ ana ʒ i.

Zingiberis

Galangæ ana ʒ iiii.

Cardamomi

Charyophyllorum

Macis

Lignialoës ana ʒ iii.

Confice secundum artem.

Ad hunc modum potes etiam facere confe-
ctiones ex cynosbatis & cornis, hoc est
corni fructibus.

Diacatholicon Nicolai.

R. Pulpæ Cassiæ fistulæ

Pulpæ Tamarindorum

Senæ mundatæ ana ʒ ii.

Rheubarbari

Violarum

Polypodii ana ʒ i.

Glycyrrhizæ rasæ

Penidiorum

Sacchari candi

Seminis Cucurbitæ

Seminis Citrulli

Seminis Cucumeris

Seminis

Seminis Melonis ana 3. ii.
 Conterenda conterantur, & seminum qua-
 tuor maiorum nuclei incidantur, postea
 omnia simul conficiantur, cum subsequē-
 ti syrupo.

R. Polypodii 3 i.
 Fœniculi, id est, feminis eius 3 vi.
 Fiat horum decoctio in aqua cœlesti quan-
 tum sufficit, addendo
 Sacchari optimi. lib. ii.

NICOLAUS Alexandrinus hanc confectiōē
 vocat Catholicum, è quo desumpta est. Is paulò ali-
 ter eam describit: sed quia impressum Nicolai exē-
 plar in hac confectiōe valde mendosum est, malui
 ex concordi aliorum traditione hanc adscribere.

¶ Confert acutis & peracutis morbis: e-
 molli't enim, alterat, roburque addit iecino-
 rosis & lienosis.

*Electuarium Indum maius, descriptio-
 ne Mesuæ.*

R. Cinnamomi
 Charyophyllorum
 Spicæ Indicæ
 Rosarum
 Cassiæ lignæ, veræ (aut succedanei eius)
 Macis
 Cyperi, videlicet rotundi ana 3 iiii.
 Sandali Citrini 3 ii. s.
 Ligni aloës
 Nucis Muscatæ ana 3 ii.
 G 6 Turbith

Turbith optimi 3 l.
 Sacchari
 Penidiorum ana 3 xx.

Galangæ
 Cardamomi maioris
 Cardamomi minoris
 Afari

Mastiches ana 3 i. s.
 Diagridii 3 i. 3 iiii.

Omnia terantur, & cum oleo amygdalino
 dulci fricentur, & cum subsequenti syru
 po conficiantur.

R. Succi Citoniorum

Succi Granatorum

Succi Apij

Succi fœniculi oïum depuratorū ana lib.s.

Mellis despumati optimi lib. iiii. s.

Decoquantur succi cum melle ad spissitudi-
 nem iustam secundum artem.

¶ Excrementa humorum, maximè pitui-
 toforum ac putridorum, ventriculo & alijs
 nutritorijs instrumentis educit. Crassos in
 ijs etiam flatus dissoluit, malaq; hinc nata sa-
 nat: verbi gratia, inflationem ventriculi, co-
 licos & renum dolores.

*Electuarium Indum minus, descriptio-
 ne Mesuæ.*

R. Turbith optimi 3 vi.

Sacchari tantundem

Macis

Charyophyllorum

Piperis

Piperis
Zingiberis
Cinnamomi electi
Cardamomi maioris
Nucis Muscatæ ana 3 vii.
Scammoneæ correctæ 3 xii.
Mellis optimi despumati triplum, hoc est
lib. ii. 3 iii. 3 iii.
¶ Habet intentionem maioris.

Confectio Hamech maior, descriptione Mesuæ.

R. Myrobalanorum Citrinorum 3 iiij.
Chebulorum
Indorum
Rheubarbari ana 3 ii.
Agarici
Colocynthidæ
Polypodii quercini ana 3 xviii.
Absinthii
Thymi
Senæ ana 3 i.
Violarum 3 xv.
Epithymi 3 ii.
Anisi
Fœniculi
Rosarum ana 3 vi.
Succi fumi terræ lib. i.
Prunorum numero lx.
Passularum maiorum enucleatarum 3 vi.
Infundantur omnia in feri quantitate sufficienti, & ponantur in vitro angusti orificij bene obturato, & dimittantur per dies.
quinque

quinque. Postea ad ignem ferueant vna atq;
altera ebullitione, deinde colentur.

In colatura dissolue

Pulpæ Cassiæ ʒ iii.

Pulpæ Tamarindorum ʒ v.

Mannæ ʒ ii.

Agitentur simul, & adiiciatur

Sacchari clarificati lib. i. s.

Scammonæ correctæ ʒ i. s.

Coquantur simul ad mellis spissitudinem,
deinde aspergatur subscriptarum specierum
pulis.

Myrobalanorum Citrinc

Chebulorum

Indorum ana ʒ

Bellericorum

Emblicorum

Rheubarbari

Seminis fumi terræ ana ʒ iii.

Spicæ nardi Indicæ

Anisi ana ʒ ii.

Confice secundum artem.

¶ Morbis omnibus ex flaua bile & pituita
falsa natis, nempe impetigini, scabiei, elephan-
tiæ, & cancro succurrit. In summa omni scē-
ditati cutis à biliosis & adustis humoribus
procreata conuenit.

*Confectio Hamech minor, descriptio-
ne Mesuæ.*

R. Myrobalanorum nigrarum, id est, In-
darum

Chebulorum

Chebulorum
 Epithymi ana 3 l.
 Fumi terræ
 Absinthii ana 3 xx.
 Thymi
 Calaminthæ
 Polypodii quercini
 Agarici
 Glycyrrhizæ
 Buglossæ ana 3 x.
 Stichados Arabicæ
 Chamædryos, videlicet veræ
 Chamæpityos, id est, Iuæ moschatæ
 Bedeguaris (eius loco fume carduum bene
 dictum)
 Anisi ana 3 v.
 Prunorum
 Iuiubarum
 Sebesten ana numero lxx.
 Passularum enucleatarum lib. i.
 Decoquatur in aqua sufficienti vsque ad ter-
 tias, colentur, & colaturæ addantur de-
 fruti siue Sapæ lib. ii.
 Mellis despumati lib. i.
 Scammonæ correctæ 5 ii.
 Coquantur lento igne vsque ad mellis spif-
 situdinem.

¶ Purgat melancholiam, & vstos humo-
 res alios, ob id confert mania, melancho-
 lia, vertigini, obliuioni & vitis cutis, qua
 lia sunt, psora, id est, scabies, morphea,
 cancer, elephantia, impetigo.

Diaphœnicon,

Diaphœnicon, descriptione Mesuæ.

R. Dactylorum Heiron enucleatorum, ac
tribus diebus in aceto maceratorum ̄
ii. ̄ ii.

Penidiorum ̄ i. ̄ i.

Amygdalorum dulcium 3 v.

Turbith 3 vi.

Scammonæ, id est, diagridii 3 ii.

Zingiberis

Piperis longi

Foliorum Rutæ

Cinnamomi

Macis

Ligni aloës

Anisi

Fœniculi

Dauci

Galangæ ana ̄ i. gr. v.

Mellis despumati triplum, hoc est lib. j.

̄ .iij. 3 vi. ̄ i. s.

Fiat secundum artem Electuarium.

¶ Febris compositis & diuturnis auxiliatur: bilem enim flauam & pituitam ducit. Colicis cruciatibus mirificè confert, item doloribus uentriculi, & alijs malis ex crudo humore ortis.

Diaphœnicon in forma solida.

R. Dactylorum infusorum in aceto tribus diebus ac noctibus, numero vj.

Seminis

Solutiua

147

Seminis Leuistici 3 ij.
 Pineorum nucleorum
 Amygdalorum dulcium ana 3 xv.
 Turbith 3 xii.
 Diagridii 3 xi.
 Sacchari candi 3 ii.
 Piperis longi
 Zingiberis
 Foliorum Rutæ
 Cinnamomi
 Macis
 Fœniculi
 Anisi
 Dauci
 Galangæ
 Ligni aloës ana 3 i.
 Sacchari lib. j.
 Fiet confectio in rotulis, secundum artem.

*ISTA confectio solida Diaphœnicon plerisque
 medicis est vsui.*

Diasena, descriptione Nicolai.

R. Senæ 3 iii.
 Auellandarum tostarum numero l.
 Serici tosti 3 ii.
 Lapidis Armeni loti 3 i.
 Lapidis lazuli loti 3 iii.
 Sacchari 3 vi.
 Cinnamomi 3 i.
 Charyophyllorum
 Galangæ
 Piperis

Spicæ

Spicæ nardi Indicæ
 Ocimi
 Foliorum Charyophyllorum
 Cardamomi
 Croci
 Zingiberis
 Zedoariæ
 Florum Rosmarini
 Macropiperis ana 3 ii.
 Mellis despumati lib. ii.

LAPIS Armenus est similis lapidi LaZuli, sed non est tantopere cæruleus, sed magis viridis.

FOLIA Charyophyllorum, sunt similia folijs lauri, & odorem atque saporem habent Charyophyllorum, eorum loco sume Charyophyllos ipsos.

¶ Succurrit melancholicis, mania vexatis, & quartana tristitiaq; affectis, lienosis & omnibus malis ex atra bile procreatis.

Benedicta laxatiua, descriptione Nicolai.

R. Turbith electi
 Sacchari ana 3 x.
 Diagridii
 Esulæ
 Hermodactylorum
 Rosarum ana 3 v.
 Charyophyllorum
 Spicæ nardi Indicæ
 Zinziberis
 Croci
 Saxifragiæ

Saxifragiæ
Macropiperis
Amomi (sumatur acorus verus eius loco,
vel calamus aromaticus)
Cardamomi minoris
Seminis Apii
Salis Gemmei
Galangæ
Macis
Carui
Fœniculi
Seminis Asparagi
Seminis Rusci, id est, brusci
Granorū solis, id est, millii solis ana 3 i.
Mellis despumati optimi triplum, hoc est
lib. i. 3 vi. 3 iii.
Confice secundum descriptionem.

DOSIS istius electuarij per os sit à 3. iij.
ad 5 s.

P B R semen Asparagi & Rusci intellige car-
nem & pulpam eius, reieclis nucleis offeis.

¶ Humores pituitosos, potissimū ad
articulos decumbentes, elicit. A renibus
quoque & vesica purgat.

Electuarium Elefscoph siue Episcopi,
descriptione Mesuæ.

R. Scammoneæ Antiochenæ
Turbith optimi ana 3 vi.
Charyophyllorum
Cinnamomi

Zingiberis

Zingiberis

Myrobalanorum Emblicorum

Nucis Muscatæ

Polypodii ana 3 ii. s.

Sacchari 3 vi.

Mellis despumati triplū, id est 3 x. 3 i.

¶ Bilem flauam & pituitam elicit, flatus quoque expellit, doloribus articulorum, laterisque prodest, itemque colicis cruciatibus, ad renes etiam & vesicam decumbentes humores expurgat.

Electuarium de Psyllio, descriptione Mesuæ.

R. Succi Buglossæ domesticæ

Succi Buglossæ agrestis

Succi Endiuix

Succi Apii, omnium coctorum & despumatorum ana lib. ii.

Succi fumi terræ 3 iii.

In quibus maceretur per xxiiii. horas subsequentia.

R. Cuscutæ

Anisi

Senæ ana 3 s.

Capilli Veneris M i.

Asari

Spicæ nardi Indicæ ana 3 ii.

Bulliant aliquantulum adiiciendo

Violarum 3 iii.

Epithymi 3 ii.

Hæc postquam modicè bulliuerint, colentur.

Solutiua

151

rum, & colaturæ iniiciantur

Pſyllii ſeminis integri ʒ iii.

Macerentur per xxiiii. horas, ſingulis ho-
ris agitando, deinde ſume expreſſæ à Pſyl-
lio mucilaginis lib. iiii.

Sacchari albiſſimi deſpumati lib. ii. s.

Diagridii in cotonio malo aſſati ʒ iii. s.

Coquantur lēto igne ad perfectionem, Ad-
dendo puluerem

Trochiſcorum Diarhodon

Rheubarbari electi ana ʒ i.

Trochiſcorum Berberis ʒ s.

Confice ſecundum artem.

*PER Bugloſſam domeſticam potes intelligere
Boraginem, vel magnam illam Italicam Bugloſ-
ſam.*

¶ Flauam bilem euocat, febribus arden-
tibus & curatu difficilibus auxiliatur, dolo-
ri capitis & vertigini à bilioſorum humorū
euaporationibus procreatis, morbo regio,
& iecori ſupra modum calefacto.

*Electuarium roſatum, deſcriptione Me-
ſue.*

R. Succī roſarum rubearum perfectarum
lib. iiii.

Sacchari Tabarzet, id eſt, albi lib. i. s.

Mannæ puræ & recentis ʒ vi.

Scammonix Antiochenæ ʒ i. s.

Coquantur ſenſim ad ignem molliusculum,
dum ad mellis conſiſtentiam uſque den-
ſeſcant,

fescan, deinde insperge
 Trochiscorum de Berberis 3 iii.
 Trochiscorum de Spodio 3 i.
 Gallie Moschatae verae
 Croci ana 3 ii.
 Reponatur in vase vitreo.

¶ Est cholagogum clemens, ob id salubre biliosis affectibus, arthritidi calidae, cephalalgiae calidae, vertigini, oculorum dolori, ictero.

Electuarium de succo rosarum, descriptione Nicolai.

R. Succi rosarum rubearum
 Sacchari albisimi ana lib. i. 3 iii.
 Diagridii 3 i. 3 iii.
 Sandali rubei
 Sandali albi
 Sandali citrini ana 3 vi.
 Spodii de Ebore 3 iii.
 Camphorae 3 i.
 Succus rosarum cum saccharo ad iustam consistentiam coquatur, deinde tritae species adiciantur,
 Haec compositio potest fieri in forma solida.

¶ Expellit flauam bilem citra molestiam ad morbos articulorum ex biliosis & calidis humoribus natos, ad febresque tertianas confert.

Diaturbich

Diaturbith cum Rheubarbaro, descriptione Montagnanæ.

R. Turbith optimi
Hermodytylorum ana ̄ i.
Rheubarbari 3 x.
Diagridii 3 iiii.
Sandali albi
Sandali rubei
Violarum
Zingiberis ana 3 i. s.
Maltiches
Anisi
Cinnamomi
Croci ana 3 s.
Sacchari albißimi triplum, hoc est, lib. i.
̄ ii. 3 ii.
Poteß fieri in liquida & solida substantia.

¶ Est cholagogum, phlegmagogum, & melanogogum.

Diaturbith maius.

R. Turbith optimi ̄ i.
Diagridii
Zingiberis ana 3 iiii.
Cinnamomi
Charyophyllorum ana 3 ii.
Galangæ
Piperis longi
Macis ana 3 i.
Sacchari albißimi ̄ viii. 3 v.
¶ Ducit

¶ Ducit phlegmaticos humores, & purgat, & calefacit.

Diaturbith minus, descriptione Zexaris.

R. Turbith albi & gummosi	3 x.
Zingiberis	3 v.
Mastiches	3 iii.
Sacchari albissimi	3̄ vi. 3 vi.

¶ Leuiter purgat phlegma à stomacho.

Diacartamu, descriptione Arnoldi de Villa noua.

R. Specierum Diatragacanthi frigidi	3̄ s.
Pulpæ Citoniorum	3̄ i.
Medullæ seminis Cartami	3̄ iiii.
Zingiberis albi	3̄ ii.
Diagidii	3̄ iii.
Turbith albi	3̄ vi.
Mānnæ granatæ	3̄ ii.
Mellis rosati colali	3̄ i.
Sacchari	3̄ viii.
Hermodytylorum	3̄ iiii.
Sacchari albissimi	3̄ x. 3̄ iii.

Fiat in liquida substantia.

Cum autem species reseruare volueris, mel rosatum non conuenit addere. Si autem species alicui daturus es, pro viii. drachmis sacchari, impone Sacchari 3̄ viii.

PVLPA siue caro Citoniorum hinc requiritur exiccata.

¶ Prodest

Solutiua

155

¶ Prodest in euacuatione cholere & phleg-
natis.

*Hiera picra simplex, descriptione Ga-
leni.*

R. Cinnamomi

Xylobalsami (aut succedanei eius)

Alari

Spicæ nardi Indicæ

Croci

Mastiches Chiæ ana 3 vi.

Aloes non lotæ 3 centum

Mellis despumati lib. iiii. 3 iiii.

Cum hæc confectio magis confortatiua
quàm solutiua esse debet, cum aloë lota ad-
denda est.

¶ Contra iliosos, putres, marcidosque
humores, qui os ventriculi infederunt, re-
medio est, item ijs quorum faciem pallor
decolorauit, ijs quoque quorum oculis ob-
iecta culicum aut pilorum imagines obuer-
santur, alui recrementa mediocriter mouet,
ad iecur vsque progrediens: lædit eos, qui-
bus iecur calidius exhibet negotium, & sto-
machum iuuat.

Hiera picra cum Agarico.

R. Specierum Hieræ simplicis sine aloë

Agarici trochiscati ana 3 iiii.

Aloes non lotæ 3 i.

Mellis despumati 3 vi.

H Hiera

Hiera picra composita, descriptione Nicolai.

R. Cinnamomi
 Spicæ nardi Indicæ
 Croci
 Schœnanthi
 Asari
 Xylocassie
 Xylobalsami
 Carpobalsami
 Violarum
 Absinthij
 Epithymi
 Agarici
 Rosarum
 Turbith
 Colocynthidis
 Mastiches
 Aloës non lotæ
 Mellis despumati

} quorum loco suman-
 tur succedanea, vt su-
 præ.

ana ʒ ij.
 ʒ x. ʒ ii.
 ʒ viii.

¶ Facit ad diuersas capitis & aurium & ocu-
 lorum distemperantias, stomachum quoque
 optimè purgat, affectiones hepatis emendat,
 splenis duritiem & dēsitatem emollit & ex-
 tenuat. Renibus & vesicæ prodest, & matri-
 cis distemperantiam emendat.

Hieralogodium, descriptione Nicolai.

R. Pulpæ Colocynthidis
 Polypodij
 Euphorbij

ana ʒ ij.

uphorbii
olij montani minoris
occognidii ana 3 i. s. gr. vi.
bsinthii
lyrrhæ Troglodyticæ ana 3 i. gr. xii.
entaureæ minoris
garici
lammoniæ
olij (aut succedanei eius
picæ nardi Indicæ
cillæ assatæ
Diagridii ana 3 i.
Aloes
Comarum Thymi
Cassie lignæ
Chamadryos
Idellii
Prassii ana 3 ii. gr. xiiii.
Cinnamomi
Opopanacis
Castorei
Aristolochiæ longæ
Leucopiperis
Macropiperis
Melanopiperis
Croci
Petroselinæ Macedonici
Sagapeni ana 3 s.
Hellebori nigri
Hellebori albi ana gr. vi.
Mellis despumati triplum, hoc est, 3 x.
3 vi. 3 i. gr. iiii.

H 2 QVAEDAM

250 Lenitiua &

QVAEDAM exemplaria habent Colocynthidis \bar{z} \bar{y} . sed maximo errore. Nos itaque veram compositionem Nicolai Alexandrini sequimur, qui habet hanc proportionem.

COCCOGNIDIII debent esse 3 i. s. & gr. xij. si Alexandrinum Nicolauum sequi uolumus impressum, qui habet 3. xvij. & hac compositio habet decimam partem Nicolai. Itaque si 3. i. s. & gr. xij. multiplicantur per decem, erunt 3. xvij.

NOTA \bar{y} . & gr. xiiij. sunt decima pars drachmarum nouem: in Nicolao autem Alexandrino impresso, non nouem sed undecim legitur: sed hoc factum est vitio librariorum xi. pro ix. ponentium, quamuis impressus codex pro xi. habet II. id est undecim per cifras scriptum. quod autem legendum sit ix. et non xi. indicat degradatio ponderis in tota hac confectione.

¶ Exterminat diuturnas & inueteratas passiones, id est, mania: ad omnes melancholias, epilepsias, scotomaticos, id est, vertiginosos & spumantes caducos, & qui sibi præmordent linguam, cephalalgicos, hemi-cranicos, & qui ita vexantur ex capitalibus commotionibus, ut videantur quasi demonium habere, qui appellantur spatici. Data, purgat, ne incendium aut lipotomia generetur corpori, quod superscriptis passionibus subiacer, quibus inuitis etiam medetur. Paralyticis & tremulis subuenit: datur indigestis, cardiacis, pleuriticis, hepaticis: splenicis: elicit menstrua, nephreticos, arteticos, & ischiadicos subleuat: venena & venenatas passiones & morsus admodum perfanat,

Solutiua

139

erfanat, lepras & varias zermas emendat.
 Est autem sine vlllo periculo, neque alias mo-
 estias infert accipientibus, daturque de ea
 er in mense pondus drachmarum trium cū
 nulse cyathis iij. & salis cochleari.

Hiera Pachij, ex descriptione Nicolai Alexandrini.

R. Stœchados

Marrubii

Chamædryos

Agarici

Colocynthidos

ana x i.

Opopanacis

Sagapeni

Petroselini

Mali terræ

Piperis albi

ana x v.

Cinnamomi

Spicæ nardi

Myrrhæ

Folii

Croci

ana x iiij.

Mellis despumati triplum, id est, x

cclxxxv. qui faciunt lib. iij. 3

iiij. x v.

Arida omnia in tenuissimum puluerem
 tundito, liquores verò opopanacem, saga-
 penum, electa & pura in mortario tundito,
 deinde in feruenti mortario cum melle de-
 spumato feruenti adhuc vnito, ac reliquis
 misceto, cū omnino læuigata fuerint. Cū
 verò mel ad dissoluendos hos liquores acci-

H 3 pies,

pies, de superscripta quantitate sumito, nihil addendo.

MALVM terra, id est, radix Aristolochia *runda vera*.

SCRIBONIVS Largus mirum in modum effert huius Hiere virtutes, quemadmodum etiam Marcellus. itaque non ab re fuerit tuto ea uti, cum & nos eius efficaciam aliquoties experti sumus.

✧ *hæc nota significat Romanis scriptoribus denarium, est autem denarius pondus Romanum drachma paulo grauius. Nam drachmæ octo faciunt unciam, cum denarij septem constituant unciam: non raro tamen indifferenter pro drachma accipitur, sed malè.*

¶ Compositio hæc sanat morbo comitiali correptos, furiosos, scotomaticos, cephalalgicos, facit ad deprauatam in vtralibet partem. Ad tetanum, & Cynicū spasmus, præcipuè verò ad pectoris & lateris dolores prodest, ex qualibet causa factos siue latente & occulta, siue manifesta. Præterea neruorum tensionibus mirificè conuenit, prodest & ad articulare morbum, ad spinam & totius lumborum dolorem: duritias in mammis mulierum cum dolore consistentes, ex toto interdum sanat. Ad stomachicos euidenter conuenit. Remediat enim eos quibus frequenter inacescit cibis, aut assiduè nauseant, aut saliuā abundant, præcipuè verò melancholicis benefacit &c.

Catharticum

Catharticum imperiale, secundum descriptionem Nicolai Alexandrini.

R. Diagridii
 Sacchari ana 3 viii.
 Cinnamomi
 Nardi
 Saxifragiæ
 Polypodii ana 3 iiii.
 Charyophyllorum
 Zingiberis
 Celticæ, id est, spicæ Celticæ
 Melanopiperis
 Macropiperis
 Cardamomi
 Anomi, eius vice sume nostrum calamum aromaticum ana 3 iii.
 Mellis despumati lib. i. 3 iiii. 3 vii.

SAXIFRAGA, quam Græci describunt, mediam habet figuram & magnitudinem inter Pulegium & Thymum. Germanicè vocatur Steinpolei.

¶ Caput optimè purgat, os bene olens reddit, de stomacho & toto corpore vtranque bilem deducit.

Pulvis medicaminis Turbith, descriptione Auicennæ.

R. Zingiberis albi
 Mastiches ana 3 x.
 Turbith subtiliss. puluerizati 3 x.
 H 4 Sacchari

162 Lenitiua &
Sacchari Tabarzet quantum eorum est.
Commisceantur.

¶ Purgat humores phlegmaticos, datur
pueris, mulieribus, senibus; & humidis, de-
licatis & otiosis.

*Pulvis Senæ preparatæ, descriptione
Montagnanæ.*

R. Senæ ʒ xii.
Zingiberis
Macis ana ʒ iii.
Cinnamomi
Tartari ana ʒ i. s.
Hæc in puluerem redacta commisceantur.

¶ Purgat caput mirabiliter.
Dosis ʒ i. ante cœnam.

Pulvis aut Tragea laxatiua.

R. Turbith ʒ i.
Zingiberis
Cinnamomi
Mastiches
Galangæ
Cardamomi minoris
Charyophyllorum
Anisi
Hermodactylorum
Diagridii ana ʒ s.
Foliorum Senæ ʒ ii. Sacchari

Solutiua

163

Sacchari $\bar{3}$ iiii.
Misceantur in puluerem contrita.

¶ Purgat choleram, phlegma & melan-
choliā.

Puluis sternutatorius.

R. Radicum Pyrethri $\bar{3}$ i.
Castorei $\bar{3}$ s.
Hellebori albi
Hellebori nigri ana $\bar{3}$ i.
Maioranæ M i.
Misceantur, fiat puluis lege artis.

Nasalia.

R. Calaminthæ
Maioranæ
Radici Ireos
Seminis Nigellæ
Castorei
Seminis Staphisagriæ ana Θ i.
Hellebori albi
Pyrethri
Nucis muscatæ
Myrrhæ rubæ
Euphorbii ana Θ ii.
In pulueres singula conteratur, deinde cum
Ladani $\bar{3}$ vi. & melle modico for-
mentur nasalia.

H s Species

*Species ad glandes, aut suppositoria
acuta conficienda.*

R. Hellebori albi
Granorum Colocynthis ana $\bar{3}$ i. s
Esulæ preparatæ
Hermodactylorum ana $\bar{3}$ i.
Specierum Hieræ picræ simp. Gal. 3 ii
Misceantur puluerizata.

Suppositoria simplicia.
Conficiantur ex melle & sa'e.

PILVLAE.

*Pilule Alephangine, secundum descri-
ptionem Mesue.*

R. Cinnamomi
Cubebæ
Ligni aloes
Calami aromatici
Macis
Nucis muscatæ
Cardamomi
Charyophyllorum
Asari
Mastiches
Schoenanthi
Spicæ Indicæ
Carpobalsami

Carpobalsami aut succedanei eius ana 3 i.

Abfinthii sicci ana 3 i.

Rosarum ana 3 v.

Conterantur grosso modo, & infundantur in aquæ libris duodecim, & coquantur lento igne in duplici vase vsque ad consumptionem duarum partium, id est, ad remanentiam tertiæ partis. Deinde exprimantur fortiter, & colentur: in colaturæ libris duabus dissolue Aloes Succotrinæ multoties in vitro vase lotæ, cum aqua pluuiali, & iterum siccitate lb. i. agitentur simul continuè in sole: deinde addantur pulueres Myrrhæ, Mastiches ana 3 v. Croci 3 iiii.

Deinde quod reliquum est colati decocti ex aromatibus, etiam affundito, & exiccetur ad solem vel in stufa, admiscendo subinde quod densatum est, liquido, & linteo puro vas obtegatur, aduersus incidentium muscarum & sordium iniurias. Postremò repōnatur massa, & fiant Pilulæ parvæ cū necessitas requirit.

PILULAE Alephanginæ compositæ sunt à Mesue, ut confortent potius stomachum & cerebrum, quàm ut aluum ducant. Propterea aloen toties lotam requirit, & nullum solutivum medicamentum eis admiscet, sed confortantia omnia, nisi quis solum asarum excipiendum esse contendat.

ISTAE pilulæ ubique sunt in frequenti usu, sed rarissime, ut decebat, conficiuntur: nam detrahunt ponderi & numero aromatum, & augent pondus aloes: quidam etiam impurissimam aloen admiscunt, atque ipsius alces sordes. Porro miror, cur

H 6 Mesue

Mesue iubeat vt decoquantur aromata, cum tamen omnia aromata tenuissimis conslent virtutibus, quæ facile inter decoquendum resoluantur. Adeo etiam vt deinde ipsum decoctum aut colatura, prorsus non sapiat aromata quæ incocta fuerant. Sed quia ita preparari hanc massam voluit Mesue, in nulla re immutabimus eius placitum.

QVIDAM confectioni huius massæ pilularum Alephanginarum consulentes, dimidiam aromatum partem cum aqua decoquunt, & aloem in colatura dissolunt: alteram autem partem aromatum in minutissimum puluerem redactam, inter exiccandum massæ admiscunt, non absurda admodum ratione, si aromata decoctionem sustinerent.

¶ Ventriculum, cerebrum, & sensoria humoribus crassis, putribus, pituitosis purgant, & inde natum dolorem dissipant, ventriculum roborant, & concoctionem eius iuuant.

Pilulæ Affaieret, secundum descriptionem Auicennæ.

R. Specierum Hieræ picræ, descriptione Galeni $\bar{3}$ i.

Mastiches

Myrobalanorum Citrinorum ana $\bar{3}$ s.

Aloes optimæ $\bar{3}$ ii.

Syrupi de Sthœchade q. s. Fiat massa.

¶ Bilem flauam & pituitam vacuant.

Pilulæ

Pilulæ Arabicæ, secundum descriptionem Nicolai.

R. Aloes optimæ ʒ iii.

Radicis Bryoniæ

Myrobalanorum Citrinorum

Myrobalanorum Chebulorum

Myrobalanorum Indorum

Myrobalanorum Belliricorum

Myrobalanorum Emblicorum

Mastiches

Diagridii

Asari

Rosarum

ana ʒ j.

Castorei

ʒ iii.

Croci

ʒ i.

Succi Fœniculi

q. ʒ.

Fiat massa.

¶ Valent ad capitis dolorem, vertiginem, hemicraniamque, lætitiā generant, mentisque vigorem conseruant, visum acuunt, auditumq; amissum reparant, ac stomachum à vitiosis humoribus purgant.

Pilulæ Arthriticæ siue Artheticæ, descriptione Nicolai.

R. Hermodactylorum

Turbith

Agarici

ana ʒ iii.

Cassia lignæ veræ

Spicæ nardi Indicæ

Charyophyllorum

Charyophyllorum

Xylobalsami } aut succedaneorum

Carpobalsami } eorum.

Zingiberis

Mastiches

Fœniculi

Anisi

Saxifragiæ

Seminis Asparagi

Seminis Rusci, id est, brusci

Rosarum

Granorum solis, id est, millii solis

Salis gemme ana 3 s.

Aloes optimæ ad pondus omnium

Succi fœniculi quantum sufficit.

Fiat massa.

Ex asparagi & Rusci seminibus tantum
pulpa illa carnosâ accipi debet, abiectis cor-
neis seminibus, idque semper est obseruan-
dum.

¶ Valent ad podagram, aliosque articulo-
rum dolores.

*Pilulæ de Agarico, descriptione Me-
sue.*

R. Agarici

Mastiches ana 3 iii.

Ireos

Præssi ana 3 i.

Turbith 3 v.

Hieræ picæ 3 iiii.

Colocynthidæ

Sarcocollæ

Pilulæ

169

Sarcocollæ ana 3 ii.

Myrrhæ 3 i.

Sapæ quantum sufficit.

Fiat massa.

EGO consulerem vt Hiera picra nondum melle commista acciperetur, hoc est species eius aromatica cum aloe tantum mista: intelligenda autem est Hiera picra simplex Galeni.

SAPA est mustum optimum ad tertias decoctum.

¶ Auxiliatur asthmaticis, & aliis thoracis vitis à crassis & pituitosis humoribus natis.

Pilulæ Aureæ, secundum descriptionem Nicolai.

R. Aloes

Diagridii ana 3 v.

Rosarum

Seminis Apii ana 3 ii. s.

Anisi

Fœniculi

Mastiches ana 3 i. s.

Croci

Pulpæ Colocynthis ana 3 i.

Mucilaginis Tragacanthæ q. s.

Fiat massa.

¶ Caput expurgant, aciem oculorum exacuunt, flatus ventriculi & intestinorum dissoluunt, ac citra molestiam aluum deliciunt.

Pilulæ

Pilulæ Aggregatiuæ, secundum descriptionem Mesuæ.

R. Myrobalanorum Citrinorum
 Raved Seni ana 3 iiii.
 Succu Eupatorii
 Succu Absinthii ana 3 ii.
 Diagridii 3 vi.
 Myrobalanorum Chebulorum
 Myrobalanorum Indorum
 Agarici
 Colocynthidis
 Polypodii ana 3 ii.
 Turbith optimi
 Aloes ana 3 vi.
 Mastiches
 Rosarum
 Salis gemmei
 Epithymi
 Anisi
 Zingiberis ana 3 i.
 Electuarii de succo rosarum Mesuæ q. s.
 Fiat massa.

RAVED Seni, id est, Rhabarbarum orientale optimum.

SUCCI Eupatorii & absinthij debent esse inspissati, ut Aloe,

PER Eupatorium hoc loco intelligendum est Eupatorium quod Mesuæ describit, quod idem est cum Gratiola. Germanicè vocatur vveysaurin, copiosè nascitur ad Albin. igitur hic erit faciendus eius succus

¶ Valet

Pilulæ

171

¶ Valent ad diuturnas febres, & vitia capitis, ventriculi, & iecinoris. Humores item biliosos & pituitosos educunt.

Pilulæ Benedictæ, descriptione Nicolai.

R. Specierum Benedictæ laxatiuæ 3 vi.
Mellis rosati quantum sufficit.
Fiat massa.

¶ Humores pituitosos, potissimum ad articulos decubentes eliciunt, à renibus quoque & vesica purgant.

Pilulæ Cochæ, descriptione Rhasis.

R. Specierum Hieræ picræ Rhasis 3 x.
Colocynthidæ 3 iii. ☉ i.
Scammonææ 3 ii. s.
Turbith
Sthœcadis ana 3 v.
Syrupi de Stœchade quantum sufficit.
Fiat massa.

STOECHAS cum simpliciter & indefinite ponitur, semper est intelligenda Stœchas Arabica.

¶ Cephalica rectius appellantur, quòd scilicet caput magna efficacia expurgent, ex eoque ac nervis humores crassos euacuent.

Hiera

Hiera picra Rhasis ad faciendum pilulas Cochias.

R. Rosarum rubearum
 Spicæ nardi Indicæ
 Mastiches
 Xylobalsami } aut succedaneorum
 Carpobalsami } eorum
 Cinnamomi
 Xylocassie veræ
 Asiri, videlicet radicem eius ana ʒ i.
 gr. vi.
 Aloës 3 vi. ʒ ii.

Pilule de Colocynthide, descriptione Mesue.

R. Pulpæ Colocynthidæ ʒ vi.
 Myrobala. nigrarum, id est, Indarum
 Myrobala. Citrinarum
 Sagapeni
 Bdelli mollis
 Sarcocollæ ana 3 v.
 Aloes 3 vii.
 Nigellæ
 Cymini Carmeni
 Origani Persici
 Nasturtii albi
 Salis gemmei
 Absinthii ana 3 i.
 Succo porri, quantum sufficit
 Fiat, missa.

CYMINVM

CYMINVM Carmenum, id est, orientale, ex Carmania regione.

ORIGANVM Persicum, idem est quod Creticum Origanum, & est Maiorana simile.

NASTVRTIVM album, id est, Thlaspi, Germanica vvegekressen, significat etiam Merretich.

¶ Valent ad affectus pituitosos & melancholicos, ut alphas curatu difficiles, & iun-cturarum dolores.

Pilule de Eupatorio maiores, descriptione Mesue.

R. Myrobalanorum Citrinarum
Succi Eupatorii Mesue
Succi Absinthij ana 3 iij.
Raued Seni, id est, Rheubarbari 3 iij. s.
Mastiches 3 j.
Croc 3 s.
Aloes Bonæ 3 v.
Succi Endiuie quantum sufficit.
Fiat massa.

¶ Mirifice profunt in febribus intermit-
tentibus biliosis, morbo regio, iecinorisq;
obstructionibus.

*Pilule de Euphorbio, descriptione Me-
sue.*

R. Euphorbii
Colocynthide
Agarici
Bdellij

Bdellii mollis

Sagapeni

ana 3 ii.

Aloes

3 v.

Succi porri quantum sufficit.

Fiat massa.

¶ Ad emittendam hydropicorum flauam aquam, & materiam tumoris discutiendam valent: opem quoque afferunt lumborum doloribus, & podagræ humida causa concitata.

Pilule Fœtidæ maiores, descriptione Mesuæ.

R. Sagapeni

Hammoniæ

Opopanacis

Bdellii mollis

Colocynthidæ

Seminis Rutæ

Aloes

Epithymi

ana 3 v.

Hermadaetylorum

Esulæ minoris

ana 3 ii.

Scammoneæ

3 iii.

Cinnamomi

Spicæ nardi Indicæ

Crocæ

Castorei

ana 3 i.

Trubith

3 iii.

Zingiberis

3 i. s.

Euphorbii

3 ii.

Succi porri quantum sufficit.

Fiat massa.

¶ Vacuant

Pilulæ

175

¶ Vacuant Pituitam crassam, crudam, ob id conferunt affectibus inde natis, arthritidi, podagræ, gonagræ, dolori spinæ, & aliarum iuncturarum, uentriculi, colico, alphis, elephantix, & albaras.

Pilulæ Fœtidæ, secundum descriptionem Rhasis

R. Specierum Hieræ picræ Rhasis	3	x.
Colocynthidæ interioris	3	v.
Euphorbii	3	ii. s.
Castorei		
Piperis		
Asæ fœtidæ		
Sagapeni		
Opopanacis		
Seitaragi		
Sinapis	ana	3
Centaureæ minoris		
Elaterii	ana	3 v.

Gummi, siue lacrymæ & liquores omnes densati, in succo Rutæ q. s. dissoluantur, deinde admistis reliquis fiat massa.

SEITARAGI siue Scytari Indum, est herba similis Thlaspi maiori, id est, Merrettich, Latinis vocatur Lepidium maius, Germanicè, Roskressen, Psefferwurzel, Romischkressen & Maurkressen; accipiendæ autem sunt radices eius aut semina.

ELATERIVM, id est, succus fullum Cucumeris asinini exsiccat.

Pilulæ

*Pilulæ de Fumo terræ, descriptione
Auicennæ.*

R. Myrobalanorum Citrinarum
Myrobalanorum Chebulorum
Myrobalanorum Nigrarum, id est, Indarum
ana 3 v.

Aloes 3 vii.

Scammoneæ 3 v.

Succi fumi terræ clarificati quantum sufficit, ut formetur ter hæc massa, nam cum primò fuerit siccata massa, plus succi est addendum & rursus exiccetur, idque tertio est faciendum.

¶ Educunt è corpore humores biliosos, acres & falsos, ideoque aduersus omnia cutis vitia valent.

*Pilulæ de Hermodactylis maiores, de
scriptione Mesuæ.*

R. Hermodactylorum
Myrobalanorum Citrinarum

Aloës

Turbith

Colocynthidæ

Bdellii mollis

Sagapeni ana 3 vi.

Castorei

Sarcocollæ

Enphorbii

Opopanaci

Seminis

Seminis Rutæ

Seminis Apij ana 3 iii.

Croci 3 i. s.

Succi caulium quantum sufficit.

Fiat massa.

¶ Aduersus podagram & arthritin profunt.

Pilulæ Indæ, descriptione Haly.

R. Myrobalanorum nigrarum, id est, Indarum

Hellebori nigri

Polypodij ana 3 v.

Thymi

Epithymi

Stœchados ana 3 vi.

Agarici

Lapidis Lazuli loti

Colocynthidæ

Salis Indi (aut salis gemmei) ana 3 iiii.

Succi Eupatorij inspissati

Spicæ Indicæ ana 3 ij.

Charyophyllorum 3 i.

Hieræ picæ simplicis Galeni 3 xii.

Succi Apii quantum sufficit.

Fiat massa.

¶ Valent ad affectus melancholicos, cancrum, elephantiam, alphas nigros curatu difficiles, melancholiam morbum, & inde ortum tumorem & mœrorem, quartanam, icterum, spleneticum, & splenis dolorem.

Pilulæ

Pilulæ Hieræ simplicis Galeni.

R. Aloes 3 l.
 Cinnamomi
 Xylobalsami (aut succedanei eius)
 Asari
 Spicæ nardi Indicæ
 Croci
 Mastiches Chiæ ana 3 iii.
 Mellis rosati quantum sufficit.
 Fiat massa.

¶ Aduersus vitia ventriculi ex humoribus
 biliosis & pituitosis nata, profunt.

Pilulæ de Hiera composita, descriptione Nicolai.

R. Cinnamomi
 Spicæ nardi Indicæ
 Croci
 Schœnanthi
 Asari
 Xylacasix
 Xylobalsami } aut eorum succeda-
 Carpobalsami } neorum.
 Violarum
 Ablinthii
 Epithymi
 Agarici
 Rosarum
 Turbith
 Colocynthidæ

Mastiches

Mastiches ana ʒ ij.

Aloes ʒ x. ʒ ii.

Fiat massa cum aqua Endiuix.

¶ Opē ferunt vitijs capitis, neruorumq;
ab humoribus pituitosis procreatis.

Pilulæ Hieræ cum Agarico.

R. Specierum Hieræ simplicis Galeni

Agarici trochiscati ana ʒ iii.

Aloes bonæ ʒ i.

Mellis rosati quantum sufficit.

Fiat massa.

¶ Auxiliantur stomachicis, asthmaticis,
& aliis stomachi & thoracis vitiis à crassis &
pituitosis humoribus natis.

*Pilulæ de lapide Lazuli siue Cyaneo,
descriptione Mesuæ.*

R. Lapidis Lazuli abluti ʒ vi.

Epithymi

Polypodii ana ʒ viii.

Scammonæ

Hellebori nigri

Salis Indi, aut gemmei ana ʒ ii. s.

Agarici ʒ viii.

Charyophyllorum

Anisi ana ʒ iii.

Specierum Hieræ simplicis Galeni ʒ xv.

Succi Endiuix quantum sufficit.

Fiat massa.

I

¶ Valent

¶ Valent ad affectus melancholicos, & bile vltanatos.

Pilulæ de lapide Armenio, descriptione Mesuæ.

R. Lapidis Armenii loti & præparati
 Hieræ picræ ana 3 v.
 Epithymi
 Polypodii ana 3 viii.
 Scammonæ costæ in Citonio 3 iii.
 Charyophyllorum 3 ii.
 Salis Indi aut gemmei 3 i. s.
 Cum succo Endiuæ conficiatur massa.

¶ Melancholiam, & bilem vltam multiplicem vtranq; clementer vacuant, ob id morbis inde natis conferunt.

Pilulæ de Mezereo, descriptione Mesuæ.

R. Foliorum Mezerei præparatorum 3 v.
 Myrobalanorum Citrinarum 3 iii.
 Myrobalanorum Chebulorum 3 iii.
 Confice cum Thereniabin & Tamarindis
 in aqua Endiuæ dissolutis ana q. s.

THERENIABIN siue Tereniabin, est Manna orientalis, quæ Græcis vocatur Drosomeli & Aeromeli,

¶ Serosum excrementum valenter purgât, seu aquas, ob id hydropem iuuant.

Pilulæ

*Pilulæ Lucis maiores, descriptione Me
sue.*

R. Rosarum

Violarum

Abſinthii

Colocynthidæ

Turbit

Cubebæ

Calami aromatici

Nucis Muscatæ

Spicæ nardi Indicæ

Epithymi

Carpobalsami

} aut eorum succeda

Xylobalsami

} neorum.

Seselios

Seminis Rutæ

Schœnanthi

Mastiches

Asari

Charyophyllorum

Cinnamomi

Anisi

Fœniculi

Apii

Cassie lignæ, videlicet veræ

Croci

Macis

ana 3 ii.

Myrobalanorum Citrinarum

Myrobalanorum Chebulorum

Myrobalanorum Indarum

Myrobalanorum Belliricorum

Myrobalanorum Emblicorum

I 2

Raued

Raueseni. i. Rheubarbari ana 3 iiii.
 Agarici
 Senæ ana 3 v.
 Eupragiæ 3 vi.
 Aloes succotrinæ ad pondus omnium, id
 est 3 xi. & 3 ii.
 Succu Fœniculi quantum sufficit.
 Fiat massa.

¶ Excrementa capitis pituitosa educunt,
 visumque roborant.

*Pilule Lucis minores, descriptione Me-
 sue.*

R. Xylobalsami } aut eorum succedaneo
 Carpobalsami } rum ana 3 i,
 Chelidoniæ, videlicet maioris radicum 3 v.
 Rosarum
 Violarum
 Absinthii
 Eupragiæ ana 3 iiii.
 Senæ
 Epithymi
 Myrobalanorum Citrinarum
 Myrobalanorum Chebulorum
 Myrobalanorum Indarum
 Myrobalanorum Belliricorum
 Myrobalanorum Emblicorum
 Agarici
 Colocynthidæ
 Schœnanthi
 Lycii
 Lapidis Lazuli loti ana 3 ii. s.
 Aloes

Pilule

183

Aloes optimæ ad pondus omnium
Succi Fœniculi aut Chelidonæ quantū suf-
ficit. Fiat massa.

¶ Idem quod priora possunt, atram tā-
men bilem magis vacuant.

Pilulæ Mastichinæ.

R. Mastiches 3 ii.

Aloes 3 v.

Agarici 3 i. s.

Infundatur Agaricus in aceto & oxymel
le simplici per diem & noctem, & rursus
exiccetur, deinde formetur massa cum suc-
co Artemisæ.

Pilulæ Mastichinæ Petri de Ebano, sive Conciliatoris.

R. Mastiches 3 iii.

Agarici optimi 3 iii.

Aloes electæ 3 x.

Confice cum syrupo de Stœchade.

¶ Præseruant stomachum ab omni ægri-
tudine, leniter purgant, & maximè confor-
tant, & non permittunt humores corrup-
pi, & qui eis vtuntur, præseruantur à dolo-
ribus stomachi, capitis, ventris, & matri-
cis: conferunt tristibus & melancholicis, &
vitia matricis corrigunt.

I 3 Pilulæ

Pilulæ de Aloe & Mastiche, descriptione Nicolai.

R. Aloes $\bar{3}$ j.
 Mastiches $\bar{3}$ s.
 Charyophyllorum
 Rosarum rubearum ana 3 j.
 Croci
 Diagridii ana Θ ii.
 Conformeretur massa cum succo Fœniculi
 aut Absinthii.

¶ Respiciunt virtutem naturalem: purgant incolumiter stomachum à phlegmate, & à cholera.

Pilulæ de Aloe lota.

R. Aloes lotæ cum succo rosarum rubearum $\bar{3}$ i.
 Agarici trochiscati 3 iii.
 Mastiches 3 ii.
 Specierum Diamoschi dulcis 3 s.
 Cû vino Maluatico cogantur in massam.

¶ Ventriculum, cerebrum, viscera reliqua, oculos, vterum putribus humoribus purgant, & roborant.

Pilulæ de Rhabarbaro, descriptione Mesuæ.

R. Raues Seni. i. Rheubarbari 3 iiij.
 Succo

Pilulæ

185

Succi Glycyrrhizæ
 Succi Absinthii
 Mastiches ana 3 i.
 Myrobalanorum Citrinarum 3 iij. s.
 Seminis Apii
 Seminis sceniculi ana 3 iij. s.
 Trochiscorum diarhodon 3 iij. s.
 Hieræ picræ simplicis 3 x.
 Aquæ sceniculi quantum sufficit.
 Fiat massa.

¶ In febribus diuturnis, iecinoris obstructionibus, & aquæ inter cutem initis conferunt.

Pilulæ pestilentiales Ruffi, quæ alias de tribus uocantur.

R. Aloes electæ 3 ii.
 Myrrhæ optimæ
 Croci synceri ana 3 i.
 Confice cum vino aromatico.

¶ Mirificè aduersus pestiferæ luis contagia populatim grassantia pollent. Humores etiâ ventriculo immerfos educunt.

Pilulæ de Sarcocolla, descriptione Me sue.

R. Sarcocollæ 3 iij.
 Turbith 3 iij.
 Colocynthidæ
 Zingiberis ana 3 i. s.
 I 4 Salis

Salis gemmei 3 i.

Aquæ Rosarum quantum sufficit.

Fiat massa

Pituitam vacuant, ob id pituitosis affectibus commodant.

Pilulæ sine quibus esse nolo, descriptione Nicolai.

R. Aloes optimæ lotæ 3 xliiii.

Myrobalanorum Citrinarum

Myrobalanorum Chebulorum

Myrobalanorum Nigrarum, id est, Indarū

Myrobalanorum Bellericorum

Myrobalanorum Emblicorum

Rheubarbari

Mastiches

Absinthii

Rosarum

Violarum

Senæ

Agarici

Cuscutæ ana 3 i.

Scammoneæ præparatæ 3 vi. s.

Dissoluatur scammonia in succo Fœniculi sufficienti, & cum hac dissoluta Scammonea formetur massa.

¶ Mirabiliter purgant choleram, phlegma, & melancholiam: valent propriè ad cataractas & obscuritates oculorum, visum custodientes: & aurium dolorem sanant, & ilioſis conferunt.

Pilulæ

Pilulæ Stomachicæ AlKindi.

R. Myrobalanorum Citrinarum
 Myrobalanorum Nigrarum
 Myrobalanorum Chebulorum ana 3 iii.
 Rosarum
 Mastiches ana 3 ii,
 Cardamomi
 Ligni aloes
 Sandali citrini
 Cubebæ
 Charyophyllorum
 Schœnanthi
 Nucis muschatæ ana 3 ii.
 Raues Seni. i. Rheubarbari 3 s.
 Turbith 3 vii.
 Aloes ad pondus omnium. Fiat massa.

¶ Cerebrum, & ventriculum corruptis humoribus purgant, ventriculum roborant, coctionem iuuant, appetentiam excitant.

Pilulæ Stomachicæ, descriptione Mesuæ.

R. Myrobalanorum Citrinarum
 Aloes
 Turbethi ana 3 x.
 Rosarum
 Spicæ Indicæ
 Mastiches ana 3 ii. s.
 Anisi 3 i. s.
 I s Salis

Salis Indi aut salis gemmei

Croci ana 3 i.

Formetur massa cum succo Absinthii.

¶ Biliosos & pituitosos vacuant humores, eos potissimum qui caput & ventriculum obsident.

Pilulæ Imperiales magistrales.

R. Cinnamomi

Amomi, eius loco sumatur acorus verus

Anisi

Mastiches

Cardamomi minoris

Zingiberis

Zeduaræ

Maceris

Nucis Muschatæ

Charyophyllorum

Croci

Cubebæ

Ligni aloes

Turbethi

Tereniabin, id est, Mannæ

Agarici

Foliorum Senæ

Myrobalanorum Citrinorum

Myrobalanorum Chebulorum

Myrobalanorum Indorum

Myrobalanorum Belliricorum

Myrobalanorum Emblicorum

Rhapontici veri, id est, Rheubarbari ad pondus omnium.

Aloes

Aloes quantum totum æquat.

Conficiantur cū Sirupo rosato aut violato.

¶ Modicū soluunt & plurimum confor-
tant stomachum, & omnia intestina frigida:
muniunt virtutes naturales, remouent frigi-
ditatem, clarificant sanguinem & spiritum.

*Pilulæ de opopanaco, descriptione Me-
sue.*

R. Opopanacis
Hermodactylorum
Sagapeni
Bdellii mollis
Ammoniaci
Colocynthis ana 3 v.
Crocī
Castorei
Myrrhæ rubæ
Zingiberis
Piperis, id est, nigri
Macropiperis
Cassia lignæ
Myrobalanorum Citrinorum
Myrobalanorum Indorum
Myrobalanorum Belliricorum
Myrobalanorum Emblicorum ana 3 i.
Scammonæ 3 ii.
Turbethi 3 iii.
Aloes 3 xii.
Cogantur in massam cum infusione gummi
in aqua caulium.

¶ Valent ad paralyfim, spasmum cyni-
cum, gonagram, podagram, & aliorum ar-
ticu-

ticulorum dolores, morbosq; partium nervosarum frigidos.

Pilulæ de quinque generibus Myrobalanorum, descriptione Nicolai.

R. Quinque generum Myrobalanorum

Agarici

Diagridii

Colocynthidos

Senæ

ana 3 s.

Epithymi

Turbèthi

Anisi

Marathri

Mastiches

Lapidis Lazuli præparati ana 3 ii. gr. v.

Aloes

3 i.

Formetur massa cum succo Absinthii.

¶ Educunt humorem cholicum, phlegmaticum, & melancholicum, & clarificant sanguinem.

Pilulæ de octo rebus siue Optomere, descriptione Nicolai.

R. Aloes

Diagridii

ana 3 ii.

Interioris Colocynthidos

Epithymi

Agarici

Mastiches

Dauci Cretici

Myrobalanorum

Myrobalanorum Chebulorum

Absinthi ana 3 i.

Cum succo Solani conformetur massa.

¶ Purgant humores crassos à capite, visum clarificant, & cataractas oculorum prohibent.

Pilulæ de Serapino, descriptione Mesuæ.

R. Sagapeni

Am moniaci

Opopanacis

Bdelli ana 3 ii. s.

Seminis Apii

Ammios

Harmelæ, id est, seminis rutæ sylvestris

Anisi ana 3 i.

Acori, id est, calami aromatici

Cassiae lignæ veræ

Calaminthæ

Spicæ Indæ

Centaurii, id est, minoris

Polii

Costi

Salis gemmei ana 3 s.

Aloes 3 vi.

Colocynthidos 3 v.

Cogantur in massam cum aqua aut succo
Matricariæ

NOTATO, ingreditur secundum Mesuæ Sataragum Indum, sed Clementinus Clementinus loco eius posuit Cassiam ligneam.

¶ Pollent

¶ Pollent ad ischiadem, podagram, & reliquarum iuncturarum dolorem, ac etiã vteri, mensesque promouent.

Pilulæ de Bdellio maiores, Mesuæ.

R. Bdellii 3 xii.
 Ammios 3 iii.
 Myrobalanorum Chebulorum
 Myrobalanorum Indorum
 Myrobalanorum Bellitricorum
 Myrobalanorum Emblicorum
 Auellanarum adustarum
 Succini aut Karabæ ana 3 ii. s.
 Maceretur Bdellium in succo foliorum Porri, & conficiatur massa.
 ¶ Valent ad fluxum hæmorrhoidum & vlerum in eis, & ad menses immodicos.

Pilulæ de Cynoglossa, descriptione Nicolai.

R. Cynoglossæ
 Opii
 Seminis hyoscyami ana iiii.
 Myrrhæ Troglodyticæ 3 vi.
 Thuris masculi 3 v.
 Charyophyllorum 3 ii.
 Cinnamomi
 Styracis rubei ana 3 ii.
 Cum aqua rosarum conficiatur massa.
 ¶ Magnam vim obtinent in tenuibus sistēdis desillationibus, ac doloribus mitigādis.
 Pilulæ

Pilulæ Bechiæ.

R. Pineorum nucleorum
Amygdalarum amararum ana $\bar{3}$ i. s.
Glycyrrhizæ 3 vi.
Succi glycyrrhizæ $\bar{3}$ iiii.
Cum aqua rosarum conformetur massa.

¶ Aduersus tussim veterem pollent, &
gutturis ac faucium asperitatem.

Pilulæ Alephanginæ, descriptione Valerij Cordi.

R. Myrobalanorum Chebulorum
Myrobalanorum Citrinorum
Myrobalanorum Indarum
Myrobalanorum Belliricorum
Myrobalanorum Emblicorum ana $\bar{3}$ i.
Acori veri
Galangæ
Zedoariæ
Doronici Romani
Radicularum Afari
Dictamni nostratis radicem
Absinthii
Rosarum ana 3 iiii.

Contundantur omnia grosso modo, &
Myrobalani per se macerentur prius in aquæ
clarissimæ fontanæ lib. iiii. per horas
xxiiii. deinde coquantur, donec ferè ter-
tia pars aquæ sit in vaporem resoluta, post-
ea coque etiam radices & aromata lēto igne

in

in duplici vase, cū aquæ clarissimæ lib. vi.
& affunde his antea coctas Myrobalanos cū
suo iusculo, vltimò rosas addiicendo co-
quantur vsque ad tertias, colentur postea
fortiter exprimendo. hinc in colatura dis-
solue

Aloes optimæ & lotæ, & rursus exiccatae
lib. iii.

Ponantur omnia in vitrea patina ad solem
aut in stufam, & agitentur sæpissimè, vt cō-
crescens in margine Aloe, liquido commi-
sceatur: cū verò mellis spissitudinem fue-
rint consecuta, tunc adde sequentium spe-
cierum puluerem minutissimè tritum.

R. Galangæ

Cyperī

Zedoariæ

Doronici

Ligni aloes

Cinnamomi

Schœnanthi

Nardi Celticæ radicularum

Nucis Muscatæ

Macis

Cubebæ

Cardamomi

Charyophyllorum ana ʒ iii.

Mastiches

Succini, id est, Karabæ ana ʒ vi.

Myrrhæ

Croci ana ʒ iii.

Agitentur optimè cum Aloe species, &
fat massa cum diligentia.

MYROBALANÆ

Sirupi

195

MYROBALANI omnes hoc pondus debent habere exemptis nucleis siue lignis.

PILVLAE istae Alephanginae sunt efficaces, imò efficaciores prioribus: relinquimus tamen unicuique liberum arbitrium, alterutram vel utraque componendi.

HOC loco non debet poni Diſtamnus Creticus, sed radices Diptamini, quae vulgo in usu sunt, & propriè cortex radicum eius. Germanicè vocatur Aſchvvurtz, propterea quòd folia eius sunt similia Fraxino arbori, & haec est vera Fraxinella.

S I R V P I.

Sirupus de duabus radicibus.

R. Radicum Petroselini
 Radicum Fœniculi ana $\bar{3}$ iiii.
 Aquæ quantum sufficit.
 Sacchari clarificati lib. ii.
 Coquantur secundum artem.

Sirupus de quinque radicibus.

R. Radicum Apii
 Radicum Fœniculi
 Radicum Petroselini
 Radicum Rusci
 Radicum Asparagi ana $\bar{3}$ iiii.
 Aquæ quantum sufficit.
 Sacchari lib. iiii.
 Coquantur secundum artem.
 ¶ Confert.

¶ Confert febribus pituitosis & biliosis, & iis incipientibus.

Sirupus Acetosus simplex, descriptione Mesuæ.

R. Aceti vini lib. iii.
Sacchari clarificati in aqua lib. v.
Coquantur secundum artem.

¶ Est communis ad omnem materiam, digerit choleram, phlegma, & melancholiam, rationeque aceti attenuat crassos humores, incidit viscosos, duros mollit, ineptos euellit, vbique penetrat, oppilationes aperit, prouocat urinam, putredini resistit, & corrigit malitiam humorum, idcirco in febribus pestiferis iuuat: sed ratione remissa frigiditatis, tenues & subtiles humorum partes inspissat, adæquat, calorem refrigerat, viscera lenit, & sitim sedat.

Sirupus Acetosus compositus, descriptione Mesuæ.

R. Radicum Fœniculi
Radicum Apii
Radicum Endiuixæ ana $\bar{3}$ iii.
Seminis Anisi
Seminis Fœniculi
Seminis Apii ana $\bar{3}$ i.
Seminis Endiuixæ 3 iiii.
Aquæ quantum sufficit.
Sacchari optimi lib. iii.
Acceti

Aceti acerrimi lib. ii.
Coquantur secundum artem

¶ Bilem crassam & auulso difficilem, ac pituitam incidit, terget: obstructa hepatis, lienis, renum, aperit.

Sirupus acetositatis Citri, descriptione Mesuæ.

R. Acetositatis mali Citri per pannum destillatæ lib. vi.
Sacchari albissimi lib. iii.
Coquantur secundum artem.

RARO habent pharma copole Sirupum acetositatis Citri verum: nam plerunque venditur pro eo Sirupus Citreorum conditorum. Porro cum quis bene conficere voluerit, oportet vt per filtrum aut pannum destilletur acetositas Citriorum, sine vlla vi aut expressione, alioquin coagulatur, cum refrixerit, Sirupus.

¶ Aestum ac feruorem bilis flauæ, febriumque ardentium & pestilentialium mitigat, situm quoque vehementem restinguit.

Sirupus Acetositatis Limonum.

R. Acetositatis limonum maturorum per filtrum destillatæ lib. vi.
Sacchari albissimi lib. iii.
Coquantur secundum artem.

¶ Vehementius infrigidat & penetrat, quam

quàm Sirupus acetositis Citri : & valet
contra putrefactionem, contra vermes, ve-
hementiam caloris febrilis, & alios crudos
humores.

Sirupus Aranciorum acetosorum.

R. Succi Aranciorum acetosorum per pan-
num aut filterum distillati lib. vi.
Sacchari albissimi lib. iii.
Coquantur secundum artem.
A D hunc modum potest etiam fieri ex succo A-
ranciorum dulcium.

*Sirupus de Agresta, descriptione Me-
sue.*

R. Agrestæ lib. v.
Sacchari clarificati lib. iii. s.
Coquantur secundum artem.

AGRESTA est succus vuarum immaturarum,
qui Gracè vocatur Omphacium, & inspissatus ser-
uatur : hoc autem loco recipienda est Agresta, non
dum ad spissitudinem decocta.

Agresta exprimi debet ex generosissimis vuis, a-
pud nos paulò ante maturitatem.

¶ In magnis æstibus ad sitim restinguen-
dum mirificè confert, vomitum & alui pro-
fluuium biliosum sistit, febribus biliosis suc-
currit, grauidarum vomitum etiam repri-
mit, ac ventriculum earundem firmat vene-
nisque aduersatur.

Sirupus

*Sirupus de Pomis, descriptione Mes-
sue.*

R. Succi pomorum dulcium
Succi pomorum acetosorum ana lib. v.
Coquantur, despumentur & colentur, de-
inde adde
Sacchari lib. iii.
Coquantur secundum artem.

*SVCCVS exprimendus est ex optimis pomis si-
ue malis, qualia sunt quæ vveynlinge siue vweyn-
seurleu vocantur, in acetosorum genere: ex dulci-
bus etiam sapidissima sunt eligenda.*

¶ Cor imbecillum roborat, ob id syn-
copen & cordis tremorem sanat.

*Sirupus Granatorum dulcium, descri-
ptione Mesue.*

R. Succi Granatorum dulcium lib. v.
Sacchari albisimi lib. iii.
Coquantur secundum artem.

* *MALE hodie faciunt Sirupum granatorum,
indifferenter cum dulcibus acetosa granata misce-
ntes: oportet enim vtrunque Sirupum tam acetoso-
rum quàm dulcium granatorum seorsim conficere,
nam diuersis morbis, morborumq; accidentibus me-
dentur.*

¶ Sitim, tussim & pleuritidem iuuat.

Sirupu

*Sirupus Granatorum acetosorum, de-
scriptione Mesuæ.*

R. Succi granatorum acetosorum lib. v.
Sacchari albusimi lib. iii.
Coquantur secundum artem.

¶ Febres biliosas, & quæ ex pituitosis
flammam multam inuehant, iuuat.

*Sirupus Dinarij siue de Bizantijs sim-
plex, descriptione Mesuæ.*

R. Succi Eniduiæ
Succi Apij ana lib. ii.
Succi Lupuli
Succi Buglossæ domesticæ aut syluestris
ana lib. i.
Succi depurentur & despumentur dum ma-
neant lib. iiii.
Sacchari optimi lib. ii. s.
Coquantur con facilitate, donec fiat Siru-
pus.

¶ QUIDAM differentiam faciunt inter Sirupum
Dinarij & de Bizantijs, alterum simplicem, al-
terum compositum vocantes. Sed nos simplicis &
compositi nomine distinguimus, utrumque Dinarij
siue de Bizantijs appellantes.

¶ Humores crassos & lentos incidit at-
que extenuat, obstructions aufer, mor-
boque regio succurrit.

Sirupus

Sirupi

201

*Sirupus de Bizantijs compositus, de
scriptione Mesue.*

R. Succı Endiuia veræ

Succı Apı ana lib. ii.

Succı Lupuli

Succı Buglossæ domesticæ aut syluestris

ana lib. i.

In Succis decoquantur

Florum rosarum 5 ii.

Glycyrrhizæ 3 iiii.

Seminis Anisi

Seminis Fœniculi

Seminis Apı ana 3 iiii.

Spice nardi Indicæ 3 ii.

Colaturæ adde

Aceti lib. ii.

Sacchari albissimi lib. iiii.

Coquantur secundum artem diligenter.

Sirupus Bizantinus compositus, est effi-
caciior simplici.

*Sirupus de Artemisia, descriptione
Matthæi de Gradibus.*

R. Artemisizæ M ii.

Pulegi

Calaminthæ

Origani

Melissæ

Dictamni Cretici

Perficariæ

Sabinæ, id est, Sauinæ

Amaraci,

Amaraci, hic accipe Maioranæ
 Chamædryos
 Perforatæ, id est, Hypericonis
 Chamæpityos, id est, Iua aromatica
 Comarum Matricariæ
 Centaureæ minoris
 Rutæ
 Betonicæ
 Buglossæ
 Radicum Fœniculi
 Radicum Apii
 Radicum Petroselini
 Radicum Asparagi
 Radicum Brusci
 Radicum Saxifragiæ, eius loco accipiantur
 radices Pimpinellæ
 Radicum Enulæ Campanæ
 Radicum Cyperi
 Radicum Ruberæ tinctorum
 Radicum Ireos
 Radicum Pæoniæ ana M j.
 Baccarum Iuniperi
 Seminis Ligustici
 Seminis Petroselini
 Seminis Apij
 Seminis Anisi
 Seminis Nigellæ
 Carpobalsami (aut succedanei eius)
 Costi
 Radicum Asari
 Radicum Pyrethri
 Cassiæ lignæ aromaticæ
 Cardamomi
 Calami aromatici

Phu

Sirupi

203

Phu, id est, radice eius

ana 3 s.

Aquæ quantum sufficit.

Sacchari

lib. iiii.

Coquantur omnia magna diligentia, secundum artem, ne plus quàm necesse sit aromata bulliant.

PRO vulgari & falso Dictamno hic debet poni Dictamnus Creticus, qui singulariter facit ad ea ad quæ Sirupus hic est compositus.

SAXIFRAGIAM Itali vocant eam herbam quam nos Pimpinellam appellamus, & huius radix hic debet accipi.

¶ Medetur passionibus matricis, & retinet eam in proprio loco, resoluit frigiditatem, ventositatem, & dolores, corroborat nervos, aperit poros, sanguinem corrigit, menstruis imperat, & prouocat.

Sirupus de Absinthio maior, descriptione Mesuæ.

R. Absinthii Romani

lib. s.

Rosarum rubearum

3 ii.

Spicæ Indicæ

3 iii.

Vini clari veteris & optimi

Succi Cytoniorum

ana lib. ii. s.

Macerentur in vase marmoreo aut fictili defuso per noctem vnâ, deinde decoquantur.

Colaturæ adde

Sacchari

lib. ii.

Confice secundum artem.

κ

Absinthium

Absinthium Romanum, id est, Absinthium Ponticum gustu adstringens, & aromaticum: vulgare autem dicitur rusticum Absinthium.

¶ Ventriculum roborat & iecur, aliaq; instrumenta nutritionis, appetentiamq; excitat: contra regium morbum prodest, flatus discutit, humoresque per urinam pellit.

Sirupus infusionis Rosarum.

R. Infusionis rosarum lib. v.
Sacchari clarificati lib. iiii.
Coquantur cum facilitate.

¶ Est conueniens ad extinguendam sitim in febribus acutis, & ad remittendum excessum caliditatis in eis, confortans stomachum relaxatum, & hepar supercalefactum, & cor, resistens putredini, conueniens tempore peilentiae & resistens venenositati.

Sirupus infusionis Violarum.

R. Infusionis violarum lib. v.
Sacchari clarificati lib. iiii.
Coquantur cum facilitate.

¶ Febribus acutis, iecinoris & cordis caloribus, asperitati gutturis, morbo laterali, tussi que aridae succurrit, sitim restringit, aluumque emollit.

Infusio

Infusio Rosarum Mesuæ.

R. Foliorum Rosarum lib. i. ponantur in vrceo angustiori, & infunde illis aquæ calidæ lib. iii. aut quantum sufficit vt madeât. Maceretur per horas viii. aut xii. obstructo fictilis orificio: deinde exprime leuiter, & excola infusionem, abiectis rosis, & iterum inde recentes rosas, & infusionem excolatam calefac, & infunde rosas, ac obstructo orificio vrcei in calido loco dimitte per horas viii. vel xii. Postea rursum excola, & colaturam infunde aliis recentibus rosis, & tertio dimitte, & si efficaciorē facere volueris, etiam quarto recentes rosas in eodem diluto recalefacto macera, ac postremo addito saccharo, Sirupum facito.

Porro quidam tundunt Rosas, quidam verò integras ponunt, & tusa quidem celerius vim suam & calorem in aquam deponunt, ac minorem locum occupant. At viola cum tunduntur, aliquam herbaceam & tædiosam acrimoniam acquirunt, hoc est Syekrigen einen grusenden geschmack im mund quare consulantur hac de re Doctores medici.

Hæc infusio dicitur alio nomine Muchar, & Mucharum, siue ex Violis siue Rosis fiat.

MESVE tantum bis iubet Rosas infundi, melius verò est, vt sapius recentes abiectis substituantur.

Infusio Violarum.

Infusio Violarum eodē modo fit, quo Rosarum infusio.

Sirupus de succo Fumi terræ maior, descriptione Mesuæ.

R. Myrobalanorum Citrinorum
 Myrobalanorum Chebulorum ana 3 xx.
 Florum Borraginis
 Florum Buglossæ
 Florum Violarum
 Absinthii
 Cuscutæ ana 3̄ i.
 Glycyrrhizæ
 Rosarum ana 3̄ iiii.
 Epithymi
 Polypodii ana 3̄ vii.
 Prunorum numero C.
 Passularum enucleatarum lib. s.
 Tamarindorum
 Pulpæ Cassiæ fistulæ ana 3̄ ii.
 Aquæ lib. x.
 Coquantur secundum artem ad tertias, deinde cola, & colaturæ adde
 Succum Fumi terræ depuratum
 Sacchari albissimi ana lib. iij.
 Coquantur lento igne ad iustam consistentiam, & reponere.

Meum exemplar manu scriptum habet Prunorum lib. s. quemadmodum passulæ.

¶ Sirupus

¶ Sirupus Fumariæ maior, ventriculum & hepar roborat, obstructions aperit, cutis morbos, præcipuè ab humore falso, vel vltro natos, vt pforam, lepram, impetiginem, serpiginem curat.

Sirupus de Meniha maior, descriptione Mesuæ.

R. Succi Cytoniorum muzorum
Succi Cytoniorum dulcium
Succi Granatorum acetosorum
Succi Granatorum dulcium
Succi Granatorum muzorum ana lib. i. s.
In succis macerentur per horas xxiii. sequentia.

R. Menthæ siccæ lib. i. s.
Rosarum rubearum ʒ ii.

Coquatur deinde cum facilitate vsque ad medietatis consumptionem, colentur. & colaturæ adde

Mellis, vel
Sacchari lib. ii.

Coquantur ad perfectionem, & cum reponis, aromatiza cum Gallia moschata trita vera, & in syndone ligata, atque ex orificio vasis suspensa.

MVZORVM, id est, in vini saporem acescentium, nam muzus sapor de dulcedine & acetositate aliquid habet.

NOTANDVM est, si quis cum melle velit hunc Syrupum conficere, vt accipiat mel odoratum aromaticum, quale è Dantisco aduehitur, vel tale a-

K 3 lind

liud, vt est quod vocant, virgineum mel, & Sax^o
nes kruthonig, quasi aromaticum mel, & non il-
lud vulgare flatuosum.

¶ Ventriculum frigidum roborat, ob id
nauseam, vomitum, singultum, fluorem
alui sedat.

*Sirupus de Mentha minor, descriptione
Mefuæ.*

R. Succi Menthæ depurati lib. i.
Succi Granatorum dulcium
Succi Granatorum acetosorum, ad medie-
tatem coctorum
Sacchari, vel Mellis ana lib. i.
Coquantur sensim secundum artem.

IN hoc quoque Sirupo notandum est, quod in
proximo Sirupo de Mētha maiore diximus de melle.

¶ Eandem ferè cum superiore faculta-
tem habet.

*Sirupus de Calamintha, descriptione
Mefuæ.*

R. Calaminthæ domesticæ
Calaminthæ sylvestris ana ʒ ii.
Ligustici, id est, Seminis
Dauci (videlicet seminis eius)
Schœnanthi ana ʒ v.
Passularum enucleatarum lib. s.
Mellis lib. ii.

Aquæ

Aquæ quantum sufficit.

Coquantur secundum artem.

MEL cum adlatur huic Sirupo, tunc oportet esse optimum & aromaticum mel, ut antè etiam dixi. idq; in omnibus Sirupis & Oxymellis observandum est.

POTEST etiam cum Saccharo fieri hic Sirupus, quia pauci optimum & aromaticum mel emere & expetere consueverunt.

DOMESTICA Calamintha est quæ in agris & cultis locis nascitur, & vulgo vocatur Kornmintze.

SYLVESTRIS autem Calamintha est quæ in incultis locis & montibus provenit, & appellatur Calamintha montana.

¶ Lienosis plurimum confert, quibus durus est lien & penè irresolubilis, & his qui frigida viscera habent, & asthmate laborant, præsertim in senibus, & in habentibus antiquas tusses: si quis enim vel pectus, vel ventriculus, vel intestina crassa, tenaci & irresolubili materia plena habeat, hoc Sirupo sanatur.

Sirupus de succo Endiviæ simplex.

R. Succo Endiviæ depurati lb. viii.

Sacchari Tabarzeth lb. v. s.

Coquantur secundum artem.

ENDIVIA vera, est herba sativa, caulibus folijsq; Cichoreæ similibus, maioribus tamen pin-

K 4 guiori-

guioribusq; , flores etiam similes sunt Cichoreæ. al-
latum est semen eius ex Italia , & iam multis in lo-
cis apud nos seritur .

¶ Valet principaliter ad omnes supercale-
factiones hepatis & aliorum membrorum
nutritiuorum, & in morbo laterali maximè
conuenit.

Sirupus de Endiuia compositus .

R. Endiuix recentis

Borraginis

Scariolæ

Hepaticæ

Buglossæ

Melissæ

Lactucæ

Eupatorii

ana M i.

Seminum frigidorum maiorum ana ʒ i.

Sandali albi

Sandali rubei

ana ʒ i.

Florum cordialium

ʒ iiii.

Coquantur secundum artem , in sufficien-
ti quantitate aquæ : deinde cola , & colatu-
ræ adde

Succi Endiuix depurati lib. i.

Vini Granatorum ʒ iii.

Sacchari albi lib. iiii.

Fiat Sirupus secundum artem .

¶ Valet præcipuè ad supercalefactiones he-
patis , cordis , & aliorum membrorum nu-
tritiuorum , & generaliter confert cuilibet
complexioni

Sirupi

211

complexioni calidæ: & est aperitiuus oppi-
lationum, & confortatiuus mēbrorum de-
bilitatorum à mala complexione calida: est
etiam digestiuus materiarum cholericarum
acutarum.

Sirupus de Cichorio cum Rhabarbaro *Nicolai Florentini.*

R. Endiuix domesticæ
Endiuix syluestris
Cichorii
Taraxacon ana M ii.
Cicerbitæ
Hepaticæ
Scariolæ
Lactucæ
Fumiterræ
Lupulorum ana M i.
Hordei non excorticati ʒ ii.
Vesicariæ, id est, alkeKengi
Glycyrrhizæ
Capillorum Veneris
Ceterach, id est, Asplenii
Polytrichi
Adiantos ana ʒ vi.
Radicum Fœniculi
Radicum Apii
Radicum Asparagi ana ʒ ii.
Coquantur in aqua sufficienti, & perco-
lentur, deinde cum Saccharo albo claresa-
cto fiat Sirupus, pro cuius vnaquaque libra
inter coquendum adiiciantur
Rhabarbari optimi ʒ iii.
K ʒ Spicæ

Spicæ nardi ℥ iiii.

Colligato in linteolo raro quod sæpe exprimitur, dum Sirupus consistentiam iustā nanciscatur.

¶ Valet contra omnem materiam venenosam in alterando & mundificando eam, & propriè in anthracè, & similibus, valet & in febre pestilentiali. Confortat cor & nutritiua, mundificat materias per vrinam & secessum, & facit appetere cibum, ac inducit somnum.

Oxysacchara, simplex, descriptione Nicolai.

R. Sacchari albi lib. i.
Succi malorum granatorum acetosorum
℥ viii.
Aceti. ℥ iiii.
Coquantur cum facilitate ad ignem in vase stanneo dum Sirupi crassamentum adsciscat.

¶ Digerit materias cholericas phlegmatici mistas, quæ grauant stomachum & præcordia, & faciunt tertianas duplas inordinatas, quas vocant erraticas, & similes quartanis

Oxysacchara composita, descriptione Nicolai Præpositi.

R. Capillorum Veneris

Lingux

Sirupi

213

Linguae ceruinæ, id est, Phyllitidis

Scolopendriæ, id est, Aspleni

Polytrichi

Hepaticæ

Violarum

Radicum fœniculi

Radicum Rusci

Radicum Asparagi

Radicum Graminis ana lib. i.

Hoc modo confice. In succo malorum granatorum, herbas, radices triduum macerato, quarto die parum bullire finito, cū forti expressione percolato, postremò addito Saccharo quod satis fuerit, ad iustā crassitiem concoquito.

¶ Concalefacta corpora potum iuuat: longis febribus, quas sanguis aut bilis creauit, & calori iecinoris auxilio est, & lienis obstructions tollit.

Sirupus de Iuiubis, descriptione Mæ sue.

R. Iuiubarum numero lx.

Violarum

Seminis Maluæ ana 3 v.

Capilli Veneris

Hordei mundati

Glycyrrhizæ ana 3 i.

Seminis Cytoniorum

Seminis papaueris albi

Seminis Melonum

Seminis Lactucæ

K 6 Traga

Tragacanthæ ana ʒ iij.
 Aquæ fontis lib. iij. aut q. f.
 Sacchari lib. ij.
 Coquantur secundum artem.

¶ Sirupus iste, confert raucitati, tussi, & pleuritidi.

sirupus Violarum descriptione Mesue.

R. Violarum ʒ ij.
 Seminis Cytoniorum
 Seminis Maluæ ana ʒ j.
 Iuiubarum
 Sebesten ana numéro xx.
 Aquæ cucurbitæ quantum sufficit.
 Sacchari lib. j. s.
 Coquantur secundum artem.

CUCURBITA debet destillari cum adhuc est tenera, antequam indurescere incipiat.

¶ Prodest pleuritidi & tussi à causa calida.

Sirupus de succo Violarum.

R. Violarum recentium iamiam lectarum quantitatem satis magnam & decerpe ab ijs purpurea foliola, & abice virides eorū cauliculos, quoniam herbaceam habent acrimoniam, & floridum colorem hebetant. Contunde deinde decerpta violarū folia in mortario

tario marmoreo & exprime. mox

R. Expressi succi lib. ij.

Sacchari lib. iiij.

SACCHARVM prius clarificetur, & ad iustam consistentiam coquatur; amoto deinde ab igne Saccharo tepesieri finito, & succum infundito, & rursum lento igne ad spissitudinem coquito, & emicantem in coquendo spumam continuo auferto.

QVIDAM spumam non auferunt, ne color pereat. Sed citò corrumpitur cum spuma repositus.

HIC violarum Sirupus in Misnia fit, præsertim Lipsia, ubi eum vocant Succum violarum.

¶ Bilis acrimoniam obtundit, ac ob lentorem thoracis vitiis est aptum.

Sirupus de Præssio, descriptione Mæ sue.

R. Præssii ʒ ii.

Glycyrrhizæ ʒ i.

Capilli Veneris

Hyssopi ana ʒ vi.

Calaminthæ

Anisi

Radicum Apii

Radicum fœniculi ana ʒ v.

Seminis Maluæ

Seminis fœnogræci

Radicis Ireos ana ʒ iii.

Seminis Lini

Seminis Cytoniorum ana ʒ ii.

Passularum enucleatarum ʒ ii.

Ficum

Ficum siccarum pinguium num. xvi.
 Penidiorum lib. ii.
 Mellis lib. ii.
 Aquæ quantum sufficit.
 Coquantur secundum artem.

MEL oportet esse aromaticum & optimum. potest tamen etiam cum Saccharo fieri.

¶ Vitiis thoracis & pulmonis diuturnis, & à frigido tenaciq̃ humore excitatis, atque eradicatu difficilibus succurrit: hinc est quòd senibus & asthmaticis plurimum conducatur.

Sirupus de Glycyrrhiza, descriptione Mesuæ.

R. Glycyrrhizæ rasæ $\bar{3}$ ii.
 Capilli Veneris $\bar{3}$ i.
 Hyssopi $\bar{3}$ s.
 Aquæ lib. iiii.
 Macerentur horis xxiiii. Deinde coquantur ad dimidias. Colaturæ adde
 Mellis optimi
 Penidiorum
 Sacchari ana $\bar{5}$ viii.
 Aquæ rosarum $\bar{3}$ vi.
 Fiat Sirupus secundum artem.

¶ Thoracem & pulmonem expurgat, ideoq̃ diuturnæ tussi & pleuritidi auxiliatur.

Sirupus

*Sirupus de Hyssopo, descriptione Mes-
sue.*

R. Hyssopi aridi
 Radicum Apii
 Radicum Fœniculi
 Radicum Petroselini
 Glycyrrhizæ ana 3 x.
 Hordei mundati 3 iiii.
 Seminis maluæ
 Seminis cytoniorum
 Tragacanthæ ana 3 iii.
 Capilli Veneris 3 vi.
 Iuiubarum
 Sebesten ana numero xxx.
 Passularum magnarum enucleatarum 3 i.
 3 iiii.
 Ficum siccarum
 Dactylorum pinguium ana num. x.
 Penidiorum alborum lib. ii.
 Confice secundum artem.

¶ Ad vitia thoracis & pulmonis efficax
 est, humoresque excreatu difficiles exte-
 nuat, & educit.

*Sirupus de Eupatorio, descriptione
 Messue.*

R. Radicum Fœniculi
 Radicum Apii
 Radicum Endiuizæ ana 3 ii.
 Glycyrrhizæ
 Schœnanthi

Schoenanthi
 Cuscutæ
 Absinthii
 Rosarum ana 3 vi.
 Capilli Veneris
 Bedeguaris
 Suchahæ
 Florum aut radicum Buglossæ
 Anisi
 Fœniculi
 Eupatorii ana 3 v.
 Raved Seni, id est, Rhabarbari orientalis
 Mastiches ana 3 iii.
 Spicæ nardi Indicæ
 Asari
 Folii, pro folio pone Spicam Romanam,
 ana 3 ii.
 Aquæ quantum sufficit, aut lib. viii.
 Succi Apii
 Succi Endiviæ ana lib. ii.
 Sacchari lib. iiii.
 Coquantur secundum artem.

PRO Bedegware & Suchaha quæ hodie non co-
 gnoscuntur, licet accipere Carduum Benedictum &
 Cardinam, id est, Cardopaciæ radicem.

Eupatorium quod Mesue semper intelligit, est
 Gratiola, ut antè etiam dictum fuit aliquoties.

¶ Frigidis iecinoris vitiis, ac eiusdem ob-
 structionibus, aquæ inter cutem, maloque
 corporis habitui succurrit: humores enim
 crallos extenuat, roburque iecinori adiicit.
 Vrinæ mouet, & hypochondriorum ten-
 sionem demolitur.

Sirupus

Sirupus de Stœchade simplex.

R. Florum Stœchadis 3 xxx.
Thymi
Calaminthæ
Origani ana 3 x.
Anisi 3 vii.
Passularum enucleatarum 3 iiii.
Aquæ quantum sufficit. Coquantur secundum artem. Colaturæ adde
Mellis optimi lib. iiii. s.
Condiatur cum
Cinnamomi
Calami aromatici
Zingiberis ana 3 i. s.
Ligentur in sindone & in Sirupo suspendantur.

*Sirupus de Stœchade compositus, de-
scriptione Mesuæ.*

R. Florum Stœchadis 3 xxx.
Thymi
Calaminthæ
Origani ana 3 x.
Anisi
Pyrethri ana 3 vii.
Piperis longi 3 iiii.
Zingiberis 3 ii.
Passularum enucleatarum 3 iiii.
Aquæ quantum sufficit,
Mellis optimi lib. v.
¶ Coquantur

Coquantur secundum artem lento igne.
Colaturæ adde mellis prædictas lib. v. &
cùm reponis, tum condias sequentibus spe-
ciebus in sindone rara & munda suspen-
sis.

R. Cinnamomi

Calami aromatici

Spicæ nardi Indicæ

Croci

Zingiberis

Piperis nigri

Piperis longi ana 3 i. s.

Contundantur grossio modo.

Ego in condiendo Sirupo de Stæchadis retroque,
pro CALAMO aromatico mallem imponere, Schæ-
nanthum aut Galangam, nam vero Calamo aro-
matico iam caremus.

¶ Iuvat omnes affectus frigidos cerebri &
neruorum, vt paralytim, epilepsiam, spasmum,
spasmus cynicum, tremorem, ac ven-
triculum firmat.

*Sirupus de Epithymo, descriptione Me-
sue.*

R. Epithymi 3 xx.

Myrobalanorum Citrinorum

Myrobalanorum Indarum ana 3 xv.

Cuscutæ

Fumiterræ ana 3 x.

Thymi

Buglossæ

Calaminthæ

Calaminthæ
 Emblicorum
 Belliricorum
 Glycyrrhizæ
 Polypodii
 Agarici
 Stœchidos ana 3 v.
 Rosarum
 Fœniculi
 Anisi ana 3 ii. s.
 Prunorum numero xx.
 Passularum enucleatarum 3 iiii.
 Tamarindorum 3 ii. s.
 Aquæ quantum sufficit.
 Sacchari lb. iii.
 Sapæ lb. ii.
 Coquantur secundum artem

SAPA est mustum optimum a lertias decoctum.

¶ Atram bilem, & alios humores vstos vacuat, ob id morbos ex his nascentes, elephantiam, cancrum, vlcera maligna, itulosa, pforam, lepram præcauet, curat ue.

Sirupus de Nymphaea, descriptione Frã

cisci de Pedemontium.

R. Florum Nymphææ 3 ii.
 Florum vngulæ Caballinæ aquaticæ
 Psyllii integri
 Acetosæ ana 3 i.
 Seminis Cucurbitæ

Seminis

Seminis Citrulli
 Seminis Cucumeris
 Seminis Melonis ana 3 iiii.
 Seminis Lactucæ
 Seminis Endiuie
 Seminis Scariolæ
 Seminis Portulacæ ana 3 ii.
 Radicum Fœniculi 3 i.
 Aquæ Hordei quantum sufficit.
 Sacchari lib. i.
 Aceti albi
 Succu Granatorum acetosorum ana 3 ii.
 Coquantur secundum artem, deinde aroma-
 tizentur cum
 Sandali Citrini
 Spicæ nardi Indicæ ana 3 i. s.

*D V A E sunt Nymphaea species, altera candi-
 dum, altera luteum florem habet, & utriusque flo-
 res hunc Sirupum ingrediuntur. Nam autor huius
 Sirupi eam speciem, quæ albos habet flores vocat
 Nenuphar, alteram verò quæ luteos fert flores, ap-
 pellat vngulam Caballinam aquaticam, à folio-
 rum figura, & florum colore,*

*SCARIOLA est species Endiuie, quam nos
 in Germania vocamus, Endiviam, vulgò Gensdi-
 stel, & habet spinulas in dorso foliorum,*

¶ Bilis flauæ feruorem extinguit, ideò-
 que mirificè in ardentibus aliisque acutis
 febribus auxiliatur, somnum quoque con-
 ciliat.

Sirupus

Sirupus de Papauere, descriptione Mesuae.

R. Capita papaueris albi recentia
Capita papaueris nigri recentia ana 3 lx.
Aquaë pluuiialis lib. iiii.
Coquantur vsque quò remaneant tantùm
aque lib. i. s. Colaturæ adde
Sacchari
Penidiarum ana 3̄ vi.
Fiat Sirupus secundum artem.

¶ Valet ad catarrhum & tussim, causam
insomniæ.

Sirupus de Papauere compositus, descriptione Mesuae.

R. Papaueris albi
Papaueris nigri ana 3 L.
Capillorum Veneris 3 xv.
Glycyrrhizæ 3 v.
Iuiubæ numero xxx.
Seminis Lactucæ 3 xl.
Seminis Maluæ
Seminis Cytoniorum ana 3 vi.
Coquantur in lib. iiii. aque vsque ad
duas, & cum
Sacchari &
Penidiarum ana 3̄ viii.
Fiat Sirupus secundum artem.

¶ Valet ad tussim siccam, phthisin, catarrhum, insomniæ causam.

Sirupus

Sirupus de succo Myrtillorum, descriptione Mesue.

R. Succi Myrtillorum depurati lib. viii.
 Sacchari clarificati lib. iiii.
 Coquantur secundum artem.

CVRANDVM est ut effertur ex Italia, aut Narbonensi Gallia Myrtillorum succus, si quis rolet hunc Sirupum conficere.

¶ Sirupus Myrtarum ventriculum & viscera roborat, ob id fluorem alui antiquatum sistit, & tussim mitigat.

Sirupus Myrtinus compositus.

R. Myrtillorum 3 xx.
 Sandali albi
 Sumach
 Balauisticorum
 Berberis ana 3 xxx.
 Mespilorum 3 centum
 Succu Granatorum
 Succu pomorum agrestium ana lib. ii.
 Omnia in dictis succis coquantur, & fiat Sirupus cum
 Sacchari lib. v. secundum artem.

Hic Sirupus sistit ventris fluorem, etiam antiquum, & lcreatum sanguinis.

Sirupus

Sirupus de succo Acetosæ, descriptione Mesuæ.

R. Succi Acetosæ depurati lib. iii.
Sacchari clarificati lib. ii.
Cōquantur secundum artem.

¶ Febribus biliosis & pestilentialibus saluber est, cordis & ventriculi flammeum calorem extinguit, ipsaque roborat.

Sirupus de succo Borriginis.

R. Succi Borriginis depurati lib. viii.
Sacchari despumati lib. iiii.

Coquantur aliquandiu. deinde

R. Florum Borriginis recentium lib. i.
Contundantur aliquantulum & coquantur in aquæ quantitate sufficienti, & colaturam adfunde prædictis, & fac secundum artem.

SVCCVS Borriginis prius est clarificandus cū albuminibus ouorum, alioquin plus satis mucilaginosus fieret Sirupus.

¶ Cor ipsum roborat, eiusque tremorem & syncopen sanat, manicos & melancholicos iuuat.

Sirupus de succo Buglossæ.

R. Succi Buglossæ depurati lib. viii.
Sacchari

Sacchari

lib. iiii.

Florum Buglossæ recentium

lib. i.

Flores tusi coquantur in aqua, & colatura prioribus affusa simul ad perfectionem coquantur.

Intelligo hic eam Buglossam, qua vulgò in usu est, non illam Italicam maiorem.

SUCCVS Buglossæ difficulter exprimitur, nã fit mucilago dum tunditur Buglossa, ideò tusa dimitte est per noctem in frigido loco, & postridie exprimendus Succus, atque cum albuminibus ouorum clarificandus.

¶ Cor confortat, lætitiàmque generat.

Sirupus de Lupulo.

R. Succi Lupuli depurati

lib. iiii.

Succi fumi terræ depurati

lib. ii.

Sacchari

lib. vi.

Coquantur secundum artem.

POTEST etiam hic Sirupus fieri è solo Lupuli succo, vt Mesuæ placet, in capite de speciebus volubilis, Exprimendus autem est succus Lupuli cum adhuc teneræ sunt eius viticula & asparagi.

¶ Refrigerat, & collectionum impetus lenit. Bilem regio morbo laborantibus detrahit, pituitam in aqua intercutem exigit per aluum.

Iuleb

Iuleb Rosatum.

R. Aquæ rosarum lib. iiii.
Sacchari clarificati lib. ii.
Fiat cum diligentia secundum artem.

¶ Febrium, thoracis, & ventriculi incendium, caloremque flammeum extinguit, sitim inexpletam sedat.

Iuleb Violatum.

R. Aquæ violarum lib. iiii.
Sacchari clarificati lib. ii.
Coque vt Iuleb Rosatum.

¶ Febres, phlegmonas, pleuritidem, asperitatem gutturis & thoracis, ac tussim mitigat.

Miua Cytoniorum simplex, descriptione Mesuæ.

R. Succi Cytoniorum depurati lib. xii.
Coquantur ad medietatem, & affunde vini
veteris optimi lib. viii.
Sacchari lib. xii.
Coquantur secundum artem.

¶ Ventriculum roborat, & cibum in eo continet.

L Miua

Miua Cytoniorum aromatica, descriptione Nicolai.

R. Succi Cytoniorum acetosorum lib. xx.
 Vini veteris optimi lib. x.
 Mellis despumati optimi lib. vi.
 Potest tamen etiam cum saccharo fieri.

Coquantur ad perfectionem, & aromatizentur, in syndone ligatis, cum

Cinnamomi electi

Cardamomi maioris ana 3 iii.

Charyophyllorum 3 ii.

Zingiberis

Mastiches ana 3 i. s.

Croci 3 ii.

Xyloaloes

Macis ana 3 i. s.

Moschi 3 i.

Gallie moschatæ veræ 3 ii.

Fiat secundum artem.

¶ Ventriculum, hepar, & cætera viscera roborat, appetentiam excitat, coctionem iuuat, vomitum & lienteriam sedat.

Mel Rosatum, descriptione Mesuæ.

R. Rosarum rubeorum nondum penitus apertarum lib. ii.

Mellis optimi lib. vi.

Coquantur lento igne secundum artem.

¶ Stomachum confortat & mundificat, & est digestiuum materiarum phlegmaticarum

carum in stomacho & meseraicis contentarum.

Mel Rosatum aliud efficacius.

R. Foliorum Rosarum rubearum nondum explicatarum contusorum lib. ii.

Coquantur in aquæ cœlestis lib. iiii.

Colaturæ fortiter expressæ adde Succi rosarum rubearum depurati

Mellis optimi despumati ana lib. iiii.

Coquantur secundum artem.

Oxymel simplex descriptione Mesuæ

R. Mellis optimi despumati lib. iiii.

Aceti vini acerrimi

Aquæ clarissimæ ana lib. ii.

Mel cum aqua despumetur iterum diligenter, & cum aqua fuerit consumpta, tunc adde acetum, & coque secundum artem.

¶ Humores crassos, lentos ac pituitosos incidit, extenuat, & abstergit, atque adeò obstructions aufert, sputum educit, spiritumque faciliorem reddit.

Oxymel compositum.

R. Radicum Fœniculi

Radicum Apii ana ʒ iiii.

Radicum Petroselinii

Radicum Ruscii

Radicum Asparagi

L 2 Seminis

Seminis Apii

Seminis Fœniculi ana \bar{z} i.

Coquantur in aquæ claræ lib. vi. aut quantum sufficit. Colaturæ adde

Aceti acerrimi lib. i.

Mellis optimi despumati lib. ii.

Coquantur secundum artem.

¶ Humores crassos & pituitosos incidit, extenuat, & abstergit: obstructions tollit iecinoris, lienis, ac renum: vrinam mouet, sudoremque euocat.

Oxymel Scilliticum simplex, descriptione Mesuæ.

R. Mellis despumati lib. iii.

Aceti Scillitici lib. ii.

Coquantur secundum artem.

¶ Humores crassos, lentos, auulsu contumaces separat: ob in confert ventriculi, & aliorum viscerū affectibus hos humores sequentibus, ructum acidum sanat, & vesicæ mollificationem, seu vrinæ incontinentiam.

Oxymel Scilliticum compositum.

R. Radicum Apii

Radicum Fœniculi ana \bar{z} iiii.

Radicum Petroselini

Radicum Rusci

Radicum Asparagi

Seminis

Seminis Apii
Seminis Fœniculi ana $\bar{3}$ i.
Coquantur in aquæ lib. vi. aut quantum
sufficit. Colaturæ adde
Aceti Scillitici lib. i.
Mellis optimi despumati lib. ii.
Fiat secundum artem.

¶ Id potentius multò incidit, tenuat,
terget, obstructa aperit, in diurnis quar-
tanis, & quotidianis, quàm Oxymel com-
positum de radicibus.

*Mel Anacardinum, descriptione Azar-
ranij*

R. Anacardos recentes. Terantur, & in a-
qua coquantur, donec melliginem quandā
in rubeo colore fuscā remittāt: eam aquæ
innatantem auferto, & reponito.

Mel Emblicorum.

Mel Emblicorum, est mel in quo Emblici
Myrobalani sunt conditi.
Alii verò vocant Emblicorum decoctum ad
mellis consistentiam inspissatum.

Mel Passularum.

R. Vuarum passarum lib. iiii. Infundantur
eis aquæ lib. xii. aut quantum sufficit. & ma-
cerentur horis xxiii. deinde coquantur ad
remanentiam tertiæ partis. Colentur, & co-

L 3 latura

latura decoquatur ad crassitudinem mellis,
& reponatur. hoc decoctum vocatur Mel
passularum.

R O B.

Rob de Ribes compositum.

R. Succi Ribes lib. iiii.
Sacchari optimi lib. ii.
Coquantur secundum artem.

¶ Ventriculum firmat, vomitum bilio-
sum reprimat, sitim restinguit, aliasque ex-
cretiones biliosas sistit.

Rob de Ribes simplex.

R. Succi Ribes lib. viii.
Coquantur per se ad spissitudinem mel-
lis, & reponatur.

Rob de Berberis compositum.

R. Succi Berberis lib. iiii.
Sacchari optimi lib. ii.
Coquantur secundum artem.

Rob de Berberis simplex.

R. Succi Berberis lib. viii.
Coquatur per se usque ad mellis spissitudi-
nem.

¶ Rob

¶ Rob ex oxyacantha easdem quas præcedens facultates obtinet.

Rob Nucum, descriptione Mesuæ.

R. Succi corticum viridum Juglandium
lib. iiii.

Mellis optimi lib. ii.

Coquantur secundum artem.

¶ Destillationi tenuium humorum à capite, & inflammationem excitantium confert.

Diamoron, descriptione Nicolai.

R. Succi Mororum Celsi lib. s.

Succi Mororum rubi lib. i.

Mellis optimi despumati lib. i.

Sapæ ʒ iii.

Coquantur secundum artem.

¶ Contra depascentia oris vlcera, ad dentium affectus & gingiuarum noxas, atque ad omnia oris vitia gargarizatus proficit.

Diamoron aliud, descriptione Valerij Cordi.

R. Succi Mororum rubi

Succi Mororum rubi Idæi

Succi Mororum Celsi

Succi Fragarum ana lib. ii.

Mellis despumati optimi lib. iii.

Coquantur lento igne secundum artem.

L 4

MORORVM

MORORVM omnium succus exprimendus est
antequam perueniant ad maturitatem. Porro Mo-
ra rubi Idæi & Fraga citius maturefcunt quàm a-
lia, idè oportet vt horum Succus colligatur, &
cum faccharo decoctus reponatur, donec alij matu-
rescant. Sint autem succi vniuscuiusque lib. ij.
Sacchari lib. i. ad quemuis eorum, id est, Sac-
chari lib. ij.

RVBVS Idæus est ille rubus, quem nos voca-
mus Himpen, eius mora siue fructus vocantur
Himper.

L O H O C H.

Lohoch sanum & expertum, descri-
ptione Mesuæ.

R. Cinnamomi

Hyssopi

Glycyrrhizæ ana 3 iiii.

Iuiubarum

Sebesten ana numero xxx.

Passularum enucleatarum

Ficum siccarum

Dactylorum pinguium ana 5 ii.

Fœnogræci 3 v.

Capilli veneris M i.

Anisi

Fœniculi

Ireos

Seminis Lini

Calaminthæ ana 3 iiii.

Coquantur secundum artem in aquæ cla-
rissimæ

Lohoch

235

rissimæ lib. iiii. ad consumptionem lib. ii.

Colaturæ expressæ adde

Penidiarum lib. ii.

Coquantur ad perfectionem, postea insperge subsequencia minutissimè incisa & tusa.

R. Pinearum mundatarum 3 v.

Amygdalarum dulcium mundatarum

Succi Glycyrrhizæ

Tragacanthæ

Gummi Arabici

Amyli ana 3 iiii.

Ireos 3 ii.

Agitentur omnia simul celerrimè, donec albescat.

¶ Tussi vocisq̃ue asperitati à frigiditate natæ auxilio est. Crassos in thorace & pulmone humores extenuat.

Lohoch de Pino, descriptione Mesuæ.

R. Pinearum 3 xxx.

Amygdalarum dulcium

Auellanarum assatarum

Tragacanthæ

Gummi Arabici

Glycyrrhizæ

Amyli

Capilli Veneris

Ireos ana 3 iiii.

Carnium dactylorum 3 xxxv.

Amygdalarum amararum 5 iii.

Mellis passularum

L s Butyri

Butyri recentis

Sacchari Tabarzet ana 3 iiii.

Mellis Tabarzet lib. iii. 3 i. 3 iiii.

Conterenda contundantur, & incidenda incidantur minutissimè, & cum melle excipiantur.

MEL Tabarzet est optimum, sincerissimum atque odoratissimum mel, quale ex Dantisco affertur.

¶ Tussi diuturnæ, difficultati spiritus, & asthmæ succurrit: humores in thorace crassos incidit, & extenuat.

Lochoch de Papauere, descriptione Me sue.

R. Papueris albi 3 xxv.

Amygdalarum dulcium

Pinearum

Gummi Arabici

Tragacanthæ

Succi Glycyrrhizæ ana 3 x.

Amyli

Seminis Portulacæ

Seminis Lactucæ

Seminis Cytoniorum ana 3 iiii.

Croci 3 i.

Penidiarum albarum 3 iiii.

Sirupi de papauere lib. iii.

Omnia contundantur & incidantur atque cum Sirupo excipiantur, secundum artem. Porro iste Sirup⁹ de Papauere sic fieri debet.

R. Ca-

Lohoch

237

R. Capitum Papaueris albi recentium,
 Capitū Papaueris nigri recentium ana ʒ vi.
 Seminis Lactuæ ana ʒ i.
 Florum violarum ana ʒ i.
 Aquæ quantum sufficit, aut lib. viii.
 Coquantur. & colaturæ adde
 Sacchari lib. iiii.
 Coquantur ad spissitudinem.

HOC Lohoch de Papauere appellatur etiam alio nomine Diapapauer.

¶ Iuuat tussim, & gutturis asperitatem à catarrho calido, tenui (quem sputum liquidum indicat) eum enim coquit, & crassat. Consert etiam febribus ardentibus, dolenti thoraci, pleuritidi.

Lohoch de Scilla, descriptione Mesuæ.

R. Succi Scillæ
 Mellis despumati ana lib. i.
 Coquantur secundum artem.

Scilla propriè succum non habet, sed mucilaginem, quæ sic est colligenda.

R. Scillas crudas tres aut quatuor eius laminas puriores, plenas & nitidas, in partes incidito cultello eburneo, deinde in pilâ siue mortario fictili aut lapideo siue marmoreo terito cum agitaculo ex ligno Guaiaco siue sancto facto, & deinde exprime & vtere.

I. 6 Eclogma

¶ Eclegma de Scilla, materiam crassam, lentam, coctu difficilem in partibus respiratoriis, expelli facilem strenuè reddit, & nam inde spirandi difficultatem, & thoracis dolorem leuat.

Lohoch de pulmone uulpis, descriptione Mesue.

R. Pulmonis vulpini siccati

Succi Glycyrrhizæ

Seminis Anisi

Seminis Fœniculi

Capilli Veneris ana ʒ i.

Sacchari clarificati ʒ xv.

Conterantur omnia tenuissimè & cum Saccharo excipiantur.

¶ Abstergit & consolidat vlcera pectoris & pulmonis, & præferendum est aliis remediis in phthisi.

Lohoch ad asthma.

R. Scillæ assatæ ʒ s.

Radicum Ireos

Hysopi

Prasii ana ʒ i.

Myrrhæ rubæ

Croci ana ʒ s.

Cum mellis quantitate sufficienti fiat Lohoch.

¶ Ad asthma & tussim antiquam valet: humorem enim crassum tenuat.

TROCHISCI

TROCHISCI.

Trochisci de Vipera, descriptione Andromachi.

R. Carnis viperinæ cum anetho, sale, &
aqua coctæ ℥ viii.

Panis triticej purissimi triti & cribrati ℥ ii.

Formentur trochisci cum iusculo, in quo decoctæ fuerint carnes Viperinæ, & inungantur cum Opobalsamo, aut oleo Macis, aut Charyophyllorū, aut Nucis muscatæ: sed oleum Charyophyllorū proprius accedit ad naturam Balsami. Siccentur in loco umbroso, libero ventoque perflabili.

VIPERA est serpens, quem recentiores vocant *Tirum*, Itali verò *Marassum* & *Scurzionem*, ut scribit Nicolaus Leoniceus. Ingrediuntur aut hi trochisci in theriacam. Apud nos verò nec licuit videre hoc serpentum genus. Igitur ex Italia peti debent veri trochisci de Vipera.

Trochisci Scillitici, descriptione Andromachi.

R. Scillæ assatæ lib. i.

Farinæ Orobi ℥ viii.

Formentur trochisci secundum artem.

Trochisci

Trochisci Hedychroi, descriptione Aetij.

R. Mari siue Maioranæ, aut loco eius Di-
ctamni Cretici

Asari

Sampsuchi

Aspalathi, eius loco sumatur semen agni
casti

Opobalsami, eius loco accipiatur oleum Ca-
ryophyllorum

Schœnanthi

Calami aromatici, eius loco sumatur
Galanga

Phu pontici ana 3 i. gr. xv.

Xylobalsami

Cinnamomi

Costi ana 3 i. s.

Myrrhæ Troglodyticæ

Folii, aut succedanei eius

Spicæ nardi Indicæ

Croci

Cassie ana 3 iii. s. gr. xv.

Amomi, aut succedanei eius \varnothing ii. gr. xiii.

Mastiches 3 s. gr. vii. s.

Vini veteris odorati dulcis quantum suffi-
cit. Formentur trochisci.

MARVM herba est non dissimilis Maioranæ,
eius loco accipitur Dictamnus Creticus.

SAMPSUCHVS, id est Maiorana, quidam ha-
bent Amaracum, quod idem est. Non enim debet
hæc loco accipi Matricaria aut Cotula foetida, quæ
etiam

etiam vocatur Amaracus.

ASPALATHVS est cortex quidam odoratus .
eius loco accipe lignum Aloes aut Sandalum citri-
num odoratissimum , aut semen Agni casti .

FOLIUM , pro Folio sume Spica Romanae ra-
dicum , Macis ana partes equales .

HI Trochisci appellantur ab Arabibus Alinda-
racaron, à recentioribus verò vt Nicolao sunt parũ
immutati , & vocantur Diacoralis .

Trochisci Hedychroi, descriptione Ga- leni.

R . Corticum radicum Aspalathi, ipsius lo-
co sumatur semen Agni casti .

Nardi Indicæ

Calami aromatici, sume eius loco Galan-
gam

Foliorum Malabathri

Costi

Afari

Xylobalsami

Phu

Amaraci, hinc significat Maioranam

Mastiches ana 3 vi.

Schœnanthi

Cinnamomi

Amomi

Cassia

Rheupontici, id est, Rhabarbari

Myrrhæ

Croci ana 3 xii.

Omnia subtilissimè trita cum vino Pha-
lerno, in trochiscos formètur, qui in vmbra
exic-

exiccentur, & Opobalsamo aut oleo Charophyllorum inuncti reponantur.

GALENVS in libello de Theriaca ad Pamphilianum scripto, ad hunc modum præcipit conficiendos esse Hedychroos trochiscos. Sunt enim proximis non ignauiores.

Pro Aspalatho, quo caremus, licet accipere semen Agni casti, aut ligni aloes, aut Sandalum citrinum odoratum. Oportet etiam diligenter aduertere, ne pro Aspalatho Asphaltum legatur aut accipiat.

Pro Amomo vero, quo caremus, pone Carpesium, aut vocatum Calamum aromaticum.

Pro Vino Phalerno accipe aliud quoduis vinum generosissimum.

Trochisci Hedychroi alij Galeni.

R. Mari

Asari

Amaraci, id est, Maioranæ

Aspalathi ana 3 ii.

Schœni, id est, squinanthi

Calami odorati

Phu pontici

Xylobalsami

Opobalsami

Cinnamomi

Costi

Myrrhæ

Folii Malabathri, aut succedanei eius

Nardi Indicæ

Croci

} aut succedaneorum
eorum

ana 3 iii.

Cassia

Cassiae ana 3 vi.
 Amomi aut succedanei eius 3 xii.
 Mastiches Chia 3 i.
 Vini Phalerni quantum sufficit.

Formentur trochisci, & in umbra exiccantur, Opobalsamo aut oleo Charyophyllorum vncti.

Pro Maro sume Dictamnium Creticum.

ASPALATHI loco, sume lignum Aloes, aut Sandalum Citrinum, aut semen Agui Casti, vt Galenus de succedaneis dicit.

Pro Calamo, sume Galangam.

Pro Opobalsamo, sume oleum Charyophyllorum.

AMOMI loco, sume vocatum Calamum aromaticum.

Pro Malabathro, sume Spica Romanae radices, aut Spica Romanae radicem, & Macis ana partes aequales.

CASSIA, id est, Cassia lignea aromatica similis Cinnamomo.

MASTICHE Chia, id est, Mastix è Chio insula, quae est optima.

HAEC est genuina Hedychroi compositio, vt Galenus dicit, & haec debet ingredi theriacam Andromachi senioris.

GALENUS primo libro de Antidotis ad hunc modum carmine describit compositionem Hedychroi magmatis, vbi theriacae compositionem docet. Non tamen diligenter distinguit pondera rerum. Nam omnia coniungit coniunctionibus copulativis, & & & hoc est, quae, & et.

Trochisci

Trochisci Cyphi, descriptione Damocratis.

R. Carnium Vuæ passæ albæ & pinguis-
mæ

Terebinthinæ coctæ ana 3 xxiiii.

Myrrhæ

Schœni, id est, Squinanthi ana 3 xii.

Calami vnguentarij 3 ix.

Cinnamomi 3 iiii.

Bdellii

Onychis

Nardi spicæ

Cassie optimæ quæ est similis Cinnamo-
mo

Cyperii purgati

Arceuthidum maximarum & pinguis-
simarum ana 3 iiii.

Aspalathi 3 ii. s.

Croci 3 i.

Mellis optimi

Vini ana quantum satis est ad formandum
& incorporandum.

MELLIS & vini parum debet addi, ut tan-
tùm cum his conficiantur trochisci.

CARNES Vuæ passæ atque Iuniperi baccas re-
centes & pingues minutissimè condito tunditoq; de
inde Bdellium Myrrhamq; affuso vino diluito, po-
stea reliqua omnia in tenuissimum puluerem redigi-
to, ac demum adhibito modico mellis despumati o-
ptimi trochiscos formato.

ARABES hos trochiscos vocant Cochion.

Per

Per *ruas passas* hic intellige eas, quas vocant
ruas Cybibus, vulgò *Cibeben*.

TEREBINTHINAE coctæ. quomodo coquatur
resina Terebintlina ostendam inferius in tractatu
de præparatione medicamentorum.

CALAMVS vnguentarius, id est, aromaticus
verus, pro quo sume Galangam, quia hodie care-
mus vero Calamo aromatico.

ONYCHIS, id est, Blattæ Bizantie electæ.

CYPERVM purgatum præcipit accipiendum,
quoniam plerunque fibris sordidis sunt obsitæ ra-
dices eius.

ARCEVTHIDES, sunt bacca Juniperi, hic
autem debent accipi Juniperi magna grandes bacca
quoniam autem caremus ipsis, vulgaris & mino-
ris Juniperi baccas accipere licet.

Pro Aspalatho sumatur semen Agni Casti, ex
mente Galeni de succedaneis.

Trochisci Ramich, descriptione Me-
sue.

R. Succî Acetosæ, aut loco eius succi

Cytoniorum austerorum $\bar{3}$ xvi.

Rosarum $\bar{3}$ i.

¶ Bulliant parum & colentur. Colaturæ
addatur

Gallarum iamiam tritarum $\bar{3}$ iii.

Coquantur denuò aliquantulum, deinde
inspergatur sequentium specierum minutis-
simus & optimè commixtus pulvis.

R. Rosarum $\bar{3}$ i.

Sandali machoziri $\bar{3}$ i. 3 ii.

Gummi Arabici $\bar{3}$ i. 3 iii.

Carnium

Carnium Sumach

Spodii ana $\bar{3}$ i.

Agrestæ 3 vii.

Granorum Myrti $\bar{3}$ iiii.

Ligni aloes

Charyophyllorum

Macis

Nucis Muscatæ ana 3 iiii.

Misceantur omnia optimè, deinde exiccantur, exiccata rursus in tenuissimum pulverem terantur, & formentur trochisci subtiles cum Camphoræ aureo vno, & aqua Rosarum quantum sufficit. Exiccantur in umbra libera, exiccati reponantur.

¶ Ventriculum, cor, hepar, imbecilla firmant, & lubrica viscera ac intestina, choleram morbum sistunt, acrimoniam obtundunt, animum reddunt tranquillum, omnem hæmorrhagiam cohibent, ob quam naribus sanguine fluentibus stando impellitur, aliis medicamentis miscentur.

Trochisci de Cappare, descriptione Mæ sue.

R. Corticum radicum Capparidis

Seminis agni casti ana 3 vi.

Hammoniæ 3 iiii.

Seminis Nigellæ veræ

Calaminthæ

Succi Eupatorii, id est, Gratiolæ

Amygdalarum amararum

Foliorum Rutæ

Radiciæ

Trochisci

247

Radiciſ Aristolochiæ rotundæ veræ

Seminis Naſturtii ana 3 ii.

Scolopendriæ 3 i.

Formentur trochiſci cum Hammoniaco prædicto in aceto diſſoluto, & exiccati reponantur.

SCOLOPENDRION eſt Ceterach, & non Lingua ceruina.

¶ Ad ſplenis duritiem & flatuſ eius diſſipandos valent.

Trochiſci de Eupatorio, deſcriptione Meſue

R. Tereniabin, id eſt, Mannæ

Succi Eupatorii ana 3 i.

Rofarum 3 iiij.

Spodii 3 iij. s.

Spicæ Nardi Indicæ 3 iij.

Rheubarbari

Aſari

Aniſi ana 3 ii. s.

Formentur trochiſci cum aqua Cuſcutæ, & in vmbra libera ventoq; perflata exiccati reponantur.

PRO Spodio ſumatur Ebur combuſtum.

¶ EUPATORIUM Meſuæ, intelligendum eſt Gratiola.

¶ Obſtructionem & tumorem præter naturam hepatis & lienis ſanant, ac inde natas febres

febres antiquas, & harum rigorem, icterū,
ac incipientem hydropem.

Trochisci Diaion, descriptione Nicolai Alexandrini.

R. Florum Violarum 3 xv.
Amyli 3 ix.
Seminis papaveris albi 3 vii.
Rhabarbari 3 v.
Seminis plantaginis 3 iii.
Balsami (loco eius oleum Charyophyllo-
rum) 3 i.
Rhodostagmatis quantum sufficit.
Formentur trochisci.

DIANI, vel DIAVI aliās vocantur hi tro-
chisci, sed corrupto nomine.

PER VIOLA hoc loco oportet intelligere Vio-
las albas, quæ hodie vocantur Cheyri citrini vulgò
Gelbe Violes.

PER Balsamum intelligitur Opobalsamum.

RODOSTAGMA, id est, aqua Rosarum.

¶ Excelsationes mitigant, aluumque
emolliunt.

Trochisci Diani, descriptione Nicolai.

R. Violarum albarum viridium 3 v.
Amyli 3 iii.
Papaveris albi 3 ii. ̄i.
Seminis Plantaginis 3 i.
Rheubarbari ̄i.
Opobalsami

Trochisci

249

Opobalsami (aut succedanei eius) ʒ i.
Aquæ Rosarum quantum sufficit.
Formentur trochisci.

NICOLAUS alter, paulò aliter componit trochiscos Diani, vt hæc ostendit compositio.

VIOLAE Albæ, id est, Cheyri citrini.

Trochisci de Lacca, descriptione Mesue.

R. Laccæ mundatæ
Succi Glycyrrhizæ
Absinthii
Berberis
Succi Eupatorii, id est, Gratiolæ
Rhabarbari
Aristolochiæ longæ
Costi
Asari
Amygdalarum amararum
Rubæ tinctorum
Anisi
Apii
Schœnanthi ana 3 i.

Formentur trochisci drachmæ pondere cum aqua Eupatorii.

Mesue intelligit suum Eupatorium, id est, Gratiolam.

¶ Trochisci Cancami, valent ad obstructions hepatis, & lienis, & inde natas febres varias antiquas, & ascitem per vrinas mouent.

Trochisci

Trochisci Diarhodon, descriptione Nicolai.

R. Rosarum viridium 3 iiii.
 Spodij, id est, Eboris combusti 3 ii.
 Sandali rubei 3 i. s. gr. vii.
 Sandali albi 3 i. gr. xii.
 Croci 3 ii. gr. vii.
 Camphoræ gr. xii.
 Aquæ rosarum quantum sufficit.
 Formentur trochisci.

¶ Ista compositio debet administrari in magnis confectionibus ipsius Nicolai.

Trochisci de Rheubarbaro, descriptione Mesuæ.

R. Rued boni, id est, Rheubarbari 3 x.
 Succus Eupatorii, id est, Gratiolæ
 Amygdalarum amararum ana 3 iiii.
 Rosarum
 Spicæ Nardi Indicæ
 Anisi
 Rubæ tinctorum
 Seminis Apii
 Absinthii
 Asari ana 3 i.
 Formentur trochisci aurei vnus pondere cum aqua Cuscutæ

¶ Valent ad hepatis obstructionem, dolorem, tumores præter naturam, affectus inueteratos

Trochisci

252

queteratos eiusdem, & hydropem, & icterum, & formæ corruptionem.

Trochisci de Berberis, descriptione Mesuæ.

R. Berberis 3 ii.
 podii
 Xyloaloes
 seminis Acetosæ
 Mastiches
 Gallie moschatæ verę
 spicæ nardi Indicæ ana 3 i.
 Gummi Arabici 3 iii.
 Rosarum 3 v.
 Aquæ rosarum quantum sufficit.
 Formentur trochisci.

¶ Trochisci Oxyacanthæ valent ad intemperiem calidam, fluorem alui, & hepatis dolorem.

Trochisci Gallie Moschatæ, descriptione Mesuæ.

R. Xyloaloes crudi 3 v.
 Ambræ 3 iii.
 Moschi 3 i.
 Mucilaginis Tragacanthæ cum aqua rosarum factæ quantum sufficit.
 Formentur trochisci parui.

¶ Cerebrum corque roborant, vomitum & alui profluvium sistunt, oris, at-

M quæ

que adeò corporis totius odorem commendant.

Trochisci Aliptæ moschatæ, descriptione Nicolai.

R. Ladani purissimi ℥ iii.
 Styracis Calamitæ ℥ i. s.
 Styracis rubeæ ℥ i.
 Ligni aloes 3 ii.
 Ambre 3 i.
 Camphoræ 3 i. s.
 Moschi 3 s.
 Aquæ Rosarum quantum sufficit.

Formentur trochisci secundum artem.

STYRAX *rubea*, hic non significat *Thymiam*, aridum illum & nigrum corticem: sed resinam *Storacis* quæ subruffa, aut flava est, id est, optima *Styrax*.

¶ Valent' pueris patientibus asthma & constrictionem pectoris, & etiam non valentibus lac retinere: fit inde optimum fumigium & odoriferum, & assumuntur etiam ad pretiosissimas medicinas.

Trochisci de Agarico, descriptione Measue.

R. Agarici electi ℥ iii.
 Salis gemmæ ℥ i.
 Sirupi acetosi simplicis quantum sufficit.
 Formentur trochisci, & reponantur in calido siccoque loco.

¶ Purgant

Trochisci

253

¶ Purgant ex cerebro & capite phlegma crassum cum cholera mistum. Et præcipuè educunt ex pectore crassos humores, putridos, & viscosos.

Agaricus Trochiscatus, descriptione Mesue.

R. Agarici electi ʒ iiii.
Vini infusionis zingiberis quantum sufficit.
Formentur trochisci.

Trochisci de Caraba, descriptione Mesue.

R. Carabæ aureos vi.
Cornu cerui vsti
Gummi Arabici assati
Corallii rubei vsti
Tragacanthæ
Acaciæ
Hypocistidis
Balaustiorum florum
Mastiches
Laccæ
Papaueris nigri assati ana aureos ii.
Thuris
Crocī
Opī ana aureum i. s.
Mucilaginis Psyllii quantum sufficit.
Formentur trochisci.
Fiunt & hi trochisci sine opio.

¶ Trochisci ex Succino, inuenti sunt ad constringendū sanguinē vndecunque fluen-

M 2 tem,

tem, menstrua, sputum, fluxum sanguineum, & hæmorrhoidalem, & consolidant ulcera pectoris & pulmonis.

Trochisci de Myrrha, descriptione Rasis.

R. Myrrhæ 3 iii.
 Lupinorum 3 v.
 Foliorum Rutæ
 Menthastrī
 Pulegii Ceruini
 Cymini
 Rubæ tinctorum
 Asæ fœtidæ
 Sagapeni
 Opopanacis ana 3 ii.
 Succī Artemisiæ quantum sufficit.

Formentur trochisci secundum artem.

MENTHASTRVM est sylvestris *Mentha pili-
 losa* & *hirsuta* foliis.

PVLEGIVM *Ceruinum*, id est, *Dictamnus
 Creticus*.

¶ Prouocant menstrua, & sedant passio-
 nes quæ ex retentione menstruorum pro-
 ueniunt.

*Trochisci de AlkeKengi, descriptione
 Mesue.*

R. Fructus AlkeKengi 3 iii.
 Seminīs Citrulli

Seminis

Trochisci

255

Seminis Albatechæ
 Seminis Cucurbitæ ana 3 iii. s.
 Boli Armeniaci
 Gummi Arabici
 Thuris
 Sanguinis Draconis
 Papaveris albi
 Amygdalarum amararum
 Succi Glycyrrhizæ
 Tragacanthæ
 Amyli
 Pinearum ana 3 vi.
 Seminis Apii
 Carabæ
 Terræ sigillatæ (aut Boli armeni leuanticæ)
 Hyoscyami
 Opii ana 3 ii.
 Succi Alkekengi quantum satis fuerit ad for
 mandum trochiscos.
 Fiunt & hi trochisci sine opio.

ALBATECHA *sive Bataga, est Melon magnus
 Indus viridis & subniger.*

¶ Trochisci Halicacabi valēt ad renum
 & vesicæ vlcera, & natam inde dysuriam.

Trochisci de Rosis, descriptione Ra-
sis.

R. Rosarum 3 iii.
 Ligni aloes 3 ii.
 Mastiches 3 i s.
 Absinthii
 M 3 Cinnamomi

Cinnamomi

Spicæ nardi Indicæ

Cassie lignæ (aut succedanei eius)

Florum Squinanthi ana 3 i.

Vini veteris quantum ad formandum trochiscos satis fuerit.

¶ Sunt efficaces ad multos affectus, præsertim ad ventriculi dolorem, malam coctionem, febres antiquas, hydropem incipientem, & illos maximè, quibus forma corrumpitur.

*Trochisci de Camphora, descriptione**Mesue.*

R. Rosarum 3 iiii.

Spodii

Glycyrrhizæ ana 3 ii.

Seminis Cucurbitæ

Seminis Citrulli

Seminis Cucumeris

Seminis Melonis

Tragacanthæ

Croc

Gummi Arabici

Spicæ nardi Indicæ ana 3 i.

Sandali citrini 3 ii. s.

Ligni aloes

Cardamomi

Amyli

Camphoræ ana 3 ii.

Sacchari Tabarzet

Tereniabin, id est, mannæ ana 3 iii.

Mucilaginis

Trochisci

257

Mucilaginis Psyllii cum aqua Rosacea factæ quantum sufficit. Formentur trochisci.

¶ Trochisci Camphoræ, conferunt ad febres ardentes, bilis & sanguinis seruorem, ventriculi & hepatis intemperiem calidam, & ab his sitim inexpletam: icterum quoque, ac phthisim & hæcticam curant.

*Trochisci de Terra sigillata, descriptio
ne Mesuæ.*

R. Sanguinis Draconis
Gummi Arabici assati
Trochiscorum Ramich
Rosarum rubearum
Seminis Rosarum
Amyli assati
Spodii
Acaciæ
Lapis Hæmatitis
Hypocistidis
Florum balaustiorum
Boli armeniaci
Terræ sigillatæ, vel Boli armeni
Corallii rubei
Carabæ ana 3 ii.
Margaritarum
Tragacanthæ
Papaueris nigri ana 3 i. s.
Seminis Portulacæ assati
Cornu cerui vsti
Thuris

M 4 Galiarum

Gallarum Cypressi

Crociana 3 ii.

Aquæ Arnoglossæ quantum sufficit.

Formentur trochisci.

*SPODII. pro Spodio sume Ebur combustum præparatum.**SEMEN Rosarum hic significat Antheram, id est, luteos apices qui sunt in rosis, hi exiccati rubescunt.**GALLAE Cypressi etiam vocantur nuces Cypressi.*

¶ Sunt admodum efficaces ad sputū sanguinis cum aqua plantaginis poti: ad fluorem verò sanguinis è naribus, fronti illiti: ad menses immodicos, vtero iniectioni, vel pubi illiti: ad mictum sanguinis, in vesicam iniectioni: & ad alias hæmorrhagias, parti guine fluenti impositi.

Trochisci de Spodio, descriptione Mæsuræ.

R. Rosarum rubearum 3 xii.

Spodii 3 x.

Seminis acetosæ 3 vi.

Seminis Portulacæ

Coriandri præparati

Pulpæ Sumachi ana 3 ii. s.

Amyli

Florum balaustrorum

Baccarum Berberis ana 3 ii.

Gummi Arabici assati 3 i. s.

Agrestæ quantum sufficit.

Formentur trochisci.

¶ Valent

259

Trochisci de Absinthio, descriptione
Mesue.

Formentur trochisci secundum artem.

¶ Obstructiones ventriculi & hepatis, & ab his dolorem, & febres antiquas tollunt: dictas partes, reliquasque nutritorias roborant, ac appetentiam excitant.

Trochisci Alhandali, descriptione Me-
sue.

R. Pulpæ Colocynthidis ʒ x.
M s Inci-

Trochisci

Incidantur minutissimè, & fricentur cum

olei Rosacei $\bar{3}$ i.

Deinde sume

Tragacanthæ

Gummi Arabici

Bdellii ana 3 vi.

Macerentur hæc in aqua Rosacea, donec liquefiât & dissoluantur: deinde cum parte resolutarum lacrymarum formetur ex prædicta Colocynthide trochisci, qui siccetur, & cum fuerint siccati, contendantur minutissimè, & rursus formentur trochisci cum reliquo diluto lacrymarum, atque repellantur.

¶ Trochisci Colocynthidos in hieram Hermetis, & compositiones alias iniiciendi loco Colocynthidos, sunt salubriores quàm ipsa Colocynthis.

Trochisci Bechij albi.

R. Sacchari albissimi lib. i.

Sacchari Candi optimi

Sacchari Penidii ana $\bar{3}$ iiii.

Ireos $\bar{3}$ i. 3 vii.

Amyli $\bar{3}$ i. s.

Mucilaginis Tragacanthæ albissimæ cum aqua Rosacea factæ quantum sufficit.

Formentur trochisci parui, & signentur.

¶ Auxiliantur tussiculosis, & difficulter spirantibus.

Trochisci

Trochisci

262

Trochisci Bechij nigri.

R. Succi Glycyrrhizæ ℥ iii.
 Styracis Calamitæ ℥ i. s.
 Sacchari Candi ℥ ii. s.
 Specierum Diaireos Salomonis
 Specierum Lohoch sani ana ℥ s.
 Sacchari Penidij lb. s.
 Sacchari albissimi lib. ii. ℥ iii.
 Mucilaginis Tragacanthæ cum aqua Hyflo
 pi factæ, quantum sufficit.
 Formentur trochisci & signentur.

¶ Abscessus vocis iacturam refarciunt, & profunt his qui patiuntur tussim calidam & siccam: leniunt pectus, & faciunt sputum.

EMPLASTRA.

Emplastrum Diachylon simplex, de- scriptione Mesuæ.

R. Mucilaginis Fœnogræci
 Mucilaginis seminis lini
 Mucilaginis radicum Althææ ana lib. i.
 Olei veteris clari lib. iii.
 Lithargyrii lib. i. s.
 Coquantur secundum artem, & fiat empla-
 strum.

M 6 DIACHYLON

DIACHYLON vocatur hoc Emplastrum à suc-
cis viscosis siue mucilaginibus. hodie corrupto no-
mine dicunt Diaquilon.

MUCILAGINES ista debent esse spissæ &
viscosæ, ideoq; oportet vt quantitas seminum &
radicum sit satis magna, rude fieri debent mucil-
lagines.

¶ Scirrhus hepatis, lienis, ventriculi, &
aliarum partium, ipsas etiam chæradas & du-
rities reliquas emollit, & iuuat.

Emplastrum Diachylon compositum.

R. Mucilaginis radicum Altheæ
Mucilaginis seminis Lini
Mucilaginis Mediani corticis vlmī
Mucilaginis Fœnogræci ana ʒ iiii.
Olei Chamæmelini
Olei Liliorum
Olei Anethini ana ʒ i.
Hammoniāci
Galbani
Opopanacis
Sagapeni ana ʒ s.
Ceræ nouæ ʒ xx.
Croci 3 ii.
Terebinthinæ ʒ ii.

Gummi siue lacrymæ resoluantur in vi-
no optimo, & conficiantur secundum artē.

Porrò hyeme licet olecrum & terebinthinæ pon-
dus augere.

VLMVS arbor est quæ vocatur Germanicè Yl-
men

Emplastra

263

men & Ruſtera. Cortex eius medius eſt ſimilis cor-
tici Tilie, Gleich wie ein baſt. ex eo debet fieri Mu-
cilago.

CHAMAEMELVM vulgò vocatur Camo-
milla.

¶ Maturat apoſtemata & mollit durities,
partim reſoluit, & partim digerit, abſter-
gitque ſaniem ruptorum apoſtematum, &
ſanat phlegmones.

*Emplaſtrum Diachylon magnum, deſ-
criptione filij Zachariæ.*

R. Lithargyrii mūdi tenuiſſimè triti & per
cribrum excuſi ʒ xii.

Olei Irini

Olei Chamæmelini

Olei Anethini ana ʒ viii.

Mucilaginis feminis lini

Mucilaginis Fœnogræci

Mucilaginis ficuum pinguium

Mucilaginis paſſularum

Succi Ireos

Succi Scillæ

Oſſypſi

Glutinis Alchanach ana ʒ xii.

Terebinthinæ ʒ iii.

Reſinæ Pini

Ceræ citrinæ ana ʒ ii.

Conficiatur ſecundum artem emplaſtrū.

SVCCVS Scillæ eſt mucilago ex trita Squilla
expreſſa.

OESYPVS

OESYPVS est pinguedo lanarum succidarum, cuius faciendi modum in ultimo tractatu indicabimus. vulgò vocatur in pharmacopolijs *Hyssopus humidus*.

GLVTEN Alchanach siue AlZanach est Ichthyocolla, id est, gluten siue colla piscium: vulgo, *Hausenblasen*.

HOC Emplastrum debet habere consistentiam & spissitudinem Ceroti.

¶ Resoluit & maturat omnes durities & inflammationes.

Emplastrum Diachylon paruum, descriptione Mesuæ.

R. Lithargyrii	℥ vi.
Olei veteris clari	lib. i.
Mucilaginis Psyllii	℥ iii.
Mucilaginis Hyoscyami	℥ i. s.
Mucilaginis semini Lini	
Mucilaginis radicum Maluæ	ana ℥ ii.

Conficiatur secundum artem Emplastri Ceroti alicuius spissitudine.

¶ Tumores calidos digerit & maturat.

Emplastrum de Meliloto, descriptione Mesuæ.

R. Meliloti	℥ vi.
Florum Chamæmeli	
Fœnogræci	
Baccarum Lauri	
	Radicum

Emplastra

265

Radicum Altheæ

Absinthii ana 3 iii.

Seminis Apii

Cardamomi

Ireos

Cyperi

Spicæ nardi Indicæ

Cassia lignæ

Ammios ana 3 i. s.

Sampsuchi, id est, maioranæ 3 iii.

Hammoniæ, id est, armoniæ

Styracis Calamitæ

Bdellii ana 3 v.

Terebinthinæ 3 i. s.

Ficuum pinguium numero xii.

Seui Hircini

Resinæ ana 3 ii. s.

Ceræ 3 vi.

Olei sampsuchini

Olei Spicæ ana quantum sufficit.

OLEI Sampsuchini compositio in feriùs traditur in tractatu de Oleis.

Per Oleum Spicæ Mesuæ intelligit oleum Spicæ Nardi siue oleum Nardinum. Mesuæ enim nusquã meminit Lauandulæ maioris quæ hodie Spica vocatur, neque eius olei quod vocant oleum Spicæ.

Confice Emplastrum sic.

R. De Meliloto prædicto 3 v. 3 ii.

Fænogræci.

Chamæmeli, eorsim præter prædicta ana 3 iiij.

Coquantur in lib. iiij. aquæ aut quantum sufficit, donec remaneat lib. i. deinde omnia arida cum reliquis vi. drachmis Meliloti subtilissimè pulueri-

Zentur

Zentur . in decoctione autem colata secundum artem dissolvantur Hammoniacum & Bdellium : dissolutis addantur ficus per se minutissimè incisæ & contusæ & optimè misceantur, postea ad ignem simul liquefiant Terebinthina, Seuum hircinum, Cera, & Resina pini, & addatur Olei Spicæ Nardi, Olei Sampsuchi ana circiter \bar{z} v. Cum deinde omnia sunt mista, addantur pulveres triti & fiat secundum artem Emplastrum.

Porro potes etiam sequenti ratione cōficere \bar{z} vi. ingredientis Meliloti, una cum reliquis aridis tundito, & yisdem permisceto. postea R. ad decoctionem priuatim Meliloti M. iiij. & Gummi videlicet Hammoniacum atque Bdellium in vino dissoluto. Olei verò Sampsuchini atque olei Nardini accipere tum oportet ana circiter \bar{z} viij. aut viij. & confice secundum artem Emplastrum.

¶ Emollit omnem duritiem quæ in iecinore, liene, & ventriculo existit. Dolorem item vehementer sedat, hypochondriaque tensa sanat.

Emplastrum Triapharmacum, descriptione Mesuæ.

R. Lithargyrij subtilissimè triti
Aceti vini ana lib. j.
Olei veteris lib. ij.
Fiat secundum artem Emplastrum.

¶ Facit nasci carnem in vulneribus, & consolidat ea

Emplastrum

*Emplastrum Oxycroceum, descriptio
ne Nicolai.*

R. Ceræ

Picis

Colophonix

Croci ana ʒ xii.

Terebinthinæ

Galbani

Hammoniæ

Myrrhæ

Libani, id est, thuris

Mastiches ana ʒ iiii.

Aceti phialam vnam.

Galbanum & Hammoniæ in aceto sufficienti quantitate dissoluantur, & rursus ad lentorem coquantur, donec acetum in vaporem euanuerit: tum addantur liquefactis simul Ceræ, Pici, Colophonix & Terebinthinæ: postquam omnia sunt commista, inspergito etiam Myrrham, Libanum, & Mastichem, subtilissimè trita: ad vltimū verò etiam Crocum per se in tenuissimum puluerem redactum. Et fiat secundum artem Emplastrum.

OXYCROCEVM dicitur hoc Emplastrum, ab ingredientibus Croco & Aceto.

NICOLAUS Alexandrinus secundum hunc modum tradit Oxycrocei confectiōem. Alij autem qui ex eo hoc Emplastrum exscripserunt, tertiam eius partem describunt, & cum ʒ iij. in tres partes diuidere conarentur, tertiam earum partem

tem statuerunt $\bar{3}$ i. 3 iij. itaque resultat 3 i.
Nam ter tria nouem faciunt. quapropter nos ma-
luimus ex fonte haurire huius Emplastri confe-
ctionem.

¶ Prodest ossibus fractis, item partibus,
quæ dolore aliquo affliguntur, duritiem de-
nique omnem emollit, & discutit.

*Emplastrum Apostolicum, descriptio-
ne Nicolai.*

R. Lithargyrii	$\bar{3}$ vi.
Ceræ fuluæ	
Colophoniz	ana $\bar{3}$ ii.
Propoleos	
Visci quercini	ana 3 i.
Hammoniæ	
Lapis Calaminaris	ana 3 vi.
Mastiches	
Olibani	ana 3 iiii.
Mumiæ	
Terebinthinæ	
Bdelli	
Galbani	
Myrrhæ	
Aeris vsti	
Squamæ æris	
Viridis æris	
Sarcocollæ	
Distamni Cretici	
Aristolochiæ rotundæ	
Opopanaci	ana 3 iiii.
Olei veteris	lib. i.

Vini

Emplastra

269

Vini clari quantum Galbano, Hammonia-
co & Opopanaco dissoluēdis satis fuerit.
Confice secundum artem & diligēter Em-
plastrum.

PROPOLIS, non est sordes alueariorum a-
pum, sed est cera odorata, qua apes ante hyemem
foramina alueariorum obturant. Germanicē voca-
tur Bet & Nebenwax. eam apes colligunt ex ocu-
lis Populi & Betulae arborum.

V I S C U M Quercinum hic non significat li-
gnum visci quercini, sed gluten illud lentum ex vis-
co quercino extractum, quo capiuntur aues, hoc
est, der Vogelley in auß Eichenmistell gemacht.

SQVAMA Aeris est duplex, una est crassa,
que vocatur Germanicē Ruppfer Schlag, altera sa-
rina modo tenuis et ruffa, hec vocatur Kesselbraun
& est efficacior, & hic debet poni.

¶ Valet ad dolores cervicis, potissimum
& renum, sagittas ac surculos corpori infi-
xos extrahit.

**Emplastrum Apostolicum, descriptio-
ne Nicolai Alexandrini.**

R. Lithargyrii	3	xviii.
Cere rubee		
Colophonie	ana 3	vi.
Propoleos		
Visci Quercini	ana 3	iii.
Hammoniacy		
Lapis Calaminaris		
Thuris	ana 3	ii.

Mastiches

Mastiches

Mumiæ

ana 3 j. s.

Terebinthinæ

Galbani

Bdellij

Myrrhæ

Chalcucecacumeni

Sarcocollæ

Lepidos Chalci

Opopanacis

Dictamni Cretici

Aristolochiæ

Prasij viridis

ana 3 i.

Olei veteris quantum sufficit.

Vel lib. s. id est, 3 vi.

Nicolaus Alexandrinus non ponit olei pondus aut mensuram, mihi autem videntur sufficere uncie vi.

Coquatur Lithargyrium secundum artem in Oleo, donec fiat massa purpurea, & non adhereat manibus dum refrigerata tractatur, quod Græci vocant Amolintum: deinde omnia singulatim secundum artem injiciantur, Galbanum & Opopanacum in uino dissoluantur, reliqui Gummi terantur & inspergantur, Dictamnus Creticus verus solus ultimo addatur.

CHALCVCECAVMENOS, id est, Aes vstru

LEPIS CHALKV, id est, squama Aeris. Germanicè Kupfferschlag vel Kesselbraum. & efficacior est altera eius species quæ Kesselbraum vocatur.

PRASIVM viride hîc significat Aeruginem, id est, viride Aeris.

¶ Ad

Emplastra

272

¶ Ad omnia vulnera recentia siue antiqua, & ad nervos præcisos vel musculos, ad puncturas vel morsum terrestrium animalium vel maritimorum peculiariter cõgruit: educit ab eis humores & putredines intimè immerfas, & concauitates earum pura carne replet: repletisque cicatricem absque detrimento inducit. Sagittas, calamos, & similia altius membris infixæ, sine dolore extrahit.

Emplastrum album coctum.

R. Olei lib. ii.
Cerussæ lib. i. s.
Ceræ albæ ʒ iii.

Coquantur secundum artem, & fiat Emplastrum.

¶ Opitulatur excoriatis à calciamentis, scapellatione, vel ab alia causa.

Emplastrum Griseum, de lapide Calaminari.

R. Lapidis Calaminaris præparati ʒ i.
Lithargyri ʒ ii.
Cerussæ ʒ s.
Tutæ ʒ i.
Terebinthinæ ʒ vi.
Ceræ albæ ʒ i. s.
Seui Ceruini ʒ ii.
Thuris electi ʒ v.
Mastiches ʒ iii.

Myrrhæ

Emplastra

Myrrhæ 3 ii.

Camphoræ 3 i. s.

Confice secundum artem.

¶ Desiccat, replet & cicatrizat vlcera.

Emplastrum uiride.

R. Ceræ nouæ

Resinæ

Terebinthinæ ana 3̄ iii.

Olibani

Mastiches

Viridis æris ana 3̄ iii.

Confice secundum artem.

Emplastrum Basilicum magnum.

R. Ceræ albæ

Resinæ Pineæ

Seui Vaccini

Picis naualis

Terebinthinæ

Olibani

Myrrhæ ana 3̄ i.

Olei quantum sufficit, fiat Emplastrum.

¶ Vlcerā phlegmone carentia, præsertim partium neruolarum, terget, & carne implet.

Emplastrum

Emplastrum de crusta panis Montanae.

R. Mastiches
Menthæ
Spodii
Corallii rubei
Sandalorum rubeorum
Sandalii albi ana 3 i.
Crustæ panis tostæ & maceratæ in aceto per
horam mediam 3 ii.
Olei de Mastiche
Olei Cytoniorum ana 3 i.
Farinæ hordei, quantum sufficit.
Fiat Emplastrum.

¶ Valet in vomitu puerorum, & his qui cibum retinere non possunt.

Emplastrum de baccis Lauri, descriptione Mesuæ.

R. Thuris
Mastiches
Myrrhæ ana 3 i.
Baccarum Lauri 3 ii.
Cyperii
Costi ana 3 s.
Mellis colati quantum ad cogendum satis est.

SI verò triplum Cyperi & Stercoris vaccarum aut caprarum sicci ad pondus omnium accipiat, erit

erit efficacius ad hydropisim, & inflationes discutiendas.

¶ Ventriculi, intestinorum, hepatis, renum, vesicæ, vteri, & partium aliarum dolorem à flatibus aut intemperie frigida ortum placat.

C A E R O T A.

Cærotum infrigidans Galeni, ex Mesuæ.

R. Cere albæ ʒ ii.
Olei rosati Omphacini ʒ iii.

Conquassentur simul cum modico albi & clari aceti. Oleum verò Omphacinum antequàm rosas recipiat, sæpius est laudandum cum aqua fontis gelidissima, deinde confice secundum artem.

¶ Refrigerat febres ardentes, calorem hepatis, & sedat dolores capitis, circum tempora, super hepar, & per spinam dorsi linuntum.

Cærotum Sandalinum, descriptione Mesuæ.

R. Rosarum ʒ xii.
Sandali rubei ʒ x.
Sandali albi

Sandali

Sandali citrini	ana 3 vi.
Boli armeniaci	3 vii.
Spodii	3 iiij.
Camphoræ	3 ii.
Ceræ albæ	3 xxx.
Olei Rosati	lib. i.

Confice secundum artem.

OLEVM Rosatum debet fieri ex oleo acerbo, id est, ex immaturis oliuis expresso.

¶ Phlegmonas & intemperaturas omnes calidas ventriculi, hepatis, & partium aliarum potentissimè extinguit.

Cærotum Stomachale Galeni, descriptione Mesuæ.

R. Rosarum rubearum	3 xx.
Foliorum Absinthii	3 xv.
Mastiches	3 xx.
Spicæ nardi Indicæ	3 i.
Ceræ mundæ	3 iiij.
Olei rosacei	lib. i. s.

Cera & oleum aliquoties ex aqua Rosarum lauentur, & excolata omni aqua rursus ad lentum ignem resoluantur, deinde alia omnia in subtilissimum puluerem trita, inspergantur.

¶ Ventriculum & hepar roborat, horum dolorem à frigido lenit, appetentiam excitat, coctionem iuuat.

N VNGVENTA

VNGVENTA.

Vnguentum Agrippæ Regis , descriptione Nicolai .

R. Radicum Bryoniæ lib. ii.
 Radicum Cucumeris asinini lib. i.
 Scillæ lib. s.
 Ireos ʒ iii.
 Radicum Filicis
 Radicum Ebuli
 Tribulorum aquaticorum. ana ʒ ii.
 Cera albissimæ ʒ xv.
 Olei albissimi lib. iiii.

Radices omnes istæ recentes incisæ & cō-
 tussæ macerentur in oleo per dies octo , de-
 inde coquantur , postea exprimantur : & in
 colato oleo & expresso , resoluatur cera , &
 fiat vnguentum secundum artem .

*Apud Nicolaum Alexandrinum inuenitur idem
 vnguentum , sed impressi codices non habent radi-
 ces Filicis & Ebuli , & Tribulos .*

*Oportet omnes istas radices & tribulos esse re-
 centes , quod si necessitas urgeat , & non sint ad
 manus recentes , tunc sume siccatas & affunde vi-
 ni optimi lib. iij .*

*TRIBVLI Aquatici siue marini sunt vvas-
 seruasse , & ipsi fructus accipi debent .*

¶ Hydropicis , omnibusq; corporis œ-
 dematis succurrit . Neruorum mala sanat ,
 vrinam

yrinam mouet extrinsecus illitum, ventrē
subducit, dolorique renum vtile.

*Vnguentum Apostolicum, descriptione
ne Auicennæ.*

R. Terebinthinæ

Ceræ albæ

Resinæ

Hammoniæ ana 3 xliii.

Aristolochiæ longæ

Thuris masculi

Bdelli ana 3 vi.

Myrrhæ

Galbani ana 3 iiii.

Opopanacis

Floris æris ana 3 ii.

Lithargyri 3 ix.

Olei lib. ii. si fuerit æstas, in hye-
me autem lib. iii.

Aceti quantum satis est ad Hammoniacum,
Galbanum & Opopanacum dissoluenda.
Confice secundum artem.

*FLOS Aëris propriè significat grana quadam
parua, quæ a partibus aëris prosiliunt, cum refrige-
rantur affusa aqua partes aëris, hoc tamen loco so-
let poni viride aëris.*

¶ Est efficax contra vulnera & vlcera dif-
ficilia & fistulas, consumit carnem mortuā,
& consumptam restaurat, duram mollit, &
plagas sanat.

N 2 Vnguentum

Vnguentum Arogon, descriptione Nicolai.

R. Rosmarini
 Maioranæ
 Radicis Iari
 Serpylli
 Rutæ
 Rad. Cucumeris asinini ana ʒ iiij. s.
 Foliorum Lauri
 Saluæ
 Sabinæ ana ʒ iii.
 Pulicariæ maioris
 Pulicariæ minoris ana ʒ iiij.
 Radicum Bryoniæ ʒ iii.
 Laureolæ ʒ ix.
 Foliorum Cucumeris asinini
 Nepetæ ana ʒ vi.
 Mastiches
 Olibani ana ʒ vii.
 Pyrethri
 Euphorbii
 Zingiberis
 Piperis ana ʒ i.
 Adipis Vrsini
 Olei Laurini ana ʒ iii.
 Olei moschelini ʒ s.
 Petrolei clari ʒ i.
 Butyri ʒ iiij. aut quantum suffi-
 cit.

Herbx & radices Maio mense collectæ in
 oleo macerentur diebus septem, deinde co-
 quantur & colentur.

Colato

Colato oleo adice reliqua, atque adde
Cerae lib. i. $\bar{3}$ iii.

OLEVM debet esse purum & vetus. Porro au-
tores non ponunt certam mensuram Olei, quidam
iubent accipi lib. v. vel quantum sufficit. Sed tan-
tum herbarum & radicum pondus & quantitas,
non potest bullire in lib. v. olei, ideò accipe olei
lib. medicinales vi. & affunde aquae etiam aliquot
libras, & coque ad consumptionem aquae, & cola.

IARVS est vera serpentaria, pro qua ponitur
Aron recenter effossum.

PVLICARIA, id est, Conyza, Germanicè
vocatur Durrurtz, & est similis Enula campana
in folijs, caulibus & floribus. Sed multò minor
nascitur humidis locis & exiccatis aquis circa sta-
gnas.

LAVREOLA, est planta similis Thymelæa, id
est, planta in qua nascitur Coccognidium. eius lo-
co sume radices vel folia Coccognidij.

OLEVM Moschellinum inferius describetur.

¶ Prodest malis corporis frigidis, con-
uulsionibus, resolutionibus partium: item
dolori colico, renum, articulorumque.

Vnguentum Martianum, descriptio-
ne Nicolai.

R. Cerae albæ	- lib. ii.
Olei	lib. viii. aut quantum sufficit.
Rosmarini	
Foliorum Lauri	ana $\bar{3}$ viii.
Rutæ	$\bar{3}$ vii.
	N 3 Tama-

Tamarisci, foliorum scilicet

3̄ vi.

Maioranæ

Sabinæ

Balsamitæ

Saluiæ

Ocimi

Polii, videlicet veri

Calaminthæ

Artemisiæ

Enulæ

Betonicæ

Branæ vrsinæ

Spargulæ

Herbæ venti

Pimpinellæ

Agrimonie

Absinthii

Herbæ Paralytis

Herbæ sanctæ Mariæ

Cimarum Sambuci

Herbæ Crassulæ

Millefolii

Semperuiuæ

Chamædryos

Centaureæ

Centumneruæ

Fragulæ

Tetrahit

Quinquefolii ana 3̄ iiii. s.

Radicum Hibisci, id est, Althææ

Cymini

Myrihæ ana 3̄ iii.

Fœnogræci 3̄ i. s.

Butyri 3̄ i. 3̄ ii.

Vrticæ

Vrticæ
 Violarum
 Papaueris nigri
 Menthæ Saracenicæ
 Menthæ crispæ
 Lopathioli
 Polytrichi
 Carduncelli
 Matris syluæ
 Maturellæ
 Herbæ moschatæ
 Alleluia
 Lingua Ceruinæ
 Crispulæ
 Camphoratæ
 Styracis Calamitæ
 Medullæ Ceruinæ ana ʒ s.
 Adipis vrsini
 Adipis gallinacei
 Mastiches
 Thuris ana ʒ i.
 Olei nardini ʒ ii.

Herbæ omnes in Maio mense colligan-
 tur, & incisæ macerentur in vino odorifero
 per dies septem: octauo deinde die coquan-
 tur donec ferè consumatur vinum: postea
 cola, & colaturæ expressæ adde oleum, &
 coque donec consumatur vinum, mox ad-
 de Ceram & reliqua secundum artem.

*In hoc vnguento multa sunt herbarum nomina,
 quæ apud probatos autores nusquam inueniuntur:
 ideoq; aliquis non facîle eas interpretabitur.*

NICOLAUS Præpositus loco Maicranæ habet

N 4 Esbrium

Esbrium, alij autem habent utrunque. Sed non constat quid sit *Esbrium*, alij enim dicunt *Maioranam* esse, alij *Saluiam*, sed utrunque ingreditur hoc vnguentum tam *Maiorana* quam *Salvia*.

BALSAMITA, id est, *Mentha aquatica*.

BRANCA *ursina* vera, quæ *Romana* cognominatur, accipi debet, quæ habet radices longas multas, glutinosas, sapore *Tragacanthæ*. Et alio nomine vocatur *Acanthus*: quæ verò *Germanicè* vocatur *Bernklapp*, & habet *Anethi* umbellam et semina odore & sapore *Cymicum*, & nihilo minus est quàm *Branta* *ursina*: nam semper illam *Romanam* *Brantam* *ursinam* intelligunt autores omnes. est autem *urbana* & *hortensis* herba *Branca* *ursina* vera.

SPARGULA, id est, *Gallion*, *Germanicè* vocatur *RanriZen* & *Sprengelblum*, herba est densa, numerosa & conferta, & odorato flore.

PIMPINELLA, quam autor intelligit, est *Sanguisorba*, *Germanicè* *Blutsdropfflein* vocatur.

HERBA *Paralypsis*, id est, *Himelschluffel*.

HERBA *sanctæ Mariæ* secundum interpretationem omnium est *Persicaria*.

HERBA *Crassula pinguis* habet folia, nascitur in muris & tectis, *Germanicè* vocatur, *Fettehenne*, siue *Donnerkraut*.

CENTVMNERVIA, id est, *Plantago maior*.

TETRAHIT, id est, herba *Iudaica*, quam dicunt esse *Orobum*.

LUMINARIS maioris autor, *Ioannes Iacobus Manlius*, pro *Cymino* & *Myrtha* habet *Cimarum Myrthi*. Sed nescio quàm benè, non tamen improbo. Porro *Nicolai Alexandrini* impressum exemplar

plar habet Cymini et Myrthæ, sed Nicolaus Prapofitus pro Myrtha habet Myrrham, sed malè.

LAPATHIOLVM, id est, acetosa.

POLYTRICHON herba est ex speciebus capilli Veneris.

MENTHA Saratenica Germanicè vocatur Vnserfrayen mintze. Herba habet folia oblonga, Lapatio minora, in summis caulibus aureos flores in corymbis dispositos ferè vt Tanacetum, tota odoratissima est.

CARDVNCELLVS .i. herba Turcha, quam nos in Germania vocamus Carduum benedictum.

MATRISYLVA est periclymenum, Germanicè vocatur Spekelilien, ascendit arbores vt Vitis, flores habet longos, reflexos & odore Lilij. Nurembergæ in hortis colunt, cum alibi proueniat spontè in syluis.

MATVRELLA, id est, Phu, id est, Valeriana maior, impressi codices Nicolai Alexandrini non habent Maturellam sed Marathrum, id est, Fœniculum, sed malè.

ALLELVIA, id est, Trifolium acetosum, Germanicè Buchampfer vocatur.

CRISPULA quæ sit herba, non constat recentioribus, alij enim Bupthalmum, alij herbam Cæcri: sic vocant, nec indicant figuram herbæ Cancrici: ego autem ponerem eius loco Bupthalmum, id est, Cotulam maiorem, non fœtidam.

HERBA Moschata duas habet species, vna habet veluti acus longas, & est rostrum Ciconiæ, altera est parua, & non habet acus: sed est herba admodum parua, folia habet similia concava radici, id est, Holvurtz, odorem habet in Maio mense Musci. nascitur vmbrosis locis iuxta concavam radi-

N S cem.

cem, id est. Holvurt ζ , in Maio tantum reperitur.
Germanicè vocatur Bisem Kraut.

CAMPHORATA est Abrotonum, quia odore
accredit ad Camphoram. quidam dicunt esse Abro-
tonum sylvestre siue album, sed perinde est, effica-
cius tamen est vulgare Abrotonum.

NICOLAUS Alexandrinus paulò aliter descri-
bit hoc vnguentum, ut codices impressi ostendunt.
ideoq; & eius modum subiungemus, nam variatur
ponderum ordo & quantitas.

¶ Aduersus frigida corporis mala, reso-
lutionem coxendicum, nephritim, conuul-
sionem, & id genus alia valet: tumores re-
primit, durities emollit, liuoremque cutis
emendat.

Vnguentum Martianum magnum, de
scriptione Nicolai Alexandrini.

R. Cerae albæ lib. ix.

Olei sextarios vi.

Rosmarini

Foliorum Lauri ana lib. ii. s.

Amaraci

Esbrii

Sabinæ

Balsamitæ

Ocimi

Elei sphaci, id est, Saluiæ

Polii, scilicet veri

Calaminthes

Artemisiæ

Enulæ

Betonicæ

Vnguenta

285

Betonice
 Brancæ vrsinæ
 Herba venti
 Pimpinellæ
 Argemoniæ
 Absinthii
 Herba paralyfis
 Herba sanctæ Mariæ
 Cimarum Sambuci
 Herba Crassulæ
 Semperuiuæ
 Millefolii
 Chamadryos
 Centaureæ
 Centumneruæ
 Fragulæ
 Quinquefolii
 Herba Tetrahit ana lib. i. s.
 Radicis Eulsci
 Cymini
 Myrthæ ana lib. i.
 Fœnogræci lib. s.
 Butyri ʒ v.
 Vrticæ
 Violarum
 Papaueris rubei
 Menthæ Saracenicæ
 Menthæ alterius, id est, Menthæ crispæ sa-
 tiuæ
 Lapathioli
 Polytrichi
 Carduncelli
 Matris syluæ
 Marathri

N 6 Herba

Herbæ Moschatæ

Alleluiæ

Linguæ Ceruinæ

Crispulae

Camphoratæ

Styracis

Medullæ Ceruinæ

Adipis Vrsini

Adipis Gallinacei

Thuris

Olei Nardini

ana 3 iii.

3 ii.

3 i.

Confice hoc modo. Herbas omnes atque radices in fine Maij mensis, vel circa Solstitium æstiuum collectas minutim incisus in vini sufficienti quantitate macerato per dies septem. octaua deinde die coquantur lento igne donec propemodum vinum sit consumptum, postea cola & exprime, & affunde colaturæ expressæ, olei prædictas lib. viii. & 3 iii. & iterum coque donec omnis aqueus herbarum succus cum vino in vaporem resolutus fuerit: deinde adde ceram in partes confractam, & paulò post Adipes, Butyrum, atque oleum Nardinum, ad ultimum verò Storacem, Calamintham atque Thus in minutissimum puluerem trita: melius tamen esset optimam & electam Styracem, & puram instar resine alicuius. vnà cum cera indere, nam liquefit in oleo. Sed talis Styrax Calamita rarissimè ad nos affertur. Porro miror in hoc vnguento quòd tam parum olei, tot herbarum libris addatur, præterea etiam optimæ vires aromaticarum herbarum in coctura evanescent.

Ita se habet vnguenti huius compositio secundum impressum Nicolai Alexandrini exemplar.

SEXTARIUS

SEXTARIUS mensura est Romana qua capit mensurales uncias viginti olei, pondere vero habet olei uncias sedecim, drachmas quinque, scrupulum unum. Sex autem Sextary olei, faciunt in hoc vnguento lib. viij. 3 iiij.

ESBRIVM quidam dicunt esse Maioranam, quidam flores Salvia: ego autem acciperem pro Esbriio Maiorana capitula, summitates, & flores.

AMARACVM, ego hic non credo significare Matricariam, quam etiam Maioranam possumus intelligere, nam utraque amaracus vocatur: si autem Maioranam inieceris, multo odoratius vnguentum fiet, quam si Matricariam addideris.

HERBA venti, id est, parietaria vera.

PIMPINELLA, hic non significat Germanicam Pimpinellam acris radice, quam Itali vocant Saxifragiam: sed eam, quam Itali vocant Sanguisorbam, Germani Blutstropffley. Radicem habet rubram Tormentillae sapore. nascitur in pratis una eius species, altera in montibus, & Itali acetarijs miscent, habetq; Cucumeris odorem.

QVIDAM non habent Cyminum, sed Cymas Myrthe: est autem Myrtha idem quod Myrthus. Alij habent Myrrham, sed malè.

PRO Papauere rubeo habent alij Papauer nigrum: est autem rubeum Papauer idem quod agriste Papauer in agris nascens.

MARATHRVN, id est, Fœniculum. Porro ego hunc locum Nicolai Alexandrini credo esse corruptum, & censeo pro Marathro legendum esse Maturellam, id est, Phu maius, cuius radices accipi debent.

Lingua Cervina est herba, qua hodie improprie Scolopendria nominatur.

¶ Ad

¶ Ad frigiditatem & dolorem capitis, pe-
 ctoris & stomachi, ad sciron hepatis & sple-
 nis, ad ilii dolorem, ad paralyticos, arthri-
 ticos, ischiaticos, nephreticos, & podagri-
 cos, & ad omnes dolores, ad tumores, du-
 ritiem, spasmus, & febrientes, & ad ignem
 vel solem inunctum.

*Vnguentum Martianum paruum, de-
 scriptione Nicolai Alexandrini.*

R. Foliorum Lauri lib. iii.
 Rutæ lib. ii. s.
 Amaraci, id est, Maioranæ lib. ii.
 Rosmarini lib. i. s.
 Foliorum Myrthæ lib. i.
 Esbrii (accipe summitates Maioranæ pro
 Esbrio)
 Balsamitæ
 Ocimi ana ʒ vi.
 Butyri ʒ v.
 Styracis
 Medullæ Ceruinæ
 Adipis Ursini
 Adipis Gallinacei ana ʒ iii.
 Maltiches ʒ iii.
 Thuris ʒ ii. s.
 Olei Nardini ʒ i.
 Olei Oliuæ
 Cera mundissimæ ana quantum sufficit.
 Ego Olei acciperem lib. vi.
 Cera verò lib. iiii.
 Si verò duriusculum sit, detrahe aliquid
 de Cera. Porro hoc quoque vnguentum
 conficies.

conficies vt proximum .

MYRTHA, id est, Myrtus: sunt autem accipienda folia veræ Myrti, quæ ex Italia afferuntur, & non eius plantæ, quam vocamus Germanice Heydelber.

¶ Ad podagram frigidam siue calidam, paralyticos, arthriticos, nephreticos, ichiadicos, & ad omnia vitia & dolores nervorum valet.

Vnguentum album.

R. Cerussæ in aqua rosarum lotæ ℥ xvii i.

Lithargyrii albi loti ℥ i. s.

Olei Rosati lib. ii. ℥ iii.

Ceræ albissimæ ℥ vi. aut circiter.

Confice secundum artem.

Quidam alia ratione componunt hoc vnguentū, nam alii addunt albumina Ovi, alii non addunt Lithargyrium, alii non Ceram sed Tragacanthum admiscunt.

¶ Pollet aduersus ulcera, scabiem, et adustionem.

Vnguentū Dialthæa simplex, descriptione Nicolai.

R. Radicum Althææ lib. ii.

Seminis Lini

Seminis Fœnogræci ana lib. i.

Olei lib. iiii.

Ceræ

Cera lib. i.

Terebinthinæ ʒ ii.

Resinæ ʒ vi.

Radices & semina contusa macerentur
tribus diebus in aquæ lib. viii. aut quantum
sufficit: quarta die coquantur donec remit-
tant crassam & viscosam mucilaginem, eam
deinde exprime. mox

R. Expressæ mucilaginis lib. ii. & coque cū
oleo: cū deinde aquosum illud in mucila-
gine consumptum fuerit, ceram addito, &
fac secundum artem.

¶ Emolliēdi vim habet, calefacit, & hu-
meſcat.

*Vnguentum Dialheæ compositum, de-
scriptione Nicolai.*

R. Radicis Altheæ lib. ii.

Seminis Lini

Seminis Fœnogræci ana lib. i.

Scillæ recentis ʒ vi.

Olei lib. iiii.

Cera lib. i.

Terebinthinæ

Gummi Hederæ

Galbani ana ʒ ii.

Coloponiæ

Resinæ ana ʒ vi.

Radices & Lini semen contusa maceren-
tur tribus diebus in sufficienti quantitate
aquæ, deinde coquantur donec crassescat
mucilago.

mucilago. Postea

R. Mucilaginis expressæ lib. ii. & adde reliqua, & fac secundum artem vnguentum.

¶ Valet propriè ad dolorem pectoris ex frigiditate & pleuresi, & super pectus inunctum sanat omnia loca, in frigidata callefacit, mollificat, & humectat.

Vnguentum Aegyptiacum, descriptione Mesuæ.

R. Aeruginis ℥ v.

Mellis optimi ℥ xiii.

Aceti fortis ℥ vii.

Coquantur omnia simul; donec fiat vnguentum spissum & colore purpureum.

AER VGO est viride aru.

¶ Confert ad vulnera antiqua, fistulas; extergit, carnis excrescentiæ medetur, vehementerq; exiccat.

Vnguentum Aureum, descriptione Mesuæ.

R. Ceræ citrinæ ℥ vi.

Olei boni lib. ii. s.

Terebinthinæ ℥ ii.

Resinæ

Colophonix ana ℥ i. s.

Thuris

Mastiches ana ℥ i.

Croci 3 i.

Confice secundum artem.

¶ Vulnera

¶ Vulnera certò & salubriter glutinat.

Vnguentum Citrinum, descriptione Nicolai.

R. Boracis	℥	ii.
Camphoræ	3	i.
Corallii albi	3	iiii.
Amenti dulcis	3	i.
Vmbilici marini		
Tragacanthæ albissimæ		
Amyli		
Cryſtalli		
Enthali		
Dentalii		
Thuris albissimi		
Nitri ana	3	iii.
Marmoris albi	3	ii.
Gersæ serpentariæ	3	i.
Cerussæ	3	vi.
Axungię porcine recentis non salitæ, sed præparatæ & mundatæ	lib.	i. s.
Sæpi Caprini præparati	℥	i. s.
Adipis Gallinacei præparati	℥	i.

Confice sic. Axungiam porcine atque adipem Gallinaceum liqua simul, & impone tepidis adhuc, corticum Citrei mali satis magnam quantitatem, & macerentur per mensem vnum. Postea eximito cortices & eliquati porcini adipis, R. vt dictum est lib. i. s. Adipis Gallinacei ℥ i. & adde Seuum Caprinum, deinde addantur reliqua tenuissimè trita, ultimo verò insperge Camphoram subtilissimè tritam.

Notandum

Notandum est in hoc vnguento non concordare exemplaria in ponderum characteribus. Nam qui dam pro 3 ponunt 3 & e contra.

BORAX est nitri species, qua aurum feruminant auri fabri.

AMENTVM dulce est Gypsum, quod in capillatas venas scinditur.

VMBILICI Marini, lapilli sunt inuenti in littore maris, figura Fabarum magnarum. Germanicè vocantur Merbonen.

ENTHALIVM testaceum quiddam est marinum, Fistula modo longum & concauum, foris strictum longitudine digiti parui.

DENTALIVM conchula marina est parua, dentatam rimam habens.

NITRYM est Sul petre.

GERSA Serpentaria, est radix Serpentaria vera preparata, vt infra ostendemus.

¶ Faciei maculas emendat, scabiē in qua cūque corporis parte exterit, cicatrices extenuat, ruborem oculorum aufert, & ea quę aspera sunt læuigat.

Vnguentum populeum, descriptione Nicolai.

R. Oculorum Populi arboris recentium lib. i. s.

Axungie porcine præparatæ lib. ii.

Oculi populi contundantur & macerentur in axungia, donec sequentes herbæ colligiqueant astatæ.

R. Foliorum Papaueris agrestis

Foliorum

Foliorum Mandragoræ
 Cimarum Rubi tenerimarum
 Foliorum Hyoscyami
 Solatri
 Vermicularis
 Lactucæ
 Semperuiuæ maioris
 Bardanæ
 Violariæ
 Scatuncelli ana ʒ iii.

Herbæ contendantur & misceantur oculis Populi; & axungia, & dimittantur per dies x. deinde coquantur supra lentum ignē in vini odorati sufficienti quantitate, donec vinum consumatur: postea colentur & exprimantur, & expressum vnguentum reponatur.

MANDRAGORAE folia ubique haberi non possunt, ideo duplex pondus foliorum Hyoscyami sumendum est.

VERMICULARIS vera est Semperuiua minor, linguam non mordicans.

BARDANA, id est, Lappa maior, cuius radicem præcipit esse accipiendam Nicolaus Alexandrinus.

SCATVNCELLVM, re vera est umbilicus Veneris seu Cymbalaris, & non Krentz krant. Folia habet pingua concaua vt Cymbalum, radicem Aroni simile, perquam pauci eam cognoscunt.

¶ Contra nimium calorem valet, & temporibus illitum somnum conciliat.

Vnguentum

Vnguentum Fuscum, descriptione Nicolai.

R. Olei lib. i. s.
Cere nouæ ʒ iii.
Colophonie
Picis naualis
Sagapeni ana ʒ ii.
Mastiches
Galbani
Thuris
Terebinthinæ ana ʒ i.
Confice secundum artem vnguentum.

¶ Sanandi vim habet & extrahendi.

Vnguentum Diapompholygos, descriptione Nicolai Alexandrini.

R. Olei Rosacei
Cere albæ ana ʒ vi.
Succi fructus vuae lupinæ quantum sufficit
Cerussæ ʒ ii.
Plumbi viti & loti
Pompholygis
Thuris puri ana ʒ i.
Confice secundum artem.

DIAPOMPHOLYGOS, id est, de Nihili albo. Nam Pompholyx est Nihili album, id est, Gel meissuz.

VVA LVPINA, id est, Solanum, sine Solanum.

¶ Ad

¶ Ad exiccanda erysipelata, vulnera sordida, & ad sananda tibiæ ulceræ, aliorumque locorum concava vel dissipata replet, refrigerat, & cicatrizat.

*Vnguentum Comitissæ, descriptione
Gulielmi de Varignana.*

R. Corticum medianorum Castanearum
Corticum medianorum Glandium
Corticis mediani Quercus arboris
Myrtillorum
Caudæ Equinæ
Gallarum
Corticum Fabarum
Acinorum Vuarum;
Sorborum immaturorum siccorum
Mespilorum immaturorum siccatorum
Foliorum Pruni sylvestris
Radicum Chelidonis ana $\bar{3}$ i. s.

Contundantur aliquantulum & coquantur in aquæ plantaginis lib. viii. aut quantum sufficit, donec media pars consumpta fuerit; deinde in colatura lauentur sequentia, novem vicibus semper recentem aquam decoctionis affundendo quotiescunque laueris.

R. Cere novæ $\bar{3}$ viii. s.
Olei Myrtillorum
Olei Mastichini ana lib. i. s.
Postea insperge sequentium rerum tenuissimum pulverem

R. Corticis mediani Castanearum
Corticis mediani Glandium

Corticis

Vnguenta

297

Corticis mediani Quercus arboris

Gallarum ana $\bar{3}$ i.

Cineris ossium cruris bubuli

Myrtillorum

Acinorum Vuarum

Sorborum siccorum ana $\bar{3}$ s.

Trochiscorum de Charabe $\bar{3}$ ii.

Confice secundum artem vnguentum.

ACINI hic significant lignea semina, quæ sunt in vis.

SORBA sunt fructus similes Mespilis, Germanicè vocantur Sporling, Sporbirn, Sporepsel & Drecksecke.

PRUNVS Sylvestris, id est, Schlehendorn.

¶ Inceptum abortum prohibet, hæmorrhoides sistit, ac laxatos renes conciliat.

Vnguentum de Artanita maius, descriptione Mesuæ.

R. Succi Artanitæ lib. iii.

Succi Cucumeris asinini lib. i.

Olei Irini lib. ii.

Butyri Vaccini lib. i.

Pulpæ Colocynthidæ $\bar{3}$ iii.

Polypodii $\bar{3}$ vi.

Euphorbii $\bar{3}$ s.

Arida omnia contundantur & macerentur in succis per dies viii. affuso etiam oleo in vase vitreo diligenter obturato, nona deinde die coquantur lento igne aliquandiu, postea colentur. Colaturæ adde.

Saga-

Sagapeni in aceto dissoluti aureos v.

Myrrhæ aureos ii.

Coquantur iterum vsque ad consumptionem succorum . postea adde

Ceræ $\bar{3}$ v.

Fellis Taurini aureos v.

Ferueant simul donec lique scat Cera . postea insperge sequentium rerum tenuissimū puluerem .

R. Scammonæ

Aloes

Mezereon

Colocynthidæ ana aureos v.

Euphorbii aureos ii.

Salis gemmæ aureos iii.

Turbith aureos v.

Piperis longi

Zingiberis

Camomillæ ana aureos ii.

Confice secundum artem .

Omnia ferè exemplaria habent Colocynthida ana aureos v. meus autem manu scriptus Mesua habet aureum i. quod magis probo, sed textum nolui immutare.

ARTANITA est Cyclamen siue Cyclaminus: quidam malè vocant panem porcinum . Si radices eius non adsunt recentes, tunc accipe radices eius siccatas circiter lib. vi. contendantur & coquantur in aqua & eliciatur succus, ut ex Glycyrrhiza fit.

¶ Illitum Stomacho, vomitum purgat: hypogastrico autem inunctum, aluum deiecit, ob id

Ob id hydropicos mirè iuuat, seorsum ex-
crementum largè vacuando, vermes quo-
que necat, & educit: adhibetur non poten-
tibus sumere medicamentum purgans.

*Vnguentum de Artanita minus, descrip-
tione Mesuæ.*

R. Succi Artanitæ
Viscositatis quæ exprimitur è radice filicis
Succi Cathengit ana $\bar{3}$ ix.
Succi extremitatum Tamarisci $\bar{3}$ ii.
Oesypi humidæ $\bar{3}$ v.
Olei Irini lib. ii.
Bdellii
Hammoniæ ana $\bar{3}$ i. s.
Aceti quantum satis est ad hammoniacum
dissoluendum.
Cere citrinæ $\bar{3}$ vi.
Corticum radicum Capparis $\bar{3}$ i. s.
Spicæ $\bar{3}$ iii.
Confice secundum artem vnguentum.

*FILIX non significat Polypodium, sed cam
herbam quæ Germanicè vocatur vvaltsfaren &
Creutzfaren.*

*CATHENGIT significat Ebulum, est autem
vocabulum valde corruptum in plurimis exempla-
ribus.*

*OESYPVS, id est, Hysopus humida, & est
pinguedo lanarum succidarum.*

¶ Splenis humores etiam scirrhosos dis-
solvit, & strumas.

O Vnguentum

Vnguentum potabile.

R. Butyri recentis sine sale lib. iii.
 Rubæ tinctorum
 Castorei
 Spermatidis Ceti
 Tormentillæ ana ʒ i.

Bulliant simul in vino odorifero ad vini
 consumptionem, ac fiat vnguentum secun-
 dum artem.

¶ Datur ad consolidandum casum ex alto.

*Vnguentum Rosatum, descriptione
 Mesuæ.*

R. Axungie porcine recentis quantitatem
 quam volueris, & lauetur in aqua calida, &
 tantundem cum aqua frigida lotionem vlti-
 ma: deinde teratur cum ea rosarum rubea-
 rum æquum pondus, dimittantur marcesce-
 re per dies septem, postea coquantur cum fa-
 cilitate ac percolentur, & rursus tantundem
 rosarum rubearum teratur & dimittatur per
 alios dies septem marcescere, atque adfun-
 datur succi rosarum pars dimidia, olei Amyg-
 dalini partes vi. & rursus concoquantur
 cum facilitate dum succi euanescent. quod si
 parum Opii in aqua rosarum coliquatum in-
 ter decoquendum iniicitur, fit efficacius.

¶ Phlegmonas, erysipelata, herpetas, se-
 dat: cephalalgiam calidam & ventriculi ac
 hepatis intemperiem calidam mitigat.

Vnguentum

Vnguentum pectorale.

R. Mucilaginis feminis Psyllii
Tragacanthæ
Gummi Arabici
Seminis Lini
Fœnogræci ana 3 j.
Adipis Gallinæ
Medullæ Vituli
Butyri recentis loti cum aqua violarum
ana 3 j. s.
Olei Violati
Olei amygdalarum dulcium ana 3 j.
Ceræ albæ quantum sufficit. fiat vnguentū.

¶ Mitigat dolores pectoris & tussim: digerit, maturat, faciliat sputum, & resoluit pleuresim.

Vnguentum album Caphuratum.

Olei rosati lib. j.
Ceræ albæ 3 iii.
Cerussæ 3 xii.
Albi ouorum numero vi.
Caphuræ dissolutæ cum aqua rosarum ex
arte 3 ii.
Fiat vnguentum secundum artem.

Vnguentum rubeum Caphuratum.

R. Olei rosati lib. i. s.
Lithargyrii 3 ii.
O 2 Minii

Minii

℥ iii.

Cerussæ

℥ j. s.

Tutiæ

Caphuræ

ana 3 iii.

Ceræ

℥ ii.

in æstate : sed in hye-

me

℥ i.

Fiat vnguentum in pila plumbea cum pistillo plumbeo.

OLEA.

Oleum ex ligno Iuniperi.

Fictile vas in foveam ponatur, supra id aliud fictile angusti orificij inuersum ponatur, recentibus Iuniperi lignis minutimq; incisis plenum, cui subducatur lamina ferrea foraminibus peruia, ut destillet liquor, & ne ligni segmenta delabantur: bene autem aptentur & luto sapientiæ circumlinantur fictilium orificia, ne quidquam expiret. Postea inferius fictile vsque ad collum superioris obruito terra, & facto pavimento ignem circa & supra fictile superius accedito, atque ardere finito aliquot horas. Postremo liquorem qui destillauit, auferto. Cuius vsus est in purgandis sordidis vlceribus.

¶ Emēdat cutis infectiones, serpiginem, cancrum, vlcera maligna, qualia quæ in tibis, & cruribus quorundam: malum mortuum recentiores vocant.

Oleum

Oleum ex Iuniperi baccis.

*Oleum è Iuniperi baccis elicitur per artem destil-
landi, ut vinum sublimatum: quia verò minoris
emitur, quam ut ab aliquo pharmacopola præpa-
rari queat, confectionem eius non indicabimus.*

*Oleum Nardinum simplex, descriptione
Mesuæ.*

R. Spicæ nardi aromaticæ ʒ iii.

Vini

Aquæ ana ʒ ii. s.

Olei Sesamini lib. i. s.

Coquantur in duplici vase donec vinum
& aqua in vaporem resoluantur, coletur
deinde oleum, & colatum reponatur abie-
cta Nardi spica.

V A S duplex, Græcè vocatur **DIPLOMA**
constat duobus crateribus, altero alteri imposito, ita
in vnum aromata & oleum coniungantur, in alte-
rum verò aqua fundatur, quæ subiectis prunis ca-
lescens suo tempore, unguenta & olea decoquit: est
autem hoc notandum in omnibus aromaticis oleis,
quæ decoquuntur.

¶ Calefacit, tenuat, digerit, modicè ad-
stringit proinde affectus omnes frigidos &
flatulentos cerebri, ventriculi, hepatis, lie-
nis, renum, vesicæ, vteri, magnoperè iu-
uat: naribus iniectum caput purgat, corpo-
ris colorem & odorem commendat.

O 3 Oleum.

*Oleum Nardinum compositum, de-
scriptione Mesuæ.*

R. Spicæ Indicæ ℥ iii.
Sampsuchi, id est, Maioranæ ℥ ii.
Xyloaloes

Enulæ

Folii Indi

Calami aromatici, eius loco sumatur

Galanga

Foliorum Lauri

Cyperii

Schœnanthi

Cardamomi ana ℥ i. s.

Contundantur omnia grosso modo. de-
inde affunde illis

Aquæ fontanæ

Vini ana quantum sufficit, id est, circiter
℥ xiiii. ana.

Olei Sesamini lib. iiii.

Macerentur per noctē, deinde coquantur
in Diplomate, id est, duplici vase, secun-
dum artem.

*Pro Folio Indo, recipe Spicæ Romanæ radicis
Macis ana 3 vi.*

*Oleum Costinum, descriptione Me-
suæ.*

R. Costi optimi & veri ℥ ii.

Cassie, aut succedanei eius ℥ i.

Summitatum Sampsuchi ℥ viii.

Vini

Vini quantum sufficit.

Olei Sefamini lib. iii.

Macerentur duabus noctibus, deinde coquantur in duplici vase secundum artem.

CASSIA Aromatica vera & Cinnamomo similis accipi debet.

¶ Calfacit, obstructa aperit, nervosum genus roborat, ut nervos, musculos, tendones, ligamenta, ventriculum. Præter hæc, hepar & capillos, canitiem ob id moratur, & corporis colorem ac odorem commendat.

Oleum de Piperibus, descriptione Mæ sue.

R. Macropiperis, id est, longi
Melanopiperis, id est, nigri
Leucopiperis, id est, albi ana ʒ iii.
Myrobalanorum Chebulatorum
Myrobalanorum Belliricorum
Myrobalanorum Emblicorum
Myrobalanorum Indarum ana ʒ v.
Radicum Apii.
Radicum Fœniculi ana ʒ iii. s.
Sagapeni
Opopanacis
Hyoscyami albi ana ʒ ii. s.
Turbith albi ʒ xii.
Zingiberis ʒ iii.
Caulis foliorum recentium
Thymi viridis

℞ 4 Rutæ

Rutæ viridis ana M i.

Coquantur secundum artē in aquæ quantitate sufficienti ad tertias. Colaturæ adde olei de Cherua lib. ii. & iterum coque ad consumptionem aquæ.

¶ Iuuat morbos neruorum frigidos, vt paralytim, spasmus, spasmus cynicum, tremorem, epilepsiam: adhæc ischiadem, & cæteras arthritidis differentias, & vteri, coli, renum, vesicæ affectus frigidos, quia calefacit, tenuat, terget: ob id obstructions aperit, calculum frangit.

Oleum Mandragoræ, descriptione Nicolai.

R. Olei communis lib. ii.
 Succⁱ pomorum Mandragoræ ʒ iii.
 Succⁱ Hyoscyami albi ʒ ii.
 Succⁱ capiti Papaueris nigri ʒ iii.
 Succⁱ Violarum
 Succⁱ Cicutæ tenerrimæ ana ʒ i.
 Opii
 Styracis Calamitæ ana ʒ s.

Succi cum oleo decem diebus ad solē macerentur, deinde coquantur secundum artem ad consumptionem aquei.

Non habentur apud nos Mandragora poma, ergo loco succi Mandragora pomorum accipe infra scriptam decoctionem. R. Radicum Mandragoræ, id est, Corticum radicum eius lib. i. contundantur & coquantur in aqua sufficienti, & colatum.

rum decoctum succis adde.

NICOLAUS Alexandrinus paulò aliter describit hoc oleum, ut Latini impressi codices ostendunt, ideo etiam eius placita adscribere visum est.

¶ Ad nimios dolores capitis valet, & phreneticis malè dormientibus fronti illitū, & naribus iniectum vehemēter opitulatur: pulsibus brachiorum & plantis pedum illitū quocunque modo vigilijs fatigatum, celerimè obdormiscere facit.

Oleum Mandragoræ, descriptione Nicolai Alexandrini.

R. Olei	lib. v.	
Succi malorum Mandragoræ	℥ viii.	
Succi capitum Papaveris hortensis	℥ vi.	
Succi Hyoscyami albi	℥ iiii.	
Succi Violarum		
Succi Cicutæ tenerrimæ	ana ℥ ii.	
Opii		
Styracis	ana ℥ i.	

Confice sic. misce simul omnes succos oleo atque in vitreo vase obstructo orificio, soli exposito per decem dies, vndecimo die coquantur in duplici vase usque ad consumptionem succorum, deinde ubi refrigerari cœperit, cola, &colato oleo adde Styracem & Opium, & confice secundum artem.

STYRAX quidem syncerus & purus facilè in oleo dissolvitur.

○ 5 OPIVM

OPIVM verò syncerum in oleo dissolui non potest, igitur tenuissimè tritum inspergatur oleo & saepe misceatur, nam si in aqua aut vino dissoluatur, non commiscebitur oleo.

Oleum Mastichinum, descriptione Mesue.

R. Olei Rosacei ℥ xii.
Vini odoriferi ℥ iii.
Mastiches electæ ℥ iii.

Coquantur secundum artem vsque ad consumptionem vini.

¶ Cerebrum, neruos, iuncturas, ventriculum, hepar corroborat: tumores duros lenit, dolores sedat.

Oleum de Euphorbio, descriptione Mesue

R. Euphorbii ℥ s.
Olei Cheyrini ℥ v.

Vini odoriferi tantundem, coque secundum artem, vsque ad consumptionem vini.

¶ Iuuat maximè frigidus cerebri & neruorum affectus, cephalalgiam, hemicraniam, lethargum, naribus immixtum: articulorum quoque & hepatis, & splenis dolores, illitum iuuat.

Oleum

*Oleum Castorei, descriptione Iacobi de
Manlijs.*

R. Castorei
Styracis calamitæ
Galbani
Euphorbii
Cassia lignæ veræ
Croc
Opopanaci
Carpobalsami (aut succedanei eius)
Spicæ nardi Indicæ
Costi ana 3 ii.
Cyperi
Schœnanthi
Macropiperis
Melanopiperis
Sabinæ
Pyrethri ana 3 ii. s.
Olei lib. iii.
Vini odoriferi lib. ii.

℞ Confice sic: Galbanum & Opopanacum
in vino seorsim dissolue: deinde reliqua om-
nia contusa cum oleo & vini lib. ii. co-
quito ad consumptionem vini in duplici va-
se, postea cola & dissolutum & expressum
Galbanum cum Opopanaco oleo adfunde,
& iterum coque ad consumptionem vini,
& repone sæpius miscēs in posterum vt Gal-
banum & Opopanacum in vasis fundo sub-
sicens, oleo commisceatur.

¶ Est optimum contra omnes ægritudi-
nes frigidas, præsertim neruorum & iūctu-
rarum:

rarum, medetur paralyfi, spafmo, tetano,
& sedat acerrimos rigores, & frigora febriliū,
fi fпина dorsi liniatur.

*Oleum Scorpionum simplex, defcri-
ptione Mefuæ.*

R. Scorpiones numero xxx.

Olei Amygdalarum amararum lib. ii.

Macerentur in vafe vitreo ftricti orificii
per dies xxx. caniculares ad solem, vel aliās
tota æstate calidiffimis diebus, poftea cola-
tum ad ufus reponere.

¶ Lapidem renum & veficæ frāgit & ex-
pellit, lumbis, pubi, perinæo illitum, aut
per meatum vrinarium iniectum.

*Oleum Scorpionum compofitum, de-
fcriptione Mefuæ.*

R. Radices Aristolochiæ rotundæ

Gentianæ

Cyperī

Corticum radicum Capparis ana ʒ i.

Olei Amygdalarum amararum lib. i. s.

Macerentur in oleo contufæ radices ad
folem feruidum diebus xx. deinde coquan-
tur aliquantulum in duplici vafe iniectis ad
vltimum fcorpionibus numero xv. poftea
iterum ferenis diebus xxx. ad solem mace-
rentur, poftremo excolatum oleum repo-
natur.

ARISTOLOCHIA

ARISTOLOCHIA rotunda non est Holvurtz,
sed radix lutei coloris, odore & sapore Aristolo-
chia longa, affertur ex Italia.

¶ Valet contra venena, & pestilentiam.

*Oleum Formicarum, descriptione Ni-
colai.*

R. Formicarum alatarum quantum uis,
Olei quantum sufficit.
Macerentur æstate ad solem diebus XL.
postea excolatum oleum repone.

¶ Valet ad confortandum coitum.

Oleum Lumbricorum terrestrium.

R. Vermium terræ lib. s.
Oleum Oliuarum lib. ii.
Vini 3 ii.
Bulliant omnia simul, & fiat oleum, dein-
de percoletur & reseruetur.

¶ Neros infrigidatos confortat, & uti-
le est doloribus iuncturarum.

*Oleum Vulpinum, descriptione Me-
sue.*

R. Vulpem detracta pelle, & abiectis inte-
raneis, incidatur in partes & coquatur in
Aquæ Fontanæ
Aquæ Marinæ ana lib. i. s.

Olei

Olei veteris clari lib. iii. \bar{z} ix.

Salis \bar{z} iii.

Inter coquendum adice

Anethi

Thymi ana lib. i. boni ponderis.

Coquantur autem quousque ab ossibus recedat caro, & aqua consumatur, deinde coletur oleum, & excolatum ad usus suos reseruetur.

*Qui prope mare non habitant, sumant aquam sal-
salam, id est, Muriam, siue aquam fontium sal-
sorum, ubi salinae fuerint. Porro ad coquendam
vulpem non sufficiunt lib. iij. ideo accipe quantum
abunde satis fuerit, & fortiter vltimo oleum ex-
prime.*

¶ Ad podagras, reliquasque arthritidis
species, ac dorsi, renumque dolorem est ef-
ficacissimum.

Oleum de Cappare.

R. Corticis radicum Capparis \bar{z} i.

Corticum Tamarisci

Foliorum Tamarisci

Seminis Agni casti

Scolopendriae, id est, asplenii

Cyperii ana \bar{z} ii.

Rutae \bar{z} i.

Aceti

Vini optimi ana \bar{z} ii.

Olei maturi lib. i.

Coquantur in duplici vase vsque ad con-
sumptionem vini & aceti.

¶ Valet

¶ Valet duritiei, oppilationi, & dolori splenis, ac omni eius ægitudine.

*Oleum de Lateribus, descriptione Mæ-
sue.*

R. Laterem aut tegulam ruffam antiquissi-
mam ex ruffo luto ductam, eam confringe
in frustra mediocria, & in prunis vrito do-
nec tota excanduerint, deinde è prunis exē-
pta fragmenta restinguito in oleo claro ve-
teri, & dimittito quousque se oleo impleue-
rint: postea oleo exempta in tenuissimum
pulverem contundito, atque in Retortam
aut Cucurbitam vitream indito, & secundū
artem luto chymistico iuncturas vitrorum
claudito, & subtus accensis prunis oleum
elicitum & elicito reponito. ●

¶ Conuenit omnibus morbis frigidis.
Est enim calidum penetratiuum, resoluti-
uum: mollit dura, & discutit tumida: opi-
tatur his qui patiuntur epilepsiam, verti-
ginem, obliuionem, paralysem, spasmum,
dolorem dorsi, genuum, podagram, vel a-
lios iuncturarum & neruorū morbos: me-
detur spleni, vesicæ & renibus.

Oleum Terebinthinæ.

R. Resinæ Terebinthinæ aut Laricinæ, quā
in Germania Terebinthinam vocamus lib.
iiii. eam pone in capacem Retortam, siue
Cucurbitam vitream, & per artem destilla-
toriam

toriam elice eius oleo, ita vt Cucurbita aut Retorta arenæ imponatur. primò autē cum aqua exhibit oleum tenue & clarum, secundò aurei coloris, vltimò fuscum & crassum : horum vnumquodque per se auferto & reponito .

¶ Confert omnibus ægreditudinibus frigidis, & maximè neruorum .

Oleum Tartari .

R. Tartari puri lib. iiii .

Pone in ollam & vre in fornace cum lateribus aut tegulis aut fictilibus, vel per se donec omnino excandescat Tartarum . Postea impone in sacculum laneo panno factū, & suspende in cellario, tum destillabit ex eo clarus quidam liquor, quem repone . Porro re vera hic humor non est oleum, sed acerrima aqua .

¶ Valet ad faciem tergendam, & erugandam .

Oleum Citoniorum, descriptione Mesue .

R. Citoniorum non excorticatorum quantum sufficit, id est partes conuenientes, videlicet quantum libuerit .

Succi Citoniorum quantum sufficit .

Incidito Citonia & impone in vas vitreū, & affunde succum. Affunde etiam oleū Omphacinum,

phacinum, hoc est immaturum, vt excedat eius quantitas succi mensuram. Postea strin-
ge vasis orificium, & ad Solem omnia mace-
ra aut in æstuario diebus quindecim: deinde
coque in duplici vase, & abiice posthac Ci-
tonia & adde recentia, & rursus macera &
coque: inde etiam tertio recentia Citonia
imponere, & prædicto modo omnia pera-
ge, tum repone diligenter obstructum, ne
expiret.

*Hodie tanta diligentia non fit hoc oleum. igitur
rogo vt maiorem diligentiam impendant.*

¶ Est optimum contra debilitatem sto-
machi, vomitum & fluxum: sistit sudorem,
restaurat resolutionem, lapsas vires, corro-
borat neruos, & vires, confortat digesti-
uam.

Oleum Sampsuchinum.

R. Foliorum Sampsuchi M iiii.
Serpilli M ii.
Foliorum Myrti M i.
Abrotoni
Sisymbrii ana M s.
Cassia lignæ veræ ʒ ii.
Olei Omphacini quantum sufficit.

*Concidito & contundito omnia, & impone in
vitrum, et infunde oleum vt supra species emineat,
tum obstructo vasis orificio macera ad solem vel in
æstuario diebus octo. Postea exprime, & expres-
suum*

sum oleum infunde recentibus speciebus, & hoc etiam tertio facito.

Folia vere Myrti accipi debent, quæ ex Italia & Narbonensi Gallia afferuntur.

SISYMBRIVM, id est, Mentha aquatica. est & aliud Sisymbrium in montibus nascens, multò odoratius, quod melius esset si ubique haberi posset.

OMPHACINVM, id est, ex immaturis olivis expressum.

¶ Lassitudini utile est, & morbis cerebri & nervorum prodest: ob id in balneo inunctum paralytim iuvat, & spasmus cynicū, vulgò torturam oris, naribus iniectum: & auribus immissum, à flatu tinnitum dissipat, menses ciet, ac morsui scorpionis prodest.

Oleum Vitellorum ovorum.

R. Ova recentia numero centum, coquito donec penitus indurentur. Postea vitellos eorum exime, & comminutos assa in sartagine, donec rufescant, & pinguedinem quandam remittant: deinde ossam ferventē inde in sacculum pilis contextum & exprime, quodque expressum fuerit oleum reponere.

¶ Experiētia plurima probatum est cutim expurgare, impetiginem, serpiginem, & alia cutis vitia persanare, capillos regnere, & vlcera maligna & fistulosa curare.

Oleum

Oleum Hyperici.

R. Summitatum Hyperici iamiam matur-
rescentis ʒ iii.

Macerentur in vino odorifero diebus iii.
bulliant deinde in vase duplici obturato ori-
ficio vasis: postea exprime, & recentis Hy-
perici par pondus iniice, & iterum macera
& coque, & exprime: tum eam tertio recēs
Hypericum adde, & si vinum minuetur, ad-
de aliquid. Postea

R. Terebinthinæ claræ 3 iii.

Olei veteris clari ʒ vi.

Croci ʒ i.

Coquantur in duplici vase vsque ad con-
sumptionem vini, postea exprime, & à se-
dimento purgatum oleum repone.

¶ Calidum est & siccum, stipticum: ob
id consolidat vulnera incisorum nervorum,
& combustionem ignis, sedat dolores fe-
moris & vesicæ, & prouocat vrinam.

Oleum Irinum.

R. Olei lib. vi.

Vini lib. i.

Lauetur oleum ter in aqua calida, deinde ef-
fusa aqua adde vinum, & insperge

Macis ʒ iii.

Cardamomi

Zedoariæ ana ʒ ii.

Macerentur in loco aliquo calido obstru-
cto

cto vasis orificio per dies octo, postea in duplici vase coquito vsque ad consumptionem vini dimidij. Postea exprime oleum, & insperge ei puluerem subtilem.

Iridis Illyricæ lib. ii.

Macera vt prius diebus viii. deinde exprime oleum, & recentis Iridis contuse par pondus iniicito, tunc rursus ad solem aut loco calido diebus viii. macerato, & rursus exprime. Postremò etiam tertio exprime, & aliam Iridem adde, & similiter omnia perage, deinde in duplici vase oleum vnà cum vltimò inspersa Iride aliquandiu coquito, ad vltimum deinde exprime & repone oleum, cumque videris subsidere ad fundum vasis Iridis puluerem, leuiter cola.

Cum ita permutatur crebrò Iris, oleo singulis diebus aliquid decedit, ideò boni ponderis lib. vi. olei accipiantur.

¶ Attenuat, resoluit, maturat, & digerit malos humores phlegmaticos pectoris & pulmonis, faciliat sputum & anhelitum, sedat tussim & frigidos dolores hepatis, splenis & maximè matricis, resoluit dura apostemata & mollit durities, & confert spasmus, doloribus iuncturarum, aurium, & foetori narium.

Oleum Irinum, descriptione Nicolai Alexandrini.

R. Olei sextarios x.

Aquæ

Olea

319

Aque sextarios iii.
 Radicum Iridis lib. iii. ̄ iii.
 Crini domestici radice ̄ xv.
 Cyperi viridis radicum ̄ vj.
 Helenii ̄ iii.
 Anchusæ ̄ ii.
 Cinnami
 Asæ
 Spicæ ana ̄ i.

Contundantur radices & aliæ species, & macerentur in oleo & aqua diebus quinque ad solem vel loco calido, obstructo vasis orificio: postea supra lentas prunas in duplici vase coquito donec aqua consumpta fuerit, deinde refrigerare finito, ultimò exprimito, & cum aliquid subsederit, sensim excolato oleum.

NICOLAI Alexandrini latinum & impressum exemplar ita tradit huius olei confectionem.

SEXTARIUS Romanus mensura est quæ habet olei uncias ponderales xvi. 3 v. ̄ i.

CRINON domesticum, id est, lilium odoratum album, quod in hortis plantatur.

Non ubique habentur radices Cyperi virides: idè aridas sume, & vino asperge tritas.

HELENII, id est, Enulæ Campanæ, videlicet radicem eius.

ANCHUSA, est Buglossa sylvestris, rubra radice, quam aliqui hodie non rectè Alcantham vocant, tinguntur ea radice unguenta, & cera.

CINNAMUM, idem est quod Cinnamomum.

ASAE, ego hic non dulcem Asam sed fetidam ponerem, licet tamen utriusque ̄ s. accipere.

¶ Vsurpatur

¶ Vsurpatur ad diuturnum catarrhū nari-
bus illitum. Ozanas & putredines nariū
aufert, tinnitum aurium cum aceto & ruta
ex amygdalis amaris commistum & auribus
iniectum tollit, asthmaticis gargarismo ad-
hibito opitulatur, hæmorrhoidas veteres
inunctum siue colo iniectum educit.

*Oleum Moschelimum, descriptione Ni-
colai.*

R. Olei puri lib. viii.
Aquæ lib. iii.
Folii (aut succedanei eius)
Spicæ nardi Indicæ
Costi odorati & veri
Mastiches ana ʒ iii.
Styracis Calamitæ
Crocæ
Myrrhæ Troglodyticæ
Xylocinnamomi (in eius absentia, corticis
cinnamomi)
Cassie lignæ veræ ana ʒ i. s. ʒ
Carpobalsami (aut succedanei eius)
Charyophyllorum
Bdellii ana ʒ i.
Moschi ʒ vj.
Nuces Indicas numero iiii.

Confice sic. Folium aut eius succedaneū,
Myrrham, Cassiam, Carpobalsamum &
Bdellium tere, & per biduum in aqua & o-
leo macera: postea coque supra lentum ignē
in duplici vase vsque ad consumptionem a-
quæ: deinde reliqua omnia in tenuissimum
pulverem

uluerem redacta insperge excolato & expresso oleo, & iterum macera & coque pauper: vltimò deinde Moschum admisce, & repone, & patere vt aromata subsidant, ca-
nterdum oleo commisce, agitato vase.

Ex Nicolao Alexandrino desumptum est hoc oleum, apud quem non puri sed Punici olei legitur, d est, in Aphrica nati, quod omnium optimum & dulcissimum existit.

Pro Folio, sume radicularum Spica Romanae, Macis ana \bar{z} i. s.

Pro Xylocinnamomo, sume Cinnamomum electum.

NVX Indica hic non significat grandem illam nucem, quæ vbique Indica nux vocatur, sed nucem muscatam. Nam veteres Græci eam appellant Caryon siue Carydion Indicon, id est, nux siue nucula Indica: vocatur etiam Caryon Myrepsicon, id est, nux vnguentaria siue odorata, & Moschocaryon, hoc est, Muscata nux, quod diligenter in hoc oleo notandum est.

¶ Est optimum ad omnem frigiditatem corporis, potissimum ventriculi, & ad dolorem lateris foris inunctum. Stranguriosis, & colicis, & ad omne neruorum vitium illitum optimè facit. miscetur epithematibus & emplastris, quæ ad stomachi & renum affectiones asciscuntur.

Oleum Rutæ.

R. Rutæ recentis incisæ & contusæ quantum

tum libuerit, pone in vase vitreo, & affunde olei veteris clarissimi sufficientem mensuram, & macera ad solem, aut in loco calido aliquo diebus quindecim: deinde in duplici vase coquito, & abiecta Ruta recentem iniicito, & iterum quindecim diebus macerato: postea simili modo coquito & exprimito, & tertio recentem Rutam iniice, macera quoque & cola.

Ita debet preparari oleum hoc & aliquot sequentia.

Est calidum, aperituum, resolutuum, & mitigatuum dolorum, calefacit renes, vesicam, matricem, & sedat dolores eorum, & maximè colicam, si venter vngatur, & fiat ex eo solo clyster: præterea opitulatur nervis, confert spasmus, & expellit frigidos humores.

Oleum Anethinum.

Oleum Anethinum fit ex floribus et folijs Anethi, & oleo veteri claro eodem modo quo Rutaceum oleum.

¶ Sedat dolores, aperit poros, & resolvit vapores, & apostemata, tumores & durties: mitigat dolores & rigores febrium, prouocat somnum & sudorem.

Oleum

Oleum Chamæmelinum.

Oleum Chamæmelinum siue Chamomilla (ut vocant) fit ex floribus Chamæmeli, id est, Chamomilla & oleo veteri claro, ut Rutaceum oleum.

¶ Valet ad plura, aperit poros, resoluit vapores, sistit fluentes humores, corrigit malas qualitates, confert neruis & membris neruosis & apprimè mitigat dolores.

Oleum Lilinum.

Oleum Lilinum siue Liliorum fit ex Lilyis albis odoratis recentibus, & oleo veteri claro, ut oleum Rutaceum.

¶ Sedat frigidos dolores pectoris, renum, vesicæ, matricis, & colicam: est enim calidum, resolutiuum, mitigat tussim, & efficaciter resoluit, & citius maturat apostema.

Oleum Narcissinum.

Oleum Narcissinum fit primo vere ex recentibus florib. albi Narcissi, qui vocatur Germanicè Mertzenblum, vveysß hornungsblum, vveysß aprillenblum, vveysß Iosepfslebe, ut Rutaceum.

¶ Valet ad emolliendas vuluæ duritias, præclusionesque.

*Oleum Ligustrinum, descriptione Me-
sue.*

*Oleum Ligustrinum, quod Græci vocant Cypri-
num, Arabes autem oleum de Alcanna, fit ex flo-
ribus recētibus Ligustri florente vite, aut paulò post
& oleo veteri clarissimo ad modum Rutacei olei.*

*Est autem Ligustrum arbuscula salicis ferè so-
lio, floribus paruis candidis, veluti spumosis & mu-
scosis, Germanicè vocatur Reynvveyden & Mun-
tholt. Nascitur copiosè ad Renum, & in Mysnia,
Hessia, Sueuia Vvitembergensi, Thuringia, & cir-
ca Nurembergam non longè à Kalckreut.*

*Partes neruosas roborat, & capillos à ca-
nitie vindicat.*

Oleum Sambucinum.

*Oleum Sambucinum fit ex floribus Sambuci &
oleo veteri clarissimo, quemadmodum etiam oleum
Rutaceum.*

*¶ Lenit, abstergit, & mundificat cutim:
medetur icteritiæ, & maximè hepati infirmo,
oppilato, & plurimum confert doloribus
iuncturarum.*

Oleum Iasminum.

*Oleum Iasminum, quod Arabes vocant Iesemi-
num & oleum de Zambach, fit ex floribus Iasmi-
nis, siue Iaseminis siue Zambachi, & oleo veteri
claro*

aro, ut oleum Rutaceum.

Est autem flos similis Violis aut Cheyri admodum odoratus, nascitur in frutice, qui multis vitibus ascendit pergulas: & concamerationes, ut vis. Colitur in Italia & Gallia.

¶ Opitulatur corporibus, quæ calefactionem, laxationemque desiderant.

Oleum Cheyrinum.

Oleum Cheyrinum fit ex Leucoijs luteis, hoc est, ex Cheyris citrinis, & oleo veteri claro, ut Rutaceum oleum. Cheyri autem Germanicè dicuntur Gelbe Violen.

¶ Dolores neruorum, aliarumque partium corporis mitigat, eaque quæ in thorace, renibus & vesica sunt, discutit.

Oleum Myrtillorum.

Oleum Myrtillorum fit ex Myrtillis, hoc est bacis verae Myrti, & oleo Omphacino, hoc est immaturo, eodem modo quo Rutaceum: quoniam verò Myrtus vera apud nos non nascitur, neque habemus semper virides Myrtillos, sed aridos, ut plurimum ex Italia asferuntur, ideo necesse est ut vino odorato aspergantur.

¶ Refrigerat & adstringit, ideoque cæliacis affectibus subuenit, sanat igne ambulata, pustulas erumpentes illitu emendat, attritos hyeme concitatos, & intertrigines il-

P 2 lito n

litum corrigit. Sedis rimas, condylomata, laxatos artus persanat, & sudores coercet.

Oleum Myrtinum.

Oleum Myrtinum fit ex folijs vere Myrti, & oleo Omphacino, id est, immaturo, quemadmodum oleum Myrtillorum.

Quoniam verò Myrti vere recentia folia apud nos haberi nequeunt, ideò sume folia Myrti vere, quæ ex Italia & Narbonensi Gallia, & Candia afferuntur denuò, & asperge ea confusa vino veteri odorato, ut dictum est proximè in oleo Myrtillorum.

¶ Cerebrum, nervos, cor & ventriculū roborat.

Oleum Menthe.

Oleum Menthe fit ex Mentha crispa sativa & oleo Omphacino, id est, immaturo, eodem modo quo Myrtinum aut Rutaceum oleum.

¶ Ventriculū refrigeratum & imbecillū calefacit: firmat nauseam, vomitumq; reprimiit, appetentiam excitat, coctioneq; iuvat.

Oleum Absinthij.

Oleum Absinthij fit ex Absinthio Pontico, & oleo Omphacino claro, quemadmodum oleum Rutaceum. Porro Absinthium Ponticum nos non habemus,

mus, quod videlicet non adeo calidum est, sed
maioris odoris & valde adstringens. Nostrum ve
ro Absinthium siue rusticum Absinthium calidius
est, & nihil scè adstringit, vt etiam Galenus scri
bit: ideo corrigendum est cum Rosis, quæ dimidium
ius pondus æquent.

¶ Calefacit ac roborat ea quæ sunt refri
gerata, potissimum verò ventriculum, ex
citât appetentiam, obstructions aufert, lû
ricosque enecat.

Oleum Rosaceum.

Oleum Rosaceum siue Rosarum fit ex Rosarum
rubearum nondum penitus apertarum decerptis fo
lijs & oleo Omphacino, id est, immaturo, eodem
modo quo Rutaceum oleum.

¶ Refrigerat & adstringit, inflammatio
nibus præsidio est, æstuantem ventriculum
restringit, erosiones intestinorum clysteri
bus inditum, & dolores dentium, si eo col
luantur, sanat.

Oleum Violaceum.

Oleum Violaceum, siue Violarum, fit ex flori
bus Violarum, & oleo Omphacino, id est, imma
turo, quemadmodum Rutaceum & Rosaceum.

¶ Refrigerat, incandescentibus inflami
nationum feruoribus vtile est.

Oleum Nenupharis albi.

Hoc Oleum fit ex recentibus floribus Nenupharis, quæ albos flores producit, & oleo Omphacino quemadmodum Violaceum.

¶ Nymphæatum oleū, vires habet Violati, refrigerat tamen magis quàm Violatū, & minus quàm Papauerinum: hypnoticis, & intemperaturam partium, vt renum, calidam sanantibus vtiliter miscetur, & veneris tentiginem prohibet genitali inunctum. Somnum etiam conciliat.

Oleum Nenupharis Citrini.

Hoc oleum fit ex luteis, siue citrinis Nymphaeæ hoc est, Nenupharis floribus, & oleo Omphacino, vt Violaceum oleum.

Oleum Populinum.

Populinum oleum fit primo vere ex oculis Populi arboris contusis & oleo veteri claro, loto in aqua calida aliquoties, eodem modo quo Rutaceum aut Anethinum oleum.

Oleum Populinum, descriptione Nicolai Alexandrini.

R. Olei ℥ lxxxvj. faciunt
lib. vij. ℥ ii.
Vini lib. iiij.

Gemmarum

Gemmarum Populi arboris recentium veris initio collectarum lib. iii.

Gemmæ Populi diutissimè terantur & macerentur in vino & oleo diebus septem, & quotidie sæpe agitentur: octaua deinde die supra lentas prunas in duplici vase coquito, usque ad consumptionem vini, deinde exprimatur oleum & reponatur.

Porro hoc oleum efficacius erit si secundo, & tertio recentes Populi gemmæ addantur.

GEMMÆ Populi, id est, oculi Populi.

¶ Expedit ad capitis dolorem, arthriticis, nephreticis, & podagricis, & ubicunque dolor fit.

Oleum Amygdalarum dulcium.

R. Amygdalarum dulcium siccarum non tamen rancidarum. Contundantur minutissimè, postea in sartagine aliquantulum torrefacias affuso aquæ Rosacæ modico, postea prælo exprime.

¶ Lenit asperitates pectoris, gutturis, & pulmonis, duritiem & siccitatem iuncturarum: est suaue in cibis, & confert hecticis & phthisicis: impinguat, auget sperma, sedat tussim & ardorem urinæ vesicæ & vuluæ excoriatæ, cum fistula iniectum.

Oleum Amygdalarum amararum.

Fit hoc oleum eodem modo quo ex dulcibus Amygdalis.

¶ Aperit oppilationes, & discutit ventositates & vapores, sed potissimum medetur surditati, sibilo & dolori aurium, lenit duritiem neruorum, & delet maculas faciei.

Oleum Balaninum.

Oleum Balaninum fit ex Balano Myrepfica, id est, glande unguentaria, quam Arabes vocant granum Ben: fit autem ex tuso, affatoque, affusa Rosacea aqua fructu isto. Porro fructus ipse Auellanae magnitudinem habet, colorem candicantem, & figuram ut plurimum triangularem. Cortice tenui claudit pinguem quendam nucleum fungosa & alba tunica inuolutum. affertur ex Syria & Arabia.

¶ *Oleum Balaninum repurgat maculas, varos, lentigines, cicatricum nigritias, fucos, aluum soluit, sed ventriculo aduersatur, dolores aurium emendat. Item si sonant aures, vel strepitum, aut sibilum edunt, cum adipe infusum auxiliatur.*

Oleum de Cherua.

Oleum hoc fit ex pingui quodam semine, quod Arabes Cherua, Graeci Crotona, Latini Ricinum vocant, fit autem eodem modo quo oleum Amygdalarum.

arum . Planta verò quæ semen hoc producit, vocatur a recentioribus Cataputia maior, ab Italis palma Christi, & Mirasolis, à Germanis Wunderbaum, Zeckenfame, & Heydnisch Sprinck Korner.

¶ Prodest psoris, vlceribus capitis erumpentibus, sedis inflammationibus, vuluis quæ occlusæ conuersæque strangulant, cicatricibus scædis, aurium doloribus: potu aluum ciet, quæ aquis grauatur, lumbricos eiicit.

Oleum Papaueris.

Ex semine vtriusque Papaueris tam albi quàm nigri exprimitur oleum, eodem modo quo ex Amygdalis, Balano Myrepica, & Cherua.

¶ Impinguat, asperam arteriam lenit, febrium ardorem mitigat, & insomnium.

Oleum Hyoscyami.

Hoc oleum exprimitur ex Hyoscyami semine eodem modo quo ex Papauere.

Oleum Spicæ.

Oleum Spicæ fit per distillationem ex maiori Lauendula quæ Spica vocatur. apud nos maioribus sumptibus fit quàm in Gallia Narbonensi, ideò potius emendum est à mercatoribus qui illud è Gallia afferunt.

P s Oleum

Oleum Laurinum.

Oleum Laurinum apud nos non facile fieri potest: quoniam verò in magna copia affertur ex Italia & aliunde, ideo facile emitur à materialistis.

¶ Calidum est & aperitium, mitigat colicam, & frigidos dolores ventris, stomachi, capitis, hepatis, splenis, renum, matricis, neruorum, iuncturarum: denique omnibus ægitudinibus frigidis confert.

Oleum Sesaminum.

Oleum Sesaminum exprimitur è Sesami semine affertur autem ex Alexandria Aegypti Venetias, ubi ematur syncerum: nam adulteratur oleo Nucum & Papaueris, sed odore & sapore facile apprehenditur à peritis dolus.

¶ Oleum Sesaminum impinguat, augeat sperma, lenit guttur, & omnem asperitatem & duritiem, & clarificat vocem.

Petroleum flauum.

Petroleum clarum, quoddam est album, quoddam verò aurei coloris, defluit autem ex petris in Italia & plerisque alijs locis, vnde ad nos affertur.

¶ Calefacit, siccatur, essentia tenuitate in altum penetrat, digerit, proinde materiam omnem excrementosam consumit: ob id epilepsia,

epilepsiæ, paralyfi, vertigini, obliuioni, &
 ienis, renum, vesicæ, vteri, neruorum, ar-
 ticulorum omnium, & reliquarum partium
 neruosarum, doloribus frigidis maiorem in
 modum confert.

Petroleum nigrum.

*Petroleum nigrum siue Naphtha nigra crassius est
 quàm flauum. gignitur autem in agro Borchdor-
 piano & Brunswicensi in Saxonia.*

PETROLEVM, id est, Naphtha.

PRÆPARATIONES
 QUORVNDAM
 simplicium. •

*Modus abluendi Aloen cum Aroma-
 tibus.*

R. Aloes purissimæ & cribratæ lib. i.

Cassia lignæ

Spice nardi Indicæ

Asari

Schoënanthi

Carpobalsami

Xylobalsami

Cinnamomi

Ligni aloes

Croci

} aut succedaneorum
 } eorum.

℞ 6 Mastichæ

Mastiches

Laccæ ana 3 iii.

Decoquantur aromata in aquæ quantitate sufficiente, secundum artem in duplici vase, deinde colentur. in colatura dissolue Aloen continuè agitando, & pone ad solem in vitrea aut vitreata patina donec exiccetur. Oportet autem patinam linteolo puro tectâ soli apponere ne aliquid incidat: quòd si hyeme lauanda est Aloe, in æstuarium ad fornacem ponatur. oportet etiam fundo vasis insidentes arenas & si quæ sunt aliæ sordes diligenter auferre.

Modus abluendi Aloen simplex.

R. Aloes purissimæ & tritæ lib. ii.

Aquæ cœlestis quantum sufficit, aut lib. vi.

Misceantur in patina vitrea ita ut aqua calefacta prius infundatur, deinde subidere finito sordes & calculos, & purâ pinguemq; aquam cui se pura Aloe miscuit sensim excolato, & sordes in fundo abiicito, postea colaturam tectam linteolo in sole exiccato.

Modus abluendi Laccam.

Modus abluendi Laccam, qui passim à scriptoribus traditur, admodum absurdus est, & qui cum primus inuenit aut tradidit, Laccæ naturam penitus ignorauit: nam quicquid purum, syncerum & efficax est in Laccæ, illud aquæ miscetur, eam illi dicunt abijciendam esse, & quod remanet in Trochiscos

Quorundam simplicium 335

*trochiscos formandam, hoc est calculos, ligna & for-
es. Nos verò rectius modum trademus.*

℞. Aristolochiæ longæ
Trochœnanthi ana ʒ ii.

Decoquantur in aquæ lib. iiii. aut
quantum sufficit, donec remaneant lib. iii.
colaturæ insperge

Lacæ integræ lib. i. ʒ iiii.

Decoquatur Lacca deinde lento igne, do-
nec aqua fiat coloris sanguinei, & quidquid
in Lacca boni fuerit dissoluatur, tum per fil-
trum aut laneum pannum cola, & remanen-
tes sordes abiice: excolatam verò & sangui-
nei coloris aquam lentis prunis in duplici
vase vsque ad mellis spissitudinem coquito,
& tepidam massam in Trochiscos fingito:
hic itaque uerus est modus abluendi Laccā.

Modus lauandi plumbum.

℞. Mortarium plumbeum, in eum infunde
aquam cœlestem, & agitato aliquot horas
aquam in mortario, donec aqua colorem
acquirat liuidum, & crassescat in modum li-
mi. istum limum per linteum exprime &
exiccatum repone.

Præparatio limaturæ ferri, quam qui- dam Scoriam uocant.

℞. Limaturam Ferri optimi, aut Chalybis,
aut squamam, hoc est, Batituram eius. pur-
ga eam ab omnibus immunditiis, hoc mo-
do,

336 Præparationes

do, proiciatur in aquam clarissimam, & fricetur manibus, postea sordidam aquam effunde totam, deinde impone limaturam in vitream patinam, & affunde modicum aceti ut tantum humectetur, nec emineat acetum, postea macera diebus xxx. ultimo tere & reponere.

Scammoneam præparandi modus.

R. Scammoneæ optimæ ℥ iiii.

Contere in subtilissimum pulverem, deinde insperge illi olei Violati optimi modicum, ut fiat massa: deinde excava aliquot Cytonia mala magna, & in cavitatem eorum impone massam Scammoneæ, & cooperi foramina Cytoniorum: postea assa in fornace, cum pane, donec Cytonia perfecte sint assata, deinde exime Scammoneam, & impone sequenti diluto.

R. Carnium Myrobalanorum Citrinorum ℥ i.

Succi Cytoniorum ℥ iiii.

Conterantur Myrobalani & misceantur cum calefacto Cytoniorum succo, & stent in infusione horis xxiiii. deinde leuiter cola, colaturam verò infunde Scammoneæ & optime simul misce, ultimo in loco calido exicca, & exiccatam reponere Scammoneam.

Colocynthidis præparatio.

R. Colocynthidæ pulpæ lib. i.

Bdellii

Tragacanthæ

Quorundam simplicium 337

Tragacanthæ ana 3 xii.

Incidatur Colocynthis minutissimè, Tragacanthum verò & Bdellium dissolue in aqua Rosarum quantum sufficit, & dissoluta insperge incisæ Colocynthidi & fac Trochiscos, quos in sicco aliquo loco siccabis, exiccatos deinde Trochiscos iterum subtilissimè terito, & reforma Trochiscos adhibita Mastichè in oleo Rosaceo dissoluta.

Squillæ præparatio.

R. Squillam magnam recentem, neque putridam, neque gelu flaccidam, abiice eius exteriores aridas tunicas, inuolue deinde eam massæ siue pastæ pistorum vnde panis fit, assato postea in furno cum panibus, donec panes percocti fuerint, hinc è furno exime Squillam & sigillatim omnes tunicas detrahe, & funiculo traiectas in calido loco exiccato, abiicito verò medium squillæ cor, vnde germen enasci solet. Porro squilla nō est incidenda ferreo aliquo cultro: sed è ligno solido aliquo facta, nam contrahit à ferro venenosam quandam rubiginem.

Mezerei præparatio.

R. Foliorum Mezerei quantum libuerit, ea macera in aceto vini horis xxiii. Postea exiccantur: cū verò vti iis voles, conterre, & in contundendo abiice eorum venas & neruos.

Esulæ

Efulæ præparatio.

Efula tam maior quàm minor, præparatur eodem modo quo Mezereon.

Gersam serpentariæ faciendi modus.

R. Radices serpentariæ veræ, vel loco eius radicum Ari, id est, Aronis \bar{z} iii. Terantur subtilissimè, & infunde eis aquæ Rosaceæ \bar{z} iiii. deinde exiccentur ad solem in vitrea patina, linteolo tecta. Postea secundò tantum aquæ Rosaceæ infundiro, & simili modo exicca: tertio modo eodè aquæ Rosaceæ quantitas inspergatur, & ultimò siccata farinam cum vino odorato in Trochiscos siue orbiculos finge & repone: ingreditur autem hæc Gersa, vnguentum Citrinum, & reliqua quæ ad nitorem cutis cõficiuntur.

Spodium præparandi modus.

R. Eboris in partes secti lib. i.

Pone id in nouum & nondum crematum fictile, & crudo operculo tegito, & iuncturam luto figulino diligenter oblinito, postea in fornacẽ figuli mitte, & cremari finito donec fictilia percocta sint: deinde exemptũ ebur in tenuissimum puluerem terito, & cribrato, & infunde ei in patina vitrea aquæ Rosarum lib. ii. & exiccari finito: deinde secundum terito, & alias ii. lib. atquæ Rosaceæ

Quorundam simplicium 339

Rosaceæ affundito, atque similiter exicca.
Tertiò etiam terito & admisce aquæ Rosæ
libram vnam, in qua diligenter dissolu-
æ sint Cāphoræ tritæ, & subtilissimæ 3 iiii.
Tere omnia in tabula marmorea durissima,
& finge Trochiscos, quos repone in denso
vase aliquo ne expirent. Porrò si ebur ha-
bere non poteris, loco eius sume cornu cer-
uinum, & similiter præpara: est enim hoc
quoque efficax medicamentum ad multa,
præsertim contra venena.

*Ebur crematum, melius est vt operto fictili fiat.
alijs enim non candidum sed nigrum fit.*

Pulmonis Vulpini præparatio.

R. Pulmonem vulpis recentem, extrahe ex
eo arteriam siue fistulam, & laua in vino o-
dorato calefacto, mox ollæ impositum exic-
ca in tepido furno, deinde exiccatum repo-
ne in loco sicco, & inuolue Absinthio ne pu-
trefcat.

Hepatis Lupini præparatio.

Hepar lupi eodem modo præparatur, quo
pulmo vulpis.

Sanguinis Hircini præparatio.

Hircum mediocris ætatis domi alito &
per mensem nihil aliud dato præter Pimpi-
nellam, Apium, Petroselinum, Leuisticum,
& similia,

& similia, deinde sanguinem eius qui ex arteriis fluxit excipito, & concrefcere finito, atque aqueum illud effunde, grumos verò sanguinis in furno exicca. Mactandus autem est hircus veris exitu, id est, principio æstatis cum Sol Cancrum ingressus est.

Adipum uel pinguedinum præparatio.

R. Adipem vel pinguedinem cuiuscunque animalis, & laua in aqua aliquoties, donec pura defluat aqua, & non amplius saniosa aut cruëta appareat, deinde incisam liqua in duplici vase, & eliquatâ in frigido loco reponere sine sale.

Medullarum præparatio.

Medullas ex ossibus auferto Autûni initio, & laua, & liqua in duplici vase secundum modum, qui traditus est in Adipum siue Pinguedinum præparatione.

Oesypum faciendi modus.

R. Lana succida, hoc est nondum purgata, ex collo, fœminibus & fœmoribus ouium detonsa, quantitatem satis magnam, infunde ei aquam feruidam, & laua diligenter, quousque omnem suam pinguedinem in aquâ deposuerit. Postea expressam lanam sepone, & aquam illam pinguem & sordidam vasculo aliquo diutissimè ex alto fundito & refundito, donec spumosa fiat: tum finito spumam subsidere & collige aquæ innatantem pinguedinem, iterumq;

Quorundam simplicium 341

terumq; aquam refundito donec spumet, & subsi-
lentem pinguedinem auferto, & rursus refundito
donec non amplius spumet, & nulla concreseat su-
pra aquam pinguedo. Tum collectam pinguedinem
nungito, & in aqua lauato manibusq; diducito,
donec pura fiat & aqua clara defluat & albescat
& linguam admota non mordeat, tum repone in
fictili denso, loco frigido. Porro hic Oesypos hodie
vocatur corrupto nomine Hysopus humida, sed non
bene preparatus habetur in Pharmacopoijs.

Modus coquendi Terebinthinam res- nam.

R. Resinę Terebinthinę aut eius loco La-
ricinam resinam, quam Terebinthinam ho-
die vocant, lib. i. affunde ei aquę lib. xxiiij.
& coque in magno uase donec odorę amit-
tat & inspissetur, adeo vt refrigerata digitis
in puluerem teri queat, hoc modo, vsta re-
sina ingreditur in quędam vnguenta, olea,
& in trochiscos Cyphi, qui pertinent ad
Mithridatium.

Acacię Succedanea.

Acacia vera apud nos non potest confici. eius au-
tę loco sumunt nostri Pharmacopola, totius ferę Eu-
ropę, succum Prunorum syluestrium, id est, Schle-
hensafft. Sed hæc, quam describemus, propius ad
verę Acacię vires accedit.

R. Seminum Tamarindorum

Sumach

ana lib. ij.

Contundantur,

Contundantur, & affunde eis aquæ cœlestis lib. viii. aut quantum sufficit, Macera deinde per horas vigintiquatuor. Postea coque donec tertia pars aquæ remaneat: excolatam deinde aquam, cum albuminibus ouorum clarifica & despuma, despumatam deinde iterum coque supra lētas prunas ad spissitudinem iustam, deinde reponere, vt Acaciam ex prunellis syluestribus factam.

Finis eorum, quæ Valerius Cordus
Nurembergenſi Senatui
exhibuit.

APPENDIX

APPENDIX EX
SCRIPTIS D. IACOBI
Sylvii Medici Parisien-
sis, pro instructione
Pharmacopo-
larum.

DE SINGVLORVM ME-
DICAMENTORVM SIMPLICIVM
exacto Delectu, Collectionis tem-
pore legitimo, Repositione
commoda, & Durat-
tione eorum.

DE RADICIBV.



RADICES euellendæ sunt,
cùm medicamentosæ sunt
maximè. Quæ dos omni-
bus eodem nō inest tempo-
re, sed aliæ alio vegetæ
magis sunt: quanquam
sunt qui putet omnes radi-
ces legendas Autumno, vbi folia deciderūt: alij Ve-
ris initio, priusquàm in folia aut caulem erumpant.
Omnes tamen integræ sunt, si fieri potest, vellendæ,
& vnaqueque in solo & cælo naturæ ipsius maxi-
mè familiari, bene nutritæ, bene habitæ, non præ ali-
menti copia enormes, neque ob inopiam strigosæ, te-
nues, rugosæ: mox aqua lauandæ, & radiculis
portionem

portionem quandam alimenti repetentibus, & stolonibus etiam trahentibus, purganda: post (nisi utendi recentibus aliqua inceserit vel commoditas vel necessitas) siccanda: quedam umbra & vento, ut apij, feniculi, iridis, & quæ alie sunt vel minores, vel sicciores, vel rariores, quarum vires sol ceu ignis promptè dissipet: quedam contraria dictis sole & vento, vel igni siccantur, si cælum est nubilum, aut hyems: & sæpè versanda, nemucida aut putrida fiant, ut bryonia, gentiana, mandragora, rheon pontici. Si vero succatis citò est opus, patellæ ignitæ impositas sæpè versando siccabis. Quedam item integræ siccantur, ut gentiana: alie in taleolas dissectæ, ut iris: alie lignosa matrice (sic enim cor plantarum Galenus ex Theophrasto vocat) adempta, ut feniculi, petroselinij, apij. Deinde reponuntur loco non insolato, non infumato, non humido, non puluerulento, sed sublimi, tetro, sicco, aut septentrionem, aut potius meridie spectante, præsertim quando hunc plantæ quedam adhuc humidiores requirunt, modo non flent austri. Eadem quamdiu vegetæ adhuc sunt seruanda, parue scilicet ac tenues & rare, ut asari, asparagi anno tantum: quamuis elleborus riter que etiam triennio seruari possit, ut magnæ & crassæ essentia præditæ, bryonia rheon ponticum, aristolochia, gentiana. Hæc autem tria, colligendi tempus legitimum, repositio commoda, & duratio, non in radicibus solis obseruanda sunt, sed etiam in alijs plantarum partibus, atque adeo quibusdam animalium aliquorum partibus, ut sanguine harino, hepate lupi, pulmone vulpis, vesica aper. Propter hæc chamæpityn, chamædryn, thlaspi, centaurium, polium, hypericum, aliaq; florentia capiebat

piebat Galenus, theriacen, vel aliud medicamen-
m compositorum, non sole æstivo siccata, neque
in fructus eorum adhuc crudi et imperfecti sunt.
ebet idem continua speculatione cognoscendum,
quando fructus sunt futuri, quando eduntur, quan-
o augmentur, quando denique rigent. Quo tempo-
e potissimum eos commodè decerpas, & in siccis
omunculis repositas custodias, ne à solis radijs
rantur, neque humiditate à tecto, vel muris ma-
efiant. Ob id domo non vult subterranea eos re-
oni, nec alijs vicina, neque sub tegulis, sed ho-
um media, quæ ostia meridiem spectantia habeat:
rope, quæ tamen medicamenta ne reponas. Omnia
gitur legenda, quando summarum sunt virium,
& accusandi tum mercatores, tum herbarij, qui
radices, liquores, succos, flores, germina, fructus
extra anni tempus carpunt, & in vrbes conferunt.
in quibusdam & astrorum observatio valere puta-
tur. Pæonia enim radix ad epilepsiam legenda de-
crescente luna quibusdam videtur, & Alysson sub
æstu canicule vult legi Galenus, vt Aeschiron can-
cros fluuiatiles capi contra rabiem, vnde est herbe
nomen tanquam vis quædam illis contra rabiem à
sydere accedat, rabiem canibus afferente. Plantas
item calidas ex calidis regionibus, & ex harum
editis & siccis locis, vt Cretæ montibus, præfert
Galenus.

DE HERBIS.

QVÆ prius in radicibus dicta sunt de col-
lectione, repositione, duratione illarum, ad her-
bas etiam transferri possunt, nisi quod his ferè re-
centibus vtimur, quibusdam omnino, vt portula-
ca,

ca, lactuca, buglossa, atriplice, beta, brassica, acantho, nasturtio, helxine, mercuriali, viola nigra, intybo, fumaria, hyoscyamo, mandragora, & alijs permultis. Quibusdam verò recentibus vi-
mur, quando his mitioribus opus est, ut ruta, men-
tha, absinthium, abrotanum, recentes minus ca-
lent ob mistam humiditatem excrementosam, sic-
cata verò calidiores sentiuntur, & fumaria recens
minus aluum subducit, magis sicca.

Colliguntur ferè cum floribus herbae, aut semi-
nibus, sic benedictus carduus acanthium putatus,
centaurium paruum, calaminthe, chamadrys, cha-
mæpitys, daucus, fumaria, maiorana, polium,
pulegium, origanum, serpillum, thymus: aut sal-
tem cum vigent folia magnitudine, odore, colore,
praesertim quæ cacumini sunt propiora.

Siccantur in umbra magis, nisi si quæ scapo
sunt crassiore, aut folio humidior, & ob id apto
putrere. Vbi probe sunt siccata, reponuntur vi-
radices, sed minus diu seruari possunt, ob id quot-
annis mutandæ.

DE FLORIBVS.

FLORES ut plantarum partes reliquæ legan-
tur, cum maximè vigent, ut capparitis in gemma,
rosa expandi cœpta, reliqui ferè aperti. Sed haud
ita pridem & ex quibus vis, nondum exhalauit,
siccantur sole magis, minus, pro varia ipsorum na-
tura: quidam siccandos volunt, donec ex ponde-
ribus decem vnicum supersit. Reponuntur, ut alia,
quotannis mutantur, quamuis schœnanthos etiam
decennium efficax seruari possit: chamæmelum itē
diu

Simplicium 347

diu vegetum est, ob fortem partium suarum missionem.

¶ Flores & omnia quæ iucundum odorem efflant, arculis tiliaceis nullo situ obductis reponuntur.

DE SEMINIBVS.

LEGENDA sunt semina, cum sunt matura, & fructus quibus includuntur maturi. Semina vero quotannis mutare præstiterit, etiam si pleraque diutius seruari possint.

¶ Ut aptè perennent, charta aut folijs aptè inuoluantur.

DE FRVCTIBVS.

FRVCTVS ut maturi decerpantur necesse est.

DE CORTICIBVS.

CORTICES ut recondantur eximere conuenit, cum herbe suis folijs exuuntur. siccantur etiam expurgatæ inibi, locis asperginem non redolentibus, sed cum luto aut puluere sunt obsitæ, aqua elui debent.

DE SVCCIS.

Χυλός, id est, succus ex plantis totis, vel plantarum partibus concisis & tuis, torculari vel manu, vel aliter expressus, aqua interdum

Q aspersa,

aspersa, aut vino, aut liquore alio, vel recens
 usurpatur, vel vase, aut luculamento aliquo re-
 ponitur, hicq; vel liquidus, vel siccus. Liqui-
 dus item aut per se seruatur, ut vinum, ace-
 tum: aut misto sale, ut omphacium, oleum:
 aut superfuso phialæ oleo, ut succus rosarum,
 granatorum, limonum, cydoniorum, sambu-
 ci, ebuli, & similia: aut sole, vetustate re-
 aut igni per se siccatur, ut succus glycyrrhizæ,
 opus Cyrenaicus, scammonium: aut coctio-
 ne cum melle, vel saccharo ad iustam crassitiem
 facta sole vel igni, ut in plurimis syrupis au-
 dies. Qui verò succi sine melle aut saccharo re-
 ponuntur, plurimum corrumpuntur, nisi igne
 diutius cocti, aut sole æstivo usque ad medio-
 crem crassitiem siccati fuerint. Videm temporis
 spatio sicciores euadunt, pluribusq; anni ser-
 uati, eò siccitatis veniunt, ut balausticis simi-
 liter deuigari possint (quales sunt succus hy-
 pocistidis, uuxæ acerbæ, glycyrrhizæ, centau-
 rij, & alij propè omnes) qui verò ex his lento-
 rem quendam naturam habent, dilatantur ma-
 gis, quàm leuigentur, nisi siccioribus multis
 mistis horum parua portio. Portulacæ, semper-
 uui, cotylidonis, & aliarum similiter glutino-
 surum succus, præ lentore nimio per se non po-
 test exprimi, cum omphacio probè trita herba
 exprimitur: alij tritas igni lento calefaciunt:
 alij tritas loco frigido, ut cella vinaria, vimi-
 neo vasi impositas in catinum subiectum destil-
 lare permittunt. χαλδός etiam, id est, succus,
 sæpe cum humore aliquo extractus ex partibus
 plantarum, ut seminae psyllij, cydoniorum, li-
 ni,

ni *σαινογραει*, lenterem, aut velut cremorem & mucrorem significat, unde dictum est *emplastra δια χυλῶν*, id est, de glutinosis quibusdam succis, diuersum tamen ab eo, quod est de mucilagimibus, ut in compositis leges.

¶ Liquidis medicaminibus densior materia argentea, vitrea, aut cornea conuenit. Fictilis etiam, si modo rara non sit, accommodatur, & lignea, praesertim è buxo, sed aenea vasa ocularys medicamentis liquidisq; , & c.

DE LACRYMIS.

Δακρυον, id est, lacryma seu humor ex planta sponte sua defluens, siue in gummi aquea res concreseat, siue in resinam liqueat, oleaginata eius substantia. Arborum partibus praesertim truncis à germinatu incisis & scarificatis, etiam resinas elicimus. Accensis autem arboribus resinosis, ut pinu, picea, larice, terebintho, teda, cedro, ex resinosa substantia igni parum siccata fit pix liquida, cui quod supernatat, pissanthum tenui consistentia & facultate est astringente, ob id caniciem sine vlla noxa tardat, ut pissileum, id est, pix liquida cum oleo mista. Galen. lib. 1. comp. ph. part. Pissalsphaltus autem est Mumia Serapionis. Si pix iterum coctione siccetur, Palimpissa dicitur, sicca aλέν ut pulueri dari possit, qualis est Graeca, etiam Colophonia, & Hispana, & Gallica dicta *πύσα βρύτια*, lib. 8. comp. ph. part. & Dioscoridi probatur & Lycia. Est etiam Dioscoridi ex ysdem arboribus resina liquida et

Q 2 sicca.

sicca . Resina omnis calefacit , siccatur , tenuium est partium , magis minus .

DE ANIMALIBVS, & eorum partibus .

SANGVIS hirci quadrimi , bene habiti , aliquandiu nutriti vino albo , fœniculo , seseli , lauro , & ceteris calculum frangentibus , Augusto mense iugulati , medius effluens (nam primus tenuior , postremus crassior putatur) vase vitreo receptus , tectus linteo raro , sole siccatus , etiam cum myrrha , folijs lauri , & similibus , calculum potenter frangere dicitur Tralliano , Auicenne , & ceteris practice .

¶ Adipem & medullam stanneis vasis recondi conuenit .

¶ Medulla loco sicco & edito , & septentrio nem spectanti reponitur , cum folijs lauri siccis , vt prærescant , aut situm ducant , quæ iniuria in locis humidis meridiem spectantibus eis accidit . sunt qui reponant bifariam , adipum modo .

ADVLTERRIA Simplicium Medicamentorū.

ACACIA succo & carne prunorum agrestium representatur dolo parū malo , cum utraque viribus conueniant .

Aloes crasse partes & impure lotionem separatam aqua marina & croco Mesue adulterantur : sed croci odor dolum aperit . Alij acacia , alij gummi immiscendo adulterant , tuncq; minus

De adult. simpl. 351

us est ad minima friabilis, & odor & sapor
est alius.

Ambra pulvere ligni aloes, styracis, ladani
ambrae largioris moscho in aqua rosarum solu-
to. Sed haec manuum attritu multo ceu cera mol-
lescit, vera non mollescit. Platearius.

Amomum planta amomide simili, sed inodo-
ra, ex Armenia delata: seminis dissimilitudo
vitium detegit.

Asphaltum, id est, bitumen pice mistum Di-
oscoridi, licet adulterari non posse, ut neque car-
pobalsamum, neque xylobalsamum, scribit Ga-
len. lib. 1. antid.

Aerugo multis modis adulteratur Dioscoridi:
sed hodie syncerior videtur, si adulteratum su-
spiceris, notas ex eo repete.

Aeris flos delinata aeris scobe.

BDELLIVM adulteratur gummi: sed ita
vitiatum minus est amarum, & suffitu odora-
tum, Dioscorid.

Balsamum, id est, opobalsamum, vitiatur
terebinthina pauco opobalsamo mista, vel sine
hoc croco orientali & succo foliorum citri, vel
oleo nardino. De quo in opobalsamo plura le-
ges.

Bitumen adulteratur pice, ut in Asphal-
to dixi.

CASTORIVM variè adulteratur: vitium
autem facile deprehendes attentus notis quas in
vero & laudatiore castorio diximus in partibus
animalis medicamentosis.

Q 3 Costus

Costus radice prædura Helenij Comagenij, sed odor Helenij minus vehemens, neque caput tentans, & sapor minus acer quàm costi.

Crocus misto crocomagmate tunso, flore cnei, vel oleo & pulvere bersilij, ut vocant, qui fricando dolum detegit: vel sapa sublitu & lithargyro, vel plumbagine ad pondus augendum utrumque minus odore vegetum est: præterea hoc est puluerulentum. Adulterati quoque croci color & odor celeriter euanescent, veri diu permagent. Gal. 1. antid.

Cassia odorata, corticibus capparis & radicis tamaricis mistis.

Caphura, gummi juniperi: sed hoc est minus odorum & durius: illa est friabilis, & odore valentiore. Platearius.

Charyophylli vetustate exanimati vino puluerem optimorum charyophyllorum habere irrigantur, siccantur, foris solum charyophyllos olent, & vix ad dies decem: molliores sunt integris.

Carpobalsamum adulterari semine hyperici simili, quod Petra Palestine oppido affertur, author est Diosc. adulterari tamen non posse, affirmat Gal. lib. 1. antido.

EUPHORBIVM lacte hœdino, sarcocolla, & glutini missione conspurcatur: experientia veri est difficilis, nam Euphorbium leui gustu os d. u. accendit, ita ut omnia gustata euphorbium resipiant. Idem iniectum igni odorem edit fastidiendum. Diosc.

Eburustum (quod cur spodium vocet vulgus non video) osibus canis ustis vel albo marmore vsto:

Simplicium 353

pslo: id verò grauitate proditur, illud forma
ossis & linearum desiderio.

GALBANVM mutatur resina, farina fa-
barum excorticatarum, hammoniaco, Diosco.
ex cuius notis syncerum deprehendes.

Galanga acris cypero europeo insipido, vel
salso, vel bistorta (vt vocant) radice austera:
si verò dictæ radices aceto puluerem vera galan-
gæ & piperis habente biduò macerentur, foris
solum galangam referunt. Platearius.

LADANVM stercore caprino & puluere
nigro: id autem tractando non mollescit, sed in
puluerem abit, modo ladani vetustate exucli.
Viribus prætereà & odore ladani caret, quod
sic vitiatum est.

Laser omne antequàm siccescat adulteratur
saga peno, aut faba lomento: sed maleficium de-
prehenditur colore, odore, sapore, dilutione.
Diosco.

Lycium quibusdam amurca, succo absinthij,
felle tauri: sed id à viribus synceri multum re-
cessit.

Lemniam terram sic adulterant, vt nemo ve-
ram à falsa possit secernere, sic & Lycium In-
dicum, & plurima alia, vt verorum notæ à fal-
sorum notis non exactè discerni possint.

Ligustici semen adulteratur semine quodam
simili: quod facile gustu discernitur, amarum
enim est: alij semen fœniculi aut seseleos admi-
scentes ligusticum dolo vitiant.

Q 4 Lentiscina,

Lentiscina resina, id est, mastiche thuris & resinæ pineæ nucis mistura.

MOSCHVS pelliculis incisis puluere carnis columbinæ siccata, sanguine hædino, pane asso. Si eius certum pondus pelui madenti impositum aliquandiu sit grauius, est legitimum: si pristinum pondus seruat, supposititium.

Manna Arabum saccharo & folliculis senæ.

Myrrha adulteratur gummi macerato in aqua, in qua myrrha maduerit. Diosco.

NARDVS adulteratur stimmi, seu stibio cum aqua aut palmeo vino inspissationi ponderisq; causa inspirato.

Nardus Celtica adulteratur imposita herba simili, quæ hirculus ab odoris grauitate vocatur: sed herba candidior sine cauliculo, minoribus folijs, radice nec amara nec odorata, vti vera nardus est.

OPI omnes adulterantur addito sagapeno, antequàm inarescant: colore, odore, sapore dolus deprehenditur, & quia cum aqua vel salina non mox soluuntur adulterata. adulterantur etiam fursure & farina præcipuè καυλίας, id est, qui ex caule defluit, quia dilutior: ῥιζίας vero, id est, qui ex radice perlucidior & purior. Quauis enim radice incisa aut caule, quod effluit crassum & lentum ὀπός, id est, liquor dicitur, lib. 6. simpl.

Opium, semine lactucæ agrestis.

Opopanax,

Simplicium 355

Opopanax, hammoniaco aut cera: tunc in aqua si digitis teratur, non soluitur, nec late-
scit uti syncerum, Diosc.

Os ex corde cerui cartilaginofum, simili ex
maiorum animalium corde.

Opobalsamum tam variè adulterant & aslu-
tè, ut eius adulteria etiam exercitatisimos fal-
lant. Hæc verò adulteria inuulganda non cen-
seo, ne maligni etiam vitient à nobis edocti. Vi-
tiatur mislo vnguento terebinthino, lentiscino,
Cyprino, balanino, fusino, metopio, melle, vel
Cypria cera liquida. Sed maleficium facile de-
prehenditur. Nam verus liquor in vestem la-
neam fusus maculam non facit, & post lotio-
nem notam non relinquit, cum vitiatum inhe-
reat. Adhuc merus, lac si instillatur coagulat,
& in aqua aut lacte celerrimè liquatur, & co-
lore lactescit. Alias quasdam notas apud eun-
dem & Simeonem si libet, legeris potius, quàm
apud barbaros hoc seculo adhuc legi solitos, pro-
funda hominum ignorantia, & magno morta-
lium incommodo.

PIPER longum fraudulentè preparatum,
est herba quadam flava, quæ à Xene affertur,
aspectu quidem, non autem gustu macropiperi
similis: hæc autem aqua irrigata soluitur, na-
tium macropiper insolubile permanet, Galen.
lib. 1. antidotorum. Piper longum verum ex Bar-
baria affertur: adulteratum verò duplex est, al-
terum, quod in Alexandria maximè conficitur,
alterum herba cuiusdam germen. Quod facti-
tium est, si per diem totum in humore maceretur,

Q 5 illico

illico liquatur ac soluitur . lib. 4. sanit. tuend.
 Illud fortè ex maça subacta aqua , in qua dis-
 solutum aut maceratum sit piper, & in formas
 effictas, coniecta, post siccata. Vidi etiam adul-
 teratum ex germine & velut nucamento betulae
 & coryli .

Pasili theriaci ex radice pentaphylli , id est,
 tormentillae , Venetjs malè componuntur , non
 ex viperarum carne. Hermolaus in Corall. Musa.

Phu radice rusci admista vitiatur: sed male-
 ficium facile deprehenditur , quia hac dura est ,
 frangi contumax , & sine vlla odoris gratia .

Pompholyx , taurino glutine , ouillo vel ma-
 rino pulmone , aut grossis vel quibusdam alijs
 crematis .

Pentapetalon , Pentaphyllon , Polium , ni-
 hil simile habent in plantis , ob id non adulte-
 rantur .

RHA Ponticum , radice centaurij magni .

Rha barbarum exanimatur maceratū aqua
 diebus quinque . postea siccatum idem minus in
 crocum tingit , intus nigricat , varietatem in-
 fracturis amisit , densius est , astringit magis : ex
 aqua vero illa siccata trochisci fiunt regibus .

P' hoc cum viget ac integrum est , valenter a-
 stringit , densum est ac contractum tota substan-
 tia, tamen celeriter perforatur . Incola regionis
 in qua gignitur , coctione vires eius in aquam
 trahunt , deinde rheum siccatum tanquam in-
 tegrum sit , nec coctum transmittunt , sed id ra-
 rius est & laxius integro , nullam aut mini-
 mam astrictionem retinens . Quantum alijs
 notis

notis rheon à rha barbaro differat, alibi diximus.

SAGAPENVUM succo lasaris & galbano, Diosc. id non liquefit, sed verum vino vel aqua affusa statim dissolvitur. Gal. lib. I. antid.

Sarcocolla puluerizata est suspecta adulterij, Diosc. à quouis pulvere misto, integra eligatur.

Syrax modis multis Dioscoridi adulteratur: sed dolus facileprehenditur notis ab eo dictis.

Sandala lignis alijs, rubrum versilio inodoro: flauum & album ligno cedrino odoratiore linguam calfaciente.

Scammonium lacte tithymali & sarcocolla, vel erui farina, tunc linguam minus valenter pungit & mordet.

Saccharum intus feculentum aut spuma succi cannae eius auctum, tunc in ore vanescit, & fractum nigricat.

TVRBITH, gummi dissoluto quibusdam radicibus extremis illito: verum autem si frangitur, gummosum est intus.

Tamar Indi, prunis adulterati non splendēt, humidiores sunt, sapore & nucleo prunorum, multum à semine Tamar Indorum diuerso.

Thus, pini resina & gummi: suffitum autem gummi flammam non edit, resina autem in fumum vanescit, thus statim ardet: odore etiam maleficium proditur.

Thuris cortex, pini aut nucis pineae cortice:

Q 6 horum

horum tamen index ignis, nam reliqui cortices suffiti, quanquam incenduntur, sine odore fumant. Thuris verò cortex ardet, & odorum fumum edit.

Thuris manna adulteratur cribrata pini resina, aut polline aut cortice thuris contuso: sed hæc igneprehenduntur.

Hæc abunde fuerint ei, præsertim qui veras simplicium sincerorum notas, ex libro primo accuratè didicerit. Nam cum rectum sui & obliqui sit index, ut initio huius docuimus, & in unoquoque rerum genere quod perfectissimum est, idem sit simplex ac unicum. Id si cognoveris, alia ei congeneria aut etiã arte affinia nullo negotio secreveris.

S I M P L I C I S

ALICVIUS NOMI-

ne absolutè scripto,
quid accipien-
dum.

AM tralampus simplicis
alicuius nomine scripto
absolutè & sine determi-
natione sexus, coloris,
magnitudinis, figura, lo-
ci, temporis, vel nota-
rum probitatis aliarum,
vel partis eius simplicis,

radicum, foliorum, florum, seminum, &c. quod-
nam sit eligendum: nam pro varijs scopis varia,
sed in scopos efficaciora deligimus. Quã in rem
te iuuabit nostra simplicium per locos communes
descriptio. Quæ enim radicibus solis sunt effica-
ces plantæ, illarum nomine radices veniunt: quæ
folijs, floribus, fructibus, seminibus, cortice, li-
gno, liquore, succo, gummi, sunt vtilis ac medi-
camentose magis, dum plantæ nomen effertur,
partem eius usurpari solitam elige: quum verò
pluribus suis partibus ad res etiam varias va-
lent, quibus sit opus, coniecta ex partium illa-
rum facultate & affectus natura, & medica-
menti constituendi forma, vt ammi, anisum,
apium, carum, cnicus, cuminum, gith, liby-
sticum, nasturtium, psillium, seseli, staphis a-
gria, semine sunt præstantiora, idq; solum il-
larum

360 Simpl. absol. scripto,
larum nomine intelligendum, in alijs multis si-
militer.

Anisum, Cretense lib. 4. sanit. tuend.

Agnus, id est, flos eius aut semen, licet fo-
lia etiam sint utilia.

Agaricus, albus & sœmineus.

Aloe, id est, succus eius, aloë Indica libr. 9.
simplicium in diphryge.

Alumen, scilicet scissile, quia præstantissi-
mum. lib. comp. pharm. gen. primo.

Acetum, ex vino non hydromelite vel cere-
uisia.

Aristolochia pro re proposita explicanda est,
rotunda enim cum multum tenuare crassum hu-
morem, tergere ulcera, digerere ex utero: lon-
ga autem cum mitiora hæc volumus. Clemati-
tis autem quia fragrantior in unguentis expe-
titur.

Anomum, Scythicum lib. 8. comp. ph. part.

Ammi, Illyricum lib. 9. eiusdem, Aegyptium
alijs laudant.

Balsamum, opobalsamum potius intelligen-
dum quàm carpobalsamum aut xylobalsamum
lib. 2. comp. phar. part.

Bryonia, alba, quia efficacior quàm nigra.

Buglossum utrunque folijs et flore efficacius,
radice tamen non inutile.

Casia vel Cassia in libris Grecorum. Casia
syrinx optima, et cinnamomo viribus & toto ha-
bitu finitima. In libris Arabum eadem lignea di-
citur, altera verò fistula his dicta ponitur, cum
medicamentum est purgatorium.

Cardamomum, matris.

Capparis,

Quid accipiedum 361

Capparis, cortex radicis.

Centaurium, minus in purgantibus medicamentis, in ceteris maius dictum à facultate multiplici & efficaciore.

Calaminthe, montana, quia efficacior quàm domestica.

Coflus, amarus, cùm subamarus & valde acer solùm nominetur: dulcem tamen nescio quem Arabes inuexerunt.

Cypressus, id est, nuces eius in astringentibus medicamentis, lignum aut folia in diureticis.

Cinnamomum, optimum, de quo in simplicibus abundè.

Corallium, rubrum.

Cuminum, Aethiopicum, lib. 4. sanit. tuend.

Daucus, agrestis, nam satius pastinaca est alimentum verius, quàm medicamentum.

Elleborus, niger Mesuæ, quia salubrior, albus Galeno, Aph. I. lib. 5. Obserua igitur, an compositio sit Arabica aut Græca. Elleborus vterque & helenium ex locis editis præstant.

Eruca, sylvestris, quia efficacior hortensi.

Epithymum, Atticum melancholiam ex ventriculo purgat, id in Græcis compositionibus usurpandum, in Arabicis Arabicum.

Fœniculus, semen, sed in collyrijs succus foliorum aut radicum.

Galla, solida efficacior quàm perforata.

Gummi, Arabicum, id enim omnium perfectissimum vel Plinio authore.

Gluten, mastiche, ceteris glutinis efficacius, ut vitrum etiam glutinet, quibusdam intelligitur:

362 Simpl. absol. scripto,
tur: alijs ichthiocola, alijs taurocolla magis pla-
cet glutinis nomine.

*Hyssopus montanus hortensi melior, ut cala-
minthe montana efficacior domestica. Hyssopum
Cilicium Diosc. Creticum verò Archigenes, a-
pud Gal. lib. 8. comp. pharm. part.*

*Hyojcyamus, albus, seu album eius semen,
quod tamen interdum exprimitur, frequentius
tacetur.*

*Iris, radix ireos Illyrica veteribus, nunc phar-
macopolarum ignavia Florentina usurpatur,
cùm illa per Venetos faciliè haberi queat.*

*Lupinus amarus, nam dulcis esculentus est,
ut ille amaritudine per macerationem in aqua
deposita.*

*Lactuca, semen, præterquàm in victus ra-
tione, ubi herba potius intelligitur.*

Lapathum, oxylapathum efficacius rotundo.

*Lithargyros, auri: tamen lithargyros chry-
sitis aliquoties in lib. comp. ph. Gal. legitur.*

*Mastiche, Chia lib. 7. meth. & alibi passim.
Aegyptiam tamen ac recentem ob id pinguis-
simam laudat lib. 2. ad Glaucon.*

Marrubium, album præstantius nigro.

*Mel apum, alterum, aeromeli seu mel ae-
rium & rosidum.*

*Margaritæ, solidæ meliores perforatis, nisi
etiam sint flauæ, obscuræ, solidis pares.*

*Medulla si non additur cuius animalis, &
valens futurum est medicamentum, ceruina mi-
scenda valentior quàm vitulina, lib. 6. comp.
pharm. part.*

*Nuclei, pini, oliuæ: dactyli autem Auicēnæ.
Oleum,*

Quid accipiendum 363

Oleum, oliuum ex oliuis expressum.

Opium, Thebaicum Gal. lib. 7. simp. & post eum omnes.

Petroselinum, Macedonicum, et in hoc Astreoticum, & huius semen maxime in usu est lib. 8. comp. ph. part.

Pruna, si alius deijcienda est, Damascena, & Hispana seu Iberica hodie Augustana & Cathalaunica Italis dicta, sunt multò prastantiora, vel si qua his similiter sunt pingua, dulcia: si ad cohibendum & astringendum fit medicamentum, Damascena immatura, vel potius quæ Iorana nobis dicuntur. S. Iuliani & Turonica.

Papauer, album semen.

Piper, album, quia acrius, & linguam magis pungit quàm nigrum, à quo per adustionem vis exhalauit, Gal. lib. 8. simp. sed album id maturum intellige. Nam album ex macropipere in racemum granatim dehiscente, recens factum, minus est acre, & macropiperi facultate proximum, quale apud Serapionem est accipiendum.

Pix liquida in suppurantibus & tergemibus: sicca, in siccantibus unguentis epuloticis & glutinantibus. Gal. lib. 7. simp.


Pæonia, mas seu eius radix, vel semen, Marnardus ætatis nostræ medicus longè doctissimus in epistolis.

Polypodium, quernum vulgò usurpatur: murale & à saxis prætulere cum Narbonensibus quibusdam, quod frequentissimum, & pro querno omnes vendunt, nisi si quando astrictione opus est, qua ratione hederam quoque quernam nonnullis expeti audio.

Quatuor

364 Simpl. ablol. scripto,

Quatuor emollientia, malua, althæa, viola
nigra, acanthus.



Quinque radices vreticæ, apij, petroselini,
asparagi, graminis, rusci.

Resinarum, primas non iniuria meruit len-
tiscina, id est, mastiche. inter alias verò præfer-
tur terebinthina, quia melior quàm colophonina,
& phryctæ dicta, aut illius loco ponitur larix
dicta, terebinthinæ propè similis, Galen. lib. i.
comp. ph. gener. Recentioribus verò pinea intelli-
gitur.

Ruta, folia rutæ agreßilis, Græcis verò folia
rutæ domesticæ. Illam verò & illius semen, mo-
ly vel besanum, uel besasa, vel cum Syris, apud
quos nascitur, Hermola ferè vocant.

Rosa, rubra recens in purgantibus, sicca in
astringentibus.

Rhaphanus, sylvestris.

Rosmaris, folia, interdum flos, quem nescio
cur hodie vulgus æthos, id est, florem absolutè
appellet.

Rhus, cortex fructus sumach dicti.

Stæchas, stæchados Arabicæ flos.

Styrax

Quid accipiendum 365

Styrax, calaminthes, nam liquidus vulgò dictus est myrrha stacte, si verus sit.

Santalum, flauum.

Spica, nardi Indica.

Sulfur, ἄπυρον, id est, ignem non expertum seu viuum, est nobilissimum, ad quædam extinctum ceu nobis familiarius præfertur.

σχοῖνος, id est, iuncus, pro schœnu anthos.

Tres flores cordiales, violarum, buglosi vtriusque.

Thymum, Atticum aut ex editis locis & siccis, lib. 4. sanit. tuendæ.

Viola, nigra seu purpurea, vulgò Martia & quadragesimalis, quòd in ea tempora flos serè incidat, & eadem recens si haberi potest, nam sicca inefficax.

ZiZipha, id est, iuinbæ recentia & bene maturata, aut saltem integra, non putria aut vetustate exucta, quod illis post sextum mensem serè accidit.

Sic quæ singula in singulis regionibus sunt præstantissima & laudatissima.

Alumen Mlesium.

Agaricus Pionticus Andromach. iuniori in theriaca,

Myfi Cyprium.

Nitrum Berenicium,

Sinon Syriacus.

Cuminum Hispanum, alibi Aethiopicum, melius Aegyptio.

Anisum & Thymum & alia plurima Cretica, lib. 4. sanit. tuend. in diatrion piper. & diacala.

Meon

Meon Hispanum & Macedonicum .

Aristolochia Pontica , & hac melior Cretica , lib. 10. comp. ph. part.

Phu Ponticum , Castorium Ponticum .

Daucus Creticus , semine & radice bonus , ceteri solo semine .

In Dicearchia quæ nunc vocatur Puteolli, ærugo, cerussa, æs, squama æris, & alia nonnulla, Roma argenti spuma fit optima: ex Sicilia, item magna Libya & Creta quotannis multò præstantissima Romam afferebantur.

QVID PRO QVO.

ΑΝΤΙΒΑΛΛΟΜΕΝΑ, hoc est, simplicia quæ aliorum facultate similium penuria supponi possunt Medici consilio: quæ nomine Galeni circumferuntur, & à Paulo ad verbum propè citantur. Galeni non esse hinc liquet, quòd statim ipso initio Galenum citat. Adhæc anacardij fructus mentionem facit, qui Galeno ignoratus fuit. Postremò multa supponit absurdissima, ut loco agarici, euphorbium: pro serpyllo, potamogitona: vice gallæ, sordes gymnasiorum: in locum poly-pody, radicem chameleæ aut chameleontis: pro polytricho, absinthium, & alia eius generis plurima viribus dissimilia. Tamen quæ recipienda magis sunt, tum ibidem, tum ex Galeni libris, tum etiam ex Arabibus utcumque proficimus: ut pro

Aqua pluuiæ, supponi potest aqua fontana pura, & ab omni mistione syncera, Galenus lib. 1. comp. pharm. part. in diacodio.

Acacia,

Quid pro quo 367

Acacia, succus & caro prunorum agrestium,
vel hypocisthis, Auic. 2. canon.

Asaro, acori par pondus & dimidium. Car-
pesium quoque pro asaro & cum asaro, libro 2.
comp. ph. part.

Absinthio, cum Gal. abrotanum: & contra
pro abrotano absinthium.

Acanthij semine, lychnis & contra ἀντι-
βαλλόμενον author.

Acantha Arabica seu Aegyptia herba (quæ
succha Serapioni dicitur) acantha leuce no-
stris, eidem dicta bedegar.

Alicacabo, semen solani.

Asphalto, pix liquida, brutia.

Aethiopica oleæ lacryma, lacrymarum Aca-
ciæ partes duæ, seu pro gummi elemmi, gummi
Arabicum.

Acoro ad flatum & hepar ac lienem iuuan-
dum, cumini par pondus, & tertia pars Aristolo-
chia. Aui.

Anchusa, hyacinthus.

Arsenico, sandaracha.

Amylo, sicca farina.

Amygdalis amaris, absinthium.

Aristolochia quauis, una ex tribus aristolo-
chijs, quamcumque habueris, Gal. lib. 3. comp.
ph. part.

Adipe vulpis, vrsinus.

Adipe cervino, anserinus.

Alumine, sal fossitius.

Pro Balanstio, malicorium.

Buccinis, ostrea vsta.

Balsami liquore, myrrha lacte.

Pro

Pro Cinnamomo casia aut Amomi duplum
ad odoris gratiam, Gal. lib. 5. comp. ph. part. in
dentifricio. Pro cinnamomo, duplum optimæ ca-
sia, vel cum Quinto medico duplum, vel mul-
tum carpesij, vel certe non paucior casia, Gal.
lib. 2. 3. & 8. comp. ph. part. & lib. antid.
Quidam carentes cinnamomo in vicem eius po-
nunt æquale pondus ex semine cardamomi, Da-
mocrates in Cyphi lib. 2. antidotorum Gal.

Casia cinnamomum, Galen. lib. 2. comp.
ph. part.

Casia cortice, nardus Indica vel malobathri
folium, vel contrà, lib. 6. comp. ph. part.

Chamamei floribus, duplum foliorum, &
radicum.

Costo hodie rarissimo, pyrethri dimidium,
vel bacca cedri, vel radix helenij, vel ireos.

Cimolia terra ex Cimolo vna Cycladum, re-
trinitum ferri & mola simul attritorum.

Struthio, in sternutamentis elleborus albus.

Cardamomo maiore, minus, & contrà.

Calamintha omnis, menthastrum, pulegium
sunt similia facultatibus, ob id inuicem sunt an-
tiballomena.

Pro Croco, crecomagma.

Cypero, iuniperus maior.

Cumino, semen rutæ vel agni.

Clinopodio, heliotropium.

Colocynthis, semen ricini.

Capparis radice cortice, cortex radiceis tama-
ricis vel ericæ.

Cicutæ semine, coriandrum.

Pro Dictamno, elecliphacus vel nepitha.

Doronico,

Quid pro quo 369

Doronico, dimidiū seu due tertia charyophyl-
lorum, Auic.

Damaſonio, eryngium.

Pro Elaterio, succus foliorum cucumeris a-
grestis.

Ebeno, lignum Guaiaci, & contrā. Nam
quas vires hodie in ligno Guaiaci experimur, ebe-
no tribuit Galenus lib. 6. simp.

Eupatorio Meſue, abſinthij & aſari ana di-
midium pondus eius, vt ambo ſimul miſta æ-
quent pondus eupatorii Meſue, ab Eupatorio Græ-
corum diuerſi.

Pro Folio, folium charyophylli, nardus Indi-
ca ſi inuenitur, caſſia, id eſt, vulgare cinnamo-
mum, macis. Auicenna. 2. canone.

Ferrum, ferrugo, ſquamia ferri, idem propè
pollent, & pro ſe mutuo ponuntur.

Fimo palumbis, fimus columbæ.

Felle ſuillo, vel perdicis, vel piſcium.

Pro Gentiana, aſari & radicis capparis ana
dimidium.

Gongilide heliotropium.

Glycyrrhiſæ ſucco, æquale radicis eius. An-
dro. in arteriæ 15. apud Gal. lib. 7. comp.
ph. part.

Gudio cocco, ſemen lathyridis, & contrā
Galbano, ſagapenum.

Pro Hammoniaco, propolis.

Hermodyſilo, in doloribus inuclurarum ſo-
lia anchuſæ & dimidium bdellij.

Hederæ gummi, gummi perſici.

Hyacintho, flos Iſatidis.

Pro Iride Illyrica, helenium odoratum.

Pro

Pro Lapide Aſio, lapis gagates.

Pro lapide Magnete, lapis Phrygius.

Lapide Phrygio, pyrites lapis vel argyrites.

Libyſtico, ſemen ſtaphilini, id eſt, paſtina-
ca, præſertim agreſtis.

Lepore marino, cancer fluuiatilis.

Lanariæ radice, radix veratri nigri.

Lycio, ſuccus radicis centaurij magni, lib. 7.
ſimp. alijs ſuccus baccarum periclymeni, author
libelli Dynameôn, Galeno malè adſcripti.

Pro Melle, mel ærium vel ſaccharum.

Malabathro, caſia, vel nardus Indica.

Myrrha troglodytica, calamus odoratus.

Myrrha, Smyrniū, & contrà, Dioſc. in
Smyrnio.

Pro Naſturtij ſemine, folia eius ſicca.

Nuce muſcata, par ſpica.

Nardo Syriaca, iuncus odoratus.

Pro Opopanace, hammoniacum, vel galba-
num, vel ſagapenum, vel bdellium, libro 2. ad
Glaucōnem in curando ſcirrho.

Ocimo charyophyllato, meliſſa in affectibus
cordis.

Oleo laurino, pix liquida, licet illo inferior,
vel oleum cedrinum, vel cicinum, vel vetus, vel
oleum ex lucerna cum Hera, Gal. libr. 1. comp.
ph. part. vel coctum (ſic enim tenuius fit, & ve-
teri ac cicino ſimile) vel ſordes lucernarum lu-
ti craſſitie. Ibidem.

Oleo roſato, violatum, nymphæ: amygdal-
inum autem loco roſacei boni, id eſt, ex mul-
tis roſis cum oleo omphacino inſuſo facti, lib. 3.
comp. phar. part. initio.

Oleo

Quid pro quo 371

Oleo ricinino seu cicino, raphaninum.

Opobalsamo, opocarpa sum. Gal. vel myrrha lacte, vel liquor myrti.

Oryza, hordei farina.

Oesyro, medulla ceruina.

Omphacio, succus rhois, vel vinum austerum.

Pro Pipere longo, album: pro albo, nigrum optimum, id est, gratissimum: & contra 4. san-
nit. tuend.

Periclymeni fructus drachmis tribus, radi-
cis eiusdem drachmae tres. lib. 9. comp. ph. part.

Phaenicobalanorum pinguium carnis drach-
mis tribus, palmulae seu dactyli tres, aut sex.
Gal. lib. 7. comp. pharm. part. in arteriace. 15.
Andromachi.

Psyllio, lens palustris.

Petroselino Macedonico in theriaca, alterius
regionis petroselinum, Gal. lib. 1. antid.

Pro Resina phrygia, pix, aut pix brutia.
Gal. lib. 9. comp. pharm. part.

Rubigine, scoria ferri,

Raphani seminis drachmis decem, succi eius-
dem cyathus unus, Gal. lib. 9. comp. ph. part.

Rosis, flos rosarum, vel contra, Gal. lib. 6.
comp. pharm. part.

Rhus coriario, rhus obsoniorum, & contra,
Gal. lib. 6. comp. pharm. part.

Pro Staphide agria, pyrethrum.

Spodio Graecorum, cinis super fornacem au-
rariam inuentus melior quam eburustum, quod
nescio, cur hodie Barbari spodium vocent,

Styrace, castorium.

Sale Indo, saccharum candefactum.

R Sagapeno.

Sagapeno, gummi cedri, hammoniacum, resina picea sicca.

Spuma nitri, nitrum molle, vel aphi onitriū,
Gal. lib. 3. comp. pharm. part.

Sulfure viuo, flauum vel vstum & purgatum.

Satyrio, semen erucæ, vel scincus, vel contrā.

Sinapi, cardamomum vel cardamum.

Scammonio, ricinus.

Stibio contuso, squama aris, stannum vstum

Sepiæ osse, pumex.

Serapiade, pæonia radix.

Scilla bulbis.

Pro Terebinthina larix dicta resina, ei propemodum similis, Gal. lib. 1. comp. phar. gen.

Thapsiæ succo, chamaeleontis nigri succus, vel nasturtium, vel nasturtij aut erucæ seminis pondus æquale, licet illa sint multò inferiora thapsiæ, Gal. lib. 1. comp. pharm. part.

Tamaricis succo, succus sambuci, Gal. lib. 9. comp. pharm. part.

Pro veratro albo, nigrum.

Visco querno, chamaeleon niger.

Vino phalerno, aliud quoduis colore fuluum substantia tenue, vt perluceat, & sit odorum vehementer, vt Ariusium ex Chio, Lesbium ex Mitylene, Cressu, Methymna & Tmolites, Galen. lib. 1. comp. pharm. gen.

Pro Zedoria, aristolochia,

Gingibere, pyrethrum.

Αἰθιόπεια, vel horum aliqua vel alia, potest quænis regio noua, desideratis facultate affinia

ffinia facere, doctorum medicorum consilio: nam si Arabibus & Græcis pro sinapi cardamomum fortè ipsis frequentius licet substitueret, quidni pro cardamomo frequentissimum nobis sinapi usurpabimus? præsertim cum ut pro cinnamomo cassiam, sic contrà pro cassia cinnamomum assumi probauimus: idemq; in alijs faciendum puto. Ob id Galen. lib. 7. simplicium, melissophyllum (inquit) marrubio facultate simile, sed ipso multo imbecillius, ob id melissophyllo utitur nemo. Nam absurdum fuerit, præsertim ubique terrarum magno marrubij prouentu uti melissophyllo. Si cui verò ad manum non fuerit marrubium, melissophyllo uti poterit, obseruata eius præ illo imbecillitate, ut ob id quantitas eius augeatur: hæc Galenus. qua ratione pro cinnamomo duplum cassiæ optimè miscemus medicamentis, ut quãtitate qualitatis imbecillitatem redimamus.

Quæ igitur apud singulas gentes sunt copiosa, modo sint facultate proxima his quæ desiderantur, quia faciliora sunt paratu, ponantur, ut in Asia in frigidis capitis affectibus, aut in declinatione calidorum, rustici cedrio dicto utuntur: eius penuria pissileo, id est, pice & oleo mistis liquida forma: interdum etiam cedrio & pissileo simul magis & minus mistis, prout vires eius intendere student: hoc autem linunt sinciput, nares, frontem, aures, & quibusdam plantam & sedem, Galenus libro 2. comp. pharm. part.

Sed videmur antiballomenis non egere, qui magna cura iam simplicia generis omnis in præ-

R 2 ptu

374 De succedaneis

ptu habeamus : imò maximè ezeamus , cū multa simplicia veteribus laudatissima (vt Theriaces compositio docebit) hodie nobis parum sint cognita . Quæ ubi certa erunt , his vtendum potius quàm antiballomenis . Vt enim pluris est equo domini oculus , quàm equisonis industria : pluris agro domini vestigium , quàm villici stercore ratio : pluris familie paterfamilias , quàm procurator : pluris prator , consul , rex , pastor , quàm proprator , proconsul , prorex , mercenarius : sic plus tribuendum puto his , quæ maiores magno delectu & ratione optima in compositiones cooptauerunt , quàm quæ illorum loco coacti adoptamus . Hæc hætenus ex Iacobo Syluio .

QVALEM

QVALEM VIRVM Pharmacopolam esse conueniat.



AGNVM præsidium
humanæ ibecillitati
in medicina sitū est,
vt Homerus oīum
poetarū præstāissi-
mus, Medicū non si-
ne cā πολλῶν ἀνταξίων
ἄλλων pronutiasse vi-

deatur. Verū huius laudis, vt nūc quidē
medicina administratur, non exiguā par-
tem Pharmacopola sibi vendicat, cū sit
medici, quasi dextera manus, periclite-
turq; ipsius culpa sæpè, nō solum agri va-
letudo, verū etiam Medici, quantūuis
præstantis, fama, & existimatio. Quum
ea quæ Medicus rectè præscribit, parū dex-
trè exequitur, aut materia vitur exole-
ta, aut adulterata. Inde enim frequenter
accidit, vt æger vel non iuuetur omninò,
vel quod multò peius est, etiam lædatur.
Medicus autem, præterquàm quòd pro
imperito habetur, etiam in errorem dū-
citur, dum se aut de morbo non rectè iu-
dicasse, aut non debitam medicinam ad-
ministrasse suspicatur. Quare non teme-
rè quemlibet ad huius muneris functio-

R 3 nem

376 Qualem virum Pharma.

nam admittere deberent, qui ad gubernacula rerum publicarum sedent. Verum illi ut volent, suo fungantur officio, nos idoneum Pharmacopolam paucis delineabimus, ut ineptos & improbos à functione tam periculosa submoueamus, idoneos autem ad hoc munus capessendum alacriores reddamus.

Principiò, Latinæ linguæ non vulgariter tantum, sed ad mundiciem & proprietatem usque peritum esse oportet, ut ea quæ eruditi Medici, vel in genere, vel in specie ipsi præscribunt, recte & exacte intelligere possit. Neque confidat se satis instructum esse, si semel vulgarem quandam viam functionis suæ, quasi artificium manuarium perdidicerit. Nam cum multa quotidie nova cõficiendarum medicinarum ingenia inueniatur, multa etiam veterum, obliuione sepulta, iterum in lucem eruantur, noua illi itidem quotidie discenda erunt, neque semper habere poterit aliquem, qui ea ipsi quasi per manus tradat, & ad oculum demonstret, ex eruditorum virorum descriptionibus ea ut discat necesse est. Quare si Latinæ linguæ probe peritus non fuerit, fructu nouorum ingeniorum, aut omnino, aut magna ex parte expers manebit.

Deinde opus est illi etiam cognitione rerum minimè vulgari, aut protrita, earum præsertim, quæ propriè ad functionem eius pertinent, cuiusmodi sunt simplicia

plicia omnia, quorum descriptiones ex præstantissimis authoribus petitas, ad res ipsas conferre debet, donec exactam illorum cognitionem hauriat, & prorsus imbibat. Cognita verò, viso, gustu, olfactu, tactu, & aliis debitis modis sæpe ac diligenter examinet, non solum vt falsa à veris & adulterata à synceris, verum etiam vt præstantissima à mediocribus, & mediocria à degeneribus discernere consuescat.

Est & alia causa, cur tam diligenti examine opus sit: quædam enim alioqui grata, & salubria, ob insignem tamen acrimoniam, in vasculis æreis decocta, aut instrumentis ferreis diu tractata, tam tetrum ac horribile virus inde contrahunt, vt gustu fiant abominanda, & quouis valenti ventriculo intolerabilia. Quare hoc quoque scire debet, quo genere vasculorū, & instrumentorum, vnaquæque medicina sit coquenda, tractanda, & conseruanda.

Hanc curam, alia quasi huic connexa sequitur, scilicet, vt herbas, flores, fructus, semina, radices, debito tempore colligat, & ritè reponat, ne vel parum efficacia sint, vel putrescant, aut nimis arefacta, virtutem omnem amittant.

Habeat etiam ædes salubri loco sitas, ac variis reponendis conseruandisq; accommodas: nonnulla enim humido, pleraque calido, quædam sicco, quæda etiā frigido loco rectius conseruantur, quam
varietatem

378 Qualem uirum Pharma.

varietatem non quælibet domus præstare potest.

Diuitiæ quoque saltem mediocres adesse oportet, in primis autem animus liberalis, ab avaritia sordibusque alienus. Diuitiæ enim hoc præstare poterunt, ut commodè habitet, & medicinas quæ emendæ sunt, suo tēpore quàm optimas coemat. Animus autem liberalis, minimeque avarus, cauebit, ne compendii, aut lucri sui causa, deteriores vili pretio libentius, quàm præstantissimas, paulò largiore, comparet.

Iam simplicibus medicinis omnibus diligenter collectis, coemptis, & repositis, succedit industria compositarum ritè dispensandarum, ubi eum in primis vigilantem & circūspectum esse oportet. Nec temerè cōfidet ingenio suo, in succedaneis eligendis, sed peritum medicum cōsulet. Quem etiam omnino in conficiendis Opiatis, & similibus præstantibus ac magni momenti medicinis, ut præceptorē & iudicem adhibebit: cui adiunget, si commodè fieri poterit, vnum & alterum bonum atque doctum virum, vel Senatorii ordinis, ut eos habeat veluti testes suæ diligentiae, industriæ, ac fidei. Deinde quamque medicinam, sic ritè præparatam, debito ac præscripto tempore, fermentari sinat, antequàm eam in vsum publicum expēdat.

Nec minor in eo fides requiritur, in reiciendis simplicibus atque compositis, quàm

quàm in ijsdem reponendis & componendis. Debet enim singulis mensibus, aut sepius etiam, omnia lustrare, & diligenter cōsiderare, vt corrupta, putria, muccosa, exoleta, & quouis modo inutilia, vel inefficacia reddita, reiiciat, bona fide, nec in iis quærat suum lucrum, quibus ægroto crearetur vitæ periculum: sed sit, vt diximus, animo liberali, & magno, cogitetq; paruum illud damnum, fide sua iam perspecta, maioris sibi lucri causam fore.

Hæc omnia cū indefessā diligentia & animum sibi semper præsentem requirant, hoc quoq; obseruare cōuenit, ne sit aleæ, aut similibus ludis deditus, ne compotati onibus gaudeat, aut alioqui vinosus velebriosus, neque scædis amoribus implicatus teneatur. Alea enim negligentiā parit: ebrietas errores, obliuionē, & stuporem inducit: turpis verò amor, etiā veneficia illi extorquere posset. Quare omnino si fieri potest, maritus sit, cui cum vxore rectè conueniat, liberosq; habeat, quos honestè educare studeat: huiusmodi enim pignoribus obstrictus, vagas libidines detestabitur, neque illis fomenta sciens subministrabit, & posteritati suæ consulens, bonam conscientiam seruare adnitetur, nec metu, nec gratia, nec prece, nec pretio, ad vllum veneficium impelletur.


Quòd si accesserit vera pietas, hoc est timor Dei, & fides in Crīstum, charitas
erga

380 Qualem uirum Pharma.


erga proximū, & spes futuræ vitæ, omnia erūt tutiora, illustriora, & felicitiora. Tum enim cogitabit: Si quid per negligentiam in vitam, aut valetudinem proximi peccauero, iudicium Dei non effugiam: quātō minus effugiam, si sciens ac prudens venenū dederō, abortum procurauero, aut aliquod aliud ingens atque insigne flagitium designauero? Et si humanitas eorū, qui infirmos & ægrotos tantū visitare solent, Christo adeō grata est, ut illud beneficium, in se ipsum collatum esse affirmet: quātō gratior erit illi mea cura, & sollicitudo, dum studeo illis medicinas rectè componere, tempestiuè exhibere, & non propter lucrum tantū, verū etiam humanitatis respectu operā dare, ut melius habeant & conualescant?

Hæc & similia si cogitabit, ultro, ac sua sponte, erit humanus, placidus, affabilis, benignus, alacris, in primis autem mitis erga pauperes, & commodus erga imperitos: non enim in eorum ineptias, sed in necessitatem ægroti respiciet, ac DEVM omnium inspectore ac iudicem præ oculis habebit, qui rectè agenti longè maiora & beatiora præmia largietur, quàm ab ullo mortalium persolui possint.

FINIS.







In tus vix Stanho.

anno



Ars vincit naturam

omni in omni et amari

et in cedantur amari